# 2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 ) 과목코드 : ( 09 ) 이수단위 : ( 4 ) 문항수 ( 선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

*1.* 닫힌구간 $[2, 5]$에서 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 하자. $M+m=30$일 때, 상수 $a$의 값은? [4.0점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

*2.* 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt=x^3+5x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.0점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

*3.* 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t$ $(t\geq 0)$에서의 위치 $x$가

$$x=t^3-\frac{3}{2}t^2-18t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4.0점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

*4.* 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=\begin{cases}2x & (x<1)\\ 3 & (x>1)\end{cases}$$

이고 $f(0)=1$일 때, $f(3)$의 값은? [4.0점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

**5.** 두 상수 $a$, $b$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_5^8 f(x)\,dx$의 값은? [4.2점]

(가) $x<0$에서 $f(x)=x+5$이고, $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2+ax+b$이다.
(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(5+x)=-f(5-x)$이다.

① 9 ② 7 ③ 5 ④ 3 ⑤ 1

**6.** 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x \{f(t)+12t^3-15t\}\,dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? [4.2점]

① 59 ② 60 ③ 61 ④ 62 ⑤ 63

**7.** 두 실수 $a$, $b$와 양수 $c$에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (x\le 0)\\ x^3+cx-4|x-c| & (x>0)\end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 최댓값은? [4.2점]

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.
(나) $x_1<x_2$인 모든 실수 $x_1$, $x_2$에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

① $-25$ ② $-20$ ③ $-15$ ④ $-10$ ⑤ $-5$

**8.** 두 함수

$$f(x)=x^3+x^2+4,\ g(x)=x^2+3x+a$$

가 있다. $x\le 0$인 모든 실수 $x$에 대하여 부등식

$$f(x)\le g(x)$$

가 성립할 때, 실수 $a$의 최솟값은? [4.2점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

*9.* 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}$ $(-3\le x\le 1)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리를 최대가 되게 하는 점 P의 $x$좌표를 $\alpha$, 최소가 되게 하는 점 P의 $x$좌표를 $\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은? [4.4점]

① $-6$ ② $-4$ ③ $-2$ ④ $0$ ⑤ $2$

*10.* 서로 다른 두 정수 $a$, $b$에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+4$가 다음 조건을 만족시킬 때, $x$에 대한 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 모든 실근의 합이 최소가 되도록 하는 $f(0)$의 값은? [4.4점]

(가) 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -2]$에서 감소하고, 구간 $[-2, \infty)$에서 증가한다.
(나) $f'(t)=0$을 만족시키는 $t<-2$인 실수 $t$의 값이 존재하지 않는다.

① $-1$ ② $0$ ③ $1$ ④ $2$ ⑤ $3$


이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

# 2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 ) 과목코드 : ( 09 ) 이수단위 : ( 4 ) 문항수 ( 선택형: 18, 서답형 2)

**11.** 함수 $f(x)=x^3+4x^2-24x-20$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=x^2+a$ 는 그림과 같다.




$x$ 에 대한 삼차방정식 $x^3+4x^2-24x-20=x^2+a$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

<보 기>

ㄱ. 서로 다른 실근의 개수가 2 가 되도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합은 12 이다.

ㄴ. 서로 다른 세 실근을 갖고 세 실근의 곱이 음수인 실수 $a$ 에 대하여 양수인 실근의 개수는 2 이다.

ㄷ. 서로 다른 세 실근을 갖고, 세 실근의 곱이 음수가 되도록 하는 정수 $a$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 $-68$ 이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12.** 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,\ f(-2))$ 에서의 접선과 점 $(4,\ f(4))$ 에서의 접선이 점 $(k,\ k+4)$ 에서 만난다. $f(2k)=90$ 일 때, $f(3k)$ 의 값은? (단, $k$ 는 상수이다.) [4.5점]

① 16 ② 21 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

**13.** 곡선 $f(x)=x^3-2x+4$ 위의 점 $\mathrm{P}(1,\,3)$에서의 접선 $l$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{R}(a,\,b)$와 접선 $l$ 사이의 거리가 $d$인 점 R의 개수가 3일 때, $d^2$의 값은? [4.7점]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

**14.** 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 $x$에 대하여 $\int f'(x)\,dx=2g'(x)+\int 12x\,dx$이다.

(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $\int f(x)\,dx=xg(x)-\int g(x)\,dx$이다.

(다) 함수 $f(x)-g(x)$의 한 부정적분 $H(x)$에 대하여 $H(0)=H(3)$이다.

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

*15.* 실수 전체의 집합에서 증가하고 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 $k$의 개수는? [4.7점]

(가) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)=2f(x-4)+3$이다.

(나) $\int_{-4}^{4} f(x)\,dx=-12$

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

*16.* 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_{x}^{x+1}|f(t)-t|\,dt$라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=1$과 $x=3$에서 극소이고 $g(x)$의 극댓값이 14일 때, $f(1)$의 값은? [4.9점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

*17.* 정수 $m$에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가


$$v(t)=2t^3-6t+7-m$$

이다. 시각 $t$에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 하자. 함수 $x(t)$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 $m$의 최댓값과 최솟값의 합은? [5.2점]

(가) $x(k)<0$인 양수 $k$가 존재한다.
(나) 모든 양수 $t$에 대하여 $x(t)\geq -12$이다.

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

*18.* 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 두 실수 $p$, $k$ $(-p<k<0)$에 대하여 곡선 $y=f'(x)$는 $x$축과 두 점 $\mathrm{P}(-p,\ 0)$, $\mathrm{Q}(k,\ 0)$에서 만난다. 곡선 $y=f'(x)$와 $x$축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_1$, 곡선 $y=f'(x)$와 $x$축 및 $y$축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_2$라 하자.




함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 $p$에 대하여 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 값의 합은? [5.2점]

(가) $S_1=S_2$이다.
(나) 점 $\mathrm{A}(-2,\ f(-2))$를 지나는 곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 곡선과 이 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\dfrac{64}{3}$인 접선이 존재한다.

① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2 ⑤ 0

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

# 2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 ) 과목코드 : ( 09 ) 이수단위 : ( 4 ) 문항수 ( 선택형: 18, 서답형 2)

## <서답형 문제 - 20점>

### 서답형 1

함수 $f(x)=4x(x-2)(x-7)$과 실수 $t\ (0<t<2)$에 대하여 함수 $g(x)$는 $x<t$에서 $g(x)=f(x)$이고, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$이다. 함수 $y=g(x)$의 그래프와 $x$축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값을 구하시오. [10점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

### 서답형 2

상수 $k\ (k<0)$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=x^3-x^2,\ g(x)=2x|x|+k$$

이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 오직 두 점에서 만나도록 하는 $k$의 값을 구하시오. [3점, 답만 적으시오.]

(2) (1)에서 구한 $k$에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [7점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.