

29 mai 2014

Test (durée 2 heures)

Chacune des questions 1 à 9 est à choix multiple. Il n'y a qu'une seule réponse correcte par question.

Pour chacune des questions à choix multiple, on compte +3 points si la réponse est correcte, 0 point si la question reste sans réponse, -1 point si la réponse est fausse.

La question 10 (définitions) vaut 4 points (2 points pour chaque définition).

La question 11 (démonstration) vaut 4 points.

Total possible : 35 points.

Problème 1. Quel est le polynôme minimal de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$?

- (A) $(t-1)t$.
- (B) $(t-1)^2t$.
- (C) $(t-1)t^2$.
- (D) $(t-1)^2t^2$.

Problème 2. Soit $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ l'espace vectoriel des polynômes en t , à coefficients dans \mathbb{R} , de degré au plus 3. Soit β la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ définie par $\beta(f(t), g(t)) = f(1)g(1)$, $\forall f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$. Quelle est la signature de β ?

- (A) $(1, 0)$.
- (B) $(2, 0)$.
- (C) $(3, 0)$.
- (D) $(1, 1)$.

Problème 3. Soit \mathbb{F}_{11} le corps à 11 éléments, soit $E = (e_1, e_2)$ la base canonique de $V = (\mathbb{F}_{11})^2$ et soit $E^* = (\phi_1, \phi_2)$ la base duale de E (base de l'espace dual V^*). Soit $F = (f_1, f_2)$ une autre base de V et soit $F^* = (\psi_1, \psi_2)$ sa base duale. Sachant que $\psi_1 = 3\phi_1 - \phi_2$, $\psi_2(e_1) = 0$, $\psi_2(e_2) = 6$, quelle est la première composante de f_1 relativement à E ?

- (A) 0.
 - (B) 2.
 - (C) 3.
 - (D) 4.
-

Problème 4. Sur \mathbb{C}^3 , on définit le produit scalaire donné par la matrice suivante (par rapport à la base canonique de \mathbb{C}^3) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & i \\ 0 & -i & 1 \end{pmatrix}$$

(On admet que c'est bien un produit scalaire.) Soit $W = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, i))$ et considérons les vecteurs $u = (0, 2i, 3)$ et $v = (0, 4, 6i)$. Laquelle des assertions suivantes est correcte ?

- (A) $v \in W^\perp$.
 - (B) $u \in W^\perp$.
 - (C) $2u - iv \in W^\perp$.
 - (D) $u \notin W^\perp$.
-

Problème 5. Soit $V = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien avec produit scalaire standard et considérons le sous-espace $W = \text{Vect}((1, 0, -1), (4, 1, 0))$. Quel est le vecteur de W qui est à distance minimale du vecteur $v = (1, 5, 1)$?

- (A) $(5, 1, -1)$.
 - (B) $(36, 9, 0)$.
 - (C) $(2, 1, 2)$.
 - (D) $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2})$.
-

Problème 6. On considère le système différentiel

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -2x_1(t) + 4x_2(t) \end{cases}$$

avec conditions initiales $x_1(0) = 0$ et $x_2(0) = 1$. Que vaut la fonction $x_1(t)$?

- (A) $x_1(t) = e^{2t} - e^{3t}$.
 - (B) $x_1(t) = e^{-2t} - e^{-3t}$.
 - (C) $x_1(t) = e^{3t} - e^{2t}$.
 - (D) $x_1(t) = 2e^{2t} - 2e^{3t}$.
-

Problème 7. On considère la matrice complexe $A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ a & -6 & -4i \\ 0 & 4i & 0 \end{pmatrix}$, où $a, b \in \mathbb{C}$. Est-ce que A est unitairement diagonalisable ?

- (A) Oui si $a = i$ et $b = 0$.
 - (B) Non si $a = 2$ et $b = 1$.
 - (C) Oui si $a = 2$ et $b = i$.
 - (D) Non si $a = -8$ et $b = 0$.
-

Problème 8. Laquelle des assertions suivantes est correcte ?

- (A) Il existe une matrice complexe hermitienne $A \in M_n(\mathbb{C})$ et une valeur propre λ de A satisfaisant l'inégalité stricte $m_{\text{geom}}(\lambda) > m_{\text{alg}}(\lambda)$.
 - (B) Il existe une matrice complexe hermitienne $A \in M_n(\mathbb{C})$ et une valeur propre λ de A satisfaisant l'inégalité stricte $m_{\text{geom}}(\lambda) < m_{\text{alg}}(\lambda)$.
 - (C) Il existe une matrice complexe hermitienne $A \in M_n(\mathbb{C})$ et une valeur propre λ de A telles que $(t - \lambda)^n$ est un polynôme annulateur de A et $A - \lambda I_n \neq 0$.
 - (D) Pour toute matrice complexe hermitienne $A \in M_n(\mathbb{C})$ et pour toute valeur propre λ de A , la valeur λ n'est pas une racine double du polynôme minimal de A .
-

Problème 9. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice orthogonale. Combien vaut la somme des carrés des coefficients de A ?

- (A) Cette somme peut valoir n'importe quel nombre réel positif.
 - (B) Cette somme vaut 1.
 - (C) Cette somme vaut n .
 - (D) Cette somme vaut n^2 .
-

Problème 10. Répondez de manière précise à chacune des questions suivantes.

- a) Qu'est-ce qu'une matrice complexe normale ?
 - b) Qu'est-ce que les valeurs singulières d'une matrice $A \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$?
-

Problème 11. Soit V un \mathbb{C} -espace vectoriel hermitien et soit $\alpha : V \rightarrow V$ une transformation linéaire auto-adjointe. Montrer de manière directe (sans utiliser le théorème spectral) que deux espaces propres de α distincts sont orthogonaux. Justifiez vos raisonnements.
