

## Corrigé 5 du jeudi 20 octobre 2016

### Exercice 1.

Soit  $\alpha > 0$ , étudions la convergence de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n^8}$ . On pose  $a_n = \frac{\alpha^n}{n^8}$ .

On applique le critère de Cauchy (critère de la limsup):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{\sqrt[n]{n^8}} = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^8 = \alpha.$$

- Si  $0 < \alpha < 1$ , la série converge;
- Si  $\alpha > 1$ , la série diverge;
- Si  $\alpha = 1$ , la série converge. En effet on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

### Exercice 2.

- 1.) Soit  $(x_n)_{n=0}^{\infty}$  une suite de nombres réels positifs qui est sous-additive au sens que:

$$x_{n+m} \leq x_n + x_m, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}^*.$$

- Montrons que la suite  $\left(\frac{x_n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$  converge vers  $\alpha$  où  $\alpha = \inf\left\{\frac{x_1}{1}, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right\}$ .  
 Avant cela, on observe que pour  $p, q, r \in \mathbb{N}^*$ , on a:

$$x_{pq+r} \leq x_{pq} + x_r \leq x_q + x_{(p-1)q} + x_r \leq \dots \leq px_q + x_r.$$

Soit  $\epsilon > 0$ . Par la propriété de l'inf, il existe  $q \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\alpha \leq \frac{x_q}{q} < \alpha + \frac{\epsilon}{2}$ .

On prend un entier  $N > q$  tq  $N > 2 \max\{x_r : r = 0, \dots, q-1\}/\epsilon$ . On a alors, pour  $n > N$ :

$$\alpha \leq \frac{x_n}{n} \leq \frac{px_q + x_r}{n} = \frac{px_q}{pq+r} + \frac{x_r}{n} \leq \frac{x_q}{q} + \frac{x_r}{N} < \alpha + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \alpha + \epsilon$$

où on a écrit  $n$  de la forme  $n = pq + r$ , avec  $0 \leq r < q$ . Ceci prouve la convergence de la suite  $\left(\frac{x_n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$  vers  $\alpha$ .

- Si on définit la suite  $(x_n)_{n=0}^{\infty}$  par  $x_n = 0$  si  $n$  est pair et  $x_n = 1$  si  $n$  est impair, la suite est trivialement sous-additive ( $x_n + x_m = 0$  si et seulement si  $n$  et  $m$  sont pairs et alors,  $n + m$  est aussi pair) et  $(x_n/n)_{n=1}^{\infty}$  n'est pas monotone.

- 2.) Montrons que  $C_n \geq 2^n$ . Il suffit d'exhiber  $2^n$  telles marches. Partant de  $(x_0 = 0, y_0 = 0)$  on choisit le point  $(x_{k+1}, y_{k+1})$  comme soit  $(x_k, y_k) + (1, 0)$  soit  $(x_k, y_k) + (0, 1)$  jusqu'à  $k = n$ . Pour chaque nouveau point, on a deux choix possibles et il y a  $n$  points. D'où  $C_n \geq 2^n$ , car il y a d'autres marches possibles. Selon la partie 1.), il suffit de montrer que la suite  $\log C_n$  est sous-additive. En effet, dans ce cas,  $\frac{\log C_n}{n}$  converge vers un  $\alpha$  qui est positif puisque  $\frac{\log C_n}{n} \geq \frac{\log 2^n}{n} = \log 2 > 0, \forall n > 0$ .

On montre que  $C_{n+m} \leq C_n C_m$ . Appelons  $X_n$  l'ensemble de toutes les marches auto-évitantes partant de  $(0, 0)$  et de longueur  $n$ . Il suffit de remarquer que tout  $c \in X_{n+m}$  peut se couper en  $c_1 \in X_n$  (les  $n+1$  premiers points) et d'un  $c_2 \in X_m$  (le reste translaté, avec le dernier point de  $c_1$  comme point de départ). Ceci donne une injection de  $X_{n+m}$  dans  $X_n \times X_m$ . Remarquons, par contre, qu'on ne peut pas "enchaîner" un  $c_n$  donné dans  $X_n$  et un  $c_m$  donné (translaté) dans  $X_m$  et espérer construire à coup sûr une marche auto-évitante.

**Exercice 3.**

Soient  $(a_n)_{n \geq 0}$  et  $(b_n)_{n \geq 0}$  deux suites de nombres réels positifs pour lesquelles il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, \quad \text{pour tout entier } n \geq n_0.$$

1) Montrons que  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n < +\infty.$

*Démonstration :* Par hypothèse, on a

$$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \leq \dots \leq \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}} = \beta, \quad \forall n \geq n_0.$$

Ainsi  $a_n \leq \beta b_n, \forall n \geq n_0$ . Si de plus on pose  $M = \max_{k=0, \dots, n_0-1} |a_k|$ , on a pour  $p \geq n_0$ ,

$$S_a^p = \sum_{k=0}^p a_k = \sum_{k=0}^{n_0-1} a_k + \sum_{k=n_0}^p a_k \leq Mn_0 + \beta \sum_{k=n_0}^p b_k \leq Mn_0 + \beta \sum_{k=0}^p b_k.$$

Par hypothèse, la suite  $\left(\sum_{k=0}^p b_k\right)_{p=0}^{\infty}$ , qui est croissante, converge ; posons  $\ell > 0$  sa limite. On a alors

$$S_a^p \leq Mn_0 + \beta \ell, \quad \forall p \geq n_0.$$

La suite  $(S_a^p)_{p=0}^{\infty}$  étant de plus croissante, elle converge et donc la série  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge. □

2) Montrons que  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n = +\infty.$

*Démonstration :* C'est une conclusion évidente de la relation suivante obtenue au point 1):

$$\sum_{k=0}^p a_k \leq Mn_0 + \beta \sum_{k=0}^p b_k, \quad \forall p \geq n_0.$$

□