
接收细胞 ↔ 接收模式；接收模式 ↔ 候选信号 | P编号仅在各数据集内有效


茶 · 叶 | Tea · leaf

细胞 模式 模式 信号分组




马铃薯 · 地上部 | Potato · shoot

细胞 模式 模式 信号分组




玉米 · 根 | Maize · root

细胞 模式 模式 信号分组




高粱 · 根 | Sorghum · root

细胞 模式 模式 信号分组




小麦 · 根 | Wheat · root

细胞 模式 模式 信号分组




马铃薯 · 块茎 / 匍匐茎 | Potato · tuber stolon

细胞 模式 模式 信号分组



番茄 · 茎尖 | Tomato · shoot apex

细胞 模式 模式 信号分组




水稻 · 根 | Rice · root

细胞 模式 模式 信号分组


马铃薯 · 叶 | Potato · leaf

细胞 模式 模式 信号分组




油菜 · 叶 | Rapeseed · leaf

细胞 模式 模式 信号分组




烟草 · 根 | Tobacco · root

细胞 模式 模式 信号分组




水稻 · 叶 | Rice · leaf

细胞 模式 模式 信号分组




水稻 · 茎 | Rice · stem

细胞 模式 模式 信号分组




大豆 · 根瘤 | Soybean · nodule

细胞 模式 模式 信号分组



玉米 · 叶 | Maize · leaf

细胞 模式 模式 信号分组



流带宽度表示贡献（保留原0.5阈值）；左右两幅图分别缩放

[OG] = 同源组描述分组；† = 该项所有贡献均低于0.5，保留名称、不绘流带