

细胞 → 发送模式；发送模式 → 候选信号 ｜ P编号仅在各数据集内有效


拟南芥 · 地上部 | Arabidopsis · shoot
细胞　模式　模式信号分组




拟南芥 · 根 | Arabidopsis · root
细胞　模式　模式信号分组




大麦 · 根 | Barley · root
细胞　模式　模式信号分组




拟南芥 · 茎尖 | Arabidopsis · shoot apex
细胞　模式　模式信号分组



西兰花 · 整株幼苗 | Broccoli · whole seedling
细胞　模式　模式信号分组




苜蓿 · 根 | Alfalfa · root
细胞　模式　模式信号分组




棉花 · 胚 / 种子 | Cotton · embryo seed
细胞　模式　模式信号分组


棉花 · 纤维 | Cotton · ovule fibre
细胞　模式　模式信号分组




木薯 · 根 | Cassava · root
细胞　模式　模式信号分组




拟南芥 · 叶 | Arabidopsis · leaf
细胞　模式　模式信号分组




拟南芥 · 胚珠 | Arabidopsis · ovule
细胞　模式　模式信号分组




甘蓝 · 叶 | Cabbage · leaf
细胞　模式　模式信号分组



甘蓝 · 地上部 | Cabbage · shoot
细胞　模式　模式信号分组



香蕉 · 根 | Banana · root
细胞　模式　模式信号分组



流带宽度表示贡献（保留原0.5阈值）；左右两幅图分别缩放

[OG] = 同源组描述分组；† = 该项所有贡献均低于0.5，保留名称、不绘流带