

TABLE III

MEAN AND STANDARD DEVIATION OF DURATION OF FREEZING EPISODES IN SECONDS OF PATIENTS IN DIFFERENT CUEING CONDITIONS (ORIGINALLY REPORTED IN [20])

<i>Patient</i>	<i>Baseline</i>	<i>Auditory Alert</i>	<i>Vibratory Alert</i>	<i>Auditory Rhythm</i>	<i>Vibratory Rhythm</i>	<i>Visual</i>
Duration P1	4.3 ± 2.9	6.4 ± 4.1	10.0 ± 4.8	6.8 ± 3.7	8.0 ± 4.8	5.3 ± 2.6
Duration P2	3.9 ± 1.5	3.8 ± 0.8	4.7 ± 1.9	4.4 ± 1.7	4.8 ± 2.5	3.6 ± 1.6
Duration P3	3.7 ± 2.3	4.6 ± 2.1	5.4 ± 2.8	3.3 ± 1.2	5.1 ± 2.0	4.4 ± 2.1
Duration P5	18.1 ± 17.0	13.2 ± 11.5	13.2 ± 11.5	13.0 ± 12.7	14.2 ± 10.1	7.3 ± 6.3
Duration P6	3.6 ± 1.1	3.0 ± 0.5	3.3 ± 0.8	3.3 ± 0.8	3.3 ± 0.8	3.3 ± 0.8
Duration P7	13.6 ± 14.1	9.0 ± 6.8	5.7 ± 0.6	7.7 ± 5.6	2.5 ± 0.7	7.7 ± 5.6
Duration Avg.	7.9 ± 6.4	6.7 ± 3.9	7.1 ± 3.8	6.4 ± 3.7	6.3 ± 4.3	5.3 ± 1.9