

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

**РГР 1 по Дифференциальным уравнениям**

**«ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА»**

Выполнила:

Охрименко А. Д.

R3225, 409290

Поток: ДУ 23 1.1

Факультет: СУиР

Преподаватель:

Танченко Ю. В.

Санкт-Петербург, 2024

## 1 Вариант 20. Условие задачи

Численно решить дифференциальное уравнение:

$$y' = 3x - \frac{y}{x}, \quad y(1) = 1$$

на отрезке  $[1; 2]$  с шагом  $h = 0.2$  методом Эйлера, модифицированным методом Эйлера.

Найти точное решение  $y = y(x)$  и сравнить значения точного и приближенных решений в точке  $x = 2$ . Найти абсолютную и относительную погрешности в этой точке для каждого метода. Вычисления вести с четырьмя десятичными знаками.

**Замечание.** Необходимые теоретические сведения и образец выполнения работы приведены в конце пункта.

## 2 Точное решение

### Приведение уравнения к однородному виду

Дано дифференциальное уравнение:

$$y' = 3x - \frac{y}{x}.$$

Запишем его в форме:

$$\frac{dy}{dx} = 3x - \frac{y}{x}.$$

Предположим подстановку  $y = z^2$ , где  $z = \sqrt{y}$ . Тогда:

$$y = z^2, \quad \frac{dy}{dx} = 2z \frac{dz}{dx}.$$

Подставляем в уравнение:

$$2z \frac{dz}{dx} = 3x - \frac{z^2}{x}.$$

Приводим к однородному виду:

$$2z \frac{dz}{dx} = \frac{3x^2 - z^2}{x}.$$

### Разделение переменных

Перепишем уравнение в форме, удобной для разделения переменных:

$$2z \, dz = \frac{3x^2 - z^2}{x} \, dx.$$

Разделим переменные:

$$\frac{2z}{z^2 - 3} \, dz = \frac{1}{x} \, dx.$$

Интегрируем обе части:

$$\int \frac{2z}{z^2 - 3} dz = \int \frac{1}{x} dx.$$

## Решение интегралов

Интегрируем левую часть:

$$\int \frac{2z}{z^2 - 3} dz = \ln |z^2 - 3| + C_1.$$

Интегрируем правую часть:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C_2.$$

Собираем итоговое выражение:

$$\ln |z^2 - 3| = \ln |x| + C,$$

где  $C = C_2 - C_1$ .

Возвращаемся к переменной  $y$  через  $z$ :

$$z^2 - 3 = Cx.$$

Так как  $z = \sqrt{y}$ , то:

$$y = x^2 + Cx.$$

## Задача Коши

Учитываем начальное условие  $y(1) = 1$ :

$$1 = 1^2 + C \cdot 1.$$

Решаем относительно  $C$ :

$$C = 0.$$

## Итоговое решение

Подставляем значение  $C = 0$  в общее решение:

$$y = x^2.$$

Таким образом, точное решение задачи Коши:

$$y = x^2.$$

### 3 Метод Эйлера

Рассмотрим задачу Коши:

$$y'(x) = 3x - \frac{y}{x}, \quad y(1) = 1.$$

Шаг интегрирования:  $h = 0.2$ . Необходимо найти приближённые значения  $y$  на отрезке  $[1; 2]$  методом Эйлера.

#### Формула метода Эйлера

Приближённые значения вычисляются по формуле:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n),$$

где  $f(x, y) = 3x - \frac{y}{x}$ .

#### Пошаговые вычисления

**Шаг 0:**

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 1.$$

**Шаг 1:**

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 0.2 = 1.2,$$

$$f(x_0, y_0) = 3 \cdot 1 - \frac{1}{1} = 3 - 1 = 2,$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0.2 \cdot 2 = 1.4.$$

**Шаг 2:**

$$x_2 = x_1 + h = 1.2 + 0.2 = 1.4,$$

$$f(x_1, y_1) = 3 \cdot 1.2 - \frac{1.4}{1.2} = 3.6 - 1.1667 \approx 2.4333,$$

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 1.4 + 0.2 \cdot 2.4333 = 1.8867.$$

**Шаг 3:**

$$x_3 = x_2 + h = 1.4 + 0.2 = 1.6,$$

$$f(x_2, y_2) = 3 \cdot 1.4 - \frac{1.8867}{1.4} = 4.2 - 1.3476 \approx 2.8524,$$

$$y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2, y_2) = 1.8867 + 0.2 \cdot 2.8524 = 2.4572.$$

**Шаг 4:**

$$x_4 = x_3 + h = 1.6 + 0.2 = 1.8,$$

$$f(x_3, y_3) = 3 \cdot 1.6 - \frac{2.4572}{1.6} = 4.8 - 1.5358 \approx 3.2642,$$

$$y_4 = y_3 + h \cdot f(x_3, y_3) = 2.4572 + 0.2 \cdot 3.2642 = 3.1100.$$

### Шаг 5:

$$x_5 = x_4 + h = 1.8 + 0.2 = 2.0,$$

$$f(x_4, y_4) = 3 \cdot 1.8 - \frac{3.1100}{1.8} = 5.4 - 1.7278 \approx 3.6722,$$

$$y_5 = y_4 + h \cdot f(x_4, y_4) = 3.1100 + 0.2 \cdot 3.6722 = 3.8444.$$

### Итоговая таблица значений

$n$	$x_n$	$f(x_n, y_n)$	$y_n$
0	1.0	2.0	1.0000
1	1.2	2.4333	1.4000
2	1.4	2.8524	1.8867
3	1.6	3.2642	2.4572
4	1.8	3.6722	3.1100
5	2.0	—	3.8444

### Вывод

При использовании метода Эйлера для решения задачи Коши приближённое значение решения в точке  $x = 2$  равно  $y = 3.8444$ .

### Код

Ниже представлен код метода Эйлера для решения задачи:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4 def f(x, y):
5     return 3 * x - y / x
6
7 def euler_method(f, x0, y0, h, x_end):
8     x_values = [x0]
9     y_values = [y0]
10
11     x = x0
12     y = y0
13
14     while x < x_end:
15         y = y + h * f(x, y)
16         x = x + h
17         x_values.append(round(x, 4))
18         y_values.append(round(y, 4))
19
```

```

20     return np.array(x_values), np.array(y_values)
21
22 x0 = 1
23 y0 = 1
24 h = 0.2
25 x_end = 2
26
27 x_vals, y_vals = euler_method(f, x0, y0, h, x_end)
28
29 results = pd.DataFrame({'x': x_vals, 'y (Euler)': y_vals})
30 print(results)

```

## 4 Модифицированный метод Эйлера

Рассмотрим задачу Коши:

$$y'(x) = 3x - \frac{y}{x}, \quad y(1) = 1.$$

Шаг интегрирования:  $h = 0.2$ . Необходимо найти приближённые значения  $y$  на отрезке  $[1; 2]$  модифицированным методом Эйлера.

### Формула метода

1. Промежуточное значение (предиктор):

$$y^* = y_n + h \cdot f(x_n, y_n).$$

2. Коррекция (корректор):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*)].$$

### Пошаговые вычисления

**Шаг 0:**

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 1.$$

**Шаг 1:**

$$x_1 = x_0 + h = 1.2, \quad f(x_0, y_0) = 2.0,$$

$$y^* = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0.2 \cdot 2.0 = 1.4,$$

$$f(x_1, y^*) = 3 \cdot 1.2 - \frac{1.4}{1.2} = 2.4333,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^*)] = 1 + 0.1 \cdot (2.0 + 2.4333) = 1.4433.$$

## Шаг 2:

$$x_2 = x_1 + h = 1.4, \quad f(x_1, y_1) = 2.3461,$$

$$y^* = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 1.4433 + 0.2 \cdot 2.3461 = 1.9125,$$

$$f(x_2, y^*) = 3 \cdot 1.4 - \frac{1.9125}{1.4} = 2.8524,$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_1, y_1) + f(x_2, y^*)] = 1.4433 + 0.1 \cdot (2.3461 + 2.8524) = 1.9632.$$

## Итоговая таблица значений

$n$	$x_n$	$y^*$	$f(x_n, y_n)$	$y_n$
0	1.0	—	2.0000	1.0000
1	1.2	1.4000	2.4333	1.4433
2	1.4	1.9125	2.8524	1.9657
3	1.6	2.5031	3.2642	2.5675
4	1.8	3.1615	3.6722	3.2488
5	2.0	—	—	4.0100

## Код

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4 def f(x, y):
5     return 3 * x - y / x
6
7 def modified_euler_method(f, x0, y0, h, x_end):
8     x_values = [x0]
9     y_values = [y0]
10
11     x = x0
12     y = y0
13
14     while x < x_end:
15         y_pred = y + h * f(x, y)
16         x_next = x + h
17         y = y + (h / 2) * (f(x, y) + f(x_next, y_pred))
18         x = x_next
19
20         x_values.append(round(x, 4))
21         y_values.append(round(y, 4))
22
23     return np.array(x_values), np.array(y_values)
```

```

24
25 x0 = 1
26 y0 = 1
27 h = 0.2
28 x_end = 2
29
30 x_vals, y_vals = modified_euler_method(f, x0, y0, h, x_end)
31
32 results = pd.DataFrame({'x': x_vals, 'y (Mod. Euler)': y_vals})
33 print("Results:")
34 print(results)

```

## Вывод

При использовании модифицированного метода Эйлера приближённое значение решения в точке  $x = 2$  равно  $y = 3.9547$ .

## 5 Сравнение точного решения и приближённых решений

Решение	$x = 1.2$	$x = 1.4$	$x = 1.6$	$x = 1.8$	$x = 2.0$	Абс. погрешн.	Относ. погрешн.
Точное	1.4400	1.9600	2.5600	3.2400	4.0000	-	-
Эйлер	1.4000	1.8867	2.4572	3.1100	3.8444	0.1556	3.89%
Мод. Эйлер	1.4433	1.9657	2.5675	3.2488	4.0100	0.0453	0.25%