# 2006年上海市普通高等学校春季招生考试

# 数 学 试 卷

**考生注意：1. 答卷前，考生务必将姓名、高考座位号、校验码等填写清楚.**

**2. 本试卷共有22道试题，满分150分. 考试时间120分钟.**

**一、填空题(本大题满分48分)本大题共有12题，只要求直接填写结果，每题填对得4分，否则一律得零分.**

1. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-2}{4n+3}=$_____.

2. 方程$\log_3(2x-1)=1$的解$x=$_____.

3. 函数$f(x)=3x+5$, $x\in[0,1]$的反函数$f^{-1}(x)=$_____.

4. 不等式$\dfrac{1-2x}{x+1}>0$的解集是_____.

5. 已知圆$C:(x+5)^2+y^2=r^2\,(r>0)$和直线$l:3x+y+5=0$. 若圆$C$与直线$l$没有公共点，则$r$的取值范围是_____.

6. 已知函数$f(x)$是定义在$(-\infty,+\infty)$上的偶函数. 当$x\in(-\infty,0)$时，$f(x)=x-x^4$，则当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)=$_____.

7. 电视台连续播放6个广告，其中含4个不同的商业广告和2个不同的公益广告，要求首尾必须播放公益广告，则共有_____种不同的播放方式(结果用数值表示).

8. 正四棱锥底面边长为4，侧棱长为3，则其体积为_____.

9. 在$\triangle ABC$中，已知$BC=8, AC=5$，三角形面积为12，则$\cos 2C=$_____.

10. 若向量$\vec{a}$、$\vec{b}$的夹角为$150°$，$|\vec{a}|=\sqrt{3}$，$|\vec{b}|=4$，则$|2\vec{a}+\vec{b}|=$_____.

11. 已知直线$l$过点$P(2,1)$，且与$x$轴、$y$轴的正半轴分别交于$A$、$B$两点，$O$为坐标原点，则三角形$OAB$面积的最小值为_____.

12. 同学们都知道，在一次考试后，如果按顺序去掉一些高分，那么班级的平均分将降低；反之，如果按顺序去掉一些低分，那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为：若有限数列$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足$a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，则_____(结论用数学式子表示).

**二、选择题(本大题满分16分)本大题共有4题，每题都给出四个结论，其中有且只有一个结论是正确的，必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内，选对得4分，否则一律得零分.**

13. 抛物线$y^2=4x$的焦点坐标为

(A) (0, 1). (B) (1, 0).

(C) (0, 2). (D) (2, 0).

[答]( )

14. 若$a$、$b$、$c\in\mathbf{R}$, $a>b$，则下列不等式成立的是

(A) $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$. (B) $a^2>b^2$.

(C) $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$.

(D) $a|c|>b|c|$.

[答]( )

15. 若$k\in\mathbf{R}$，则“$k>3$”是“方程$\dfrac{x^2}{k-3}-\dfrac{y^2}{k+3}=1$表示双曲线”的

(A) 充分不必要条件.

(B) 必要不充分条件.

(C) 充要条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

[答]( )

16. 若集合$A=\left\{y\left|y=x^{\frac{1}{3}},-1\leqslant x\leqslant 1\right.\right\}$，$B=\left\{y\left|y=2-\dfrac{1}{x},0<x\leqslant 1\right.\right\}$，则$A\cap B$等于……( )

(A) $(-\infty,1]$. (B) $[-1,1]$.


(C) $\varnothing$. (D) $\{1\}$.

[答]( )

**三、解答题(本大题满分86分)本大题共有6题，解答下列各题必须写出必要的步骤.**

17. **(本题满分12分)**

在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中, 已知$DA=DC=4, DD_1=3$, 求异面直线$A_1B$与$B_1C$所成角的大小(结果用反三角函数值表示).




18. **(本题满分12分)**

已知复数$w$满足$w-4=(3-2w)\mathrm{i}$ ($\mathrm{i}$为虚数单位), $z=\dfrac{5}{w}+|w-2|$, 求一个以$z$为根的实系数一元二次方程.

19. **(本题满分14分)本题共有2个小题, 第1小题满分8分, 第2小题满分6分.**


已知函数$f(x)=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)-2\cos x$, $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$.

(1) 若$\sin x=\dfrac{4}{5}$, 求函数$f(x)$的值;

(2) 求函数$f(x)$的值域.

20. **(本题满分14分)本题共有2个小题, 第1小题满分6分, 第2小题满分8分.**

学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图: 航天器运行(按顺时针方向)的轨迹方程为$\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{25}=1$, 变轨(即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线)后返回的轨迹是以$y$轴为对称轴、$M\left(0,\dfrac{64}{7}\right)$为顶点的抛物线的实线部分, 降落点为$D(8,0)$. 观测点$A(4,0)$、$B(6,0)$同时跟踪航天器.




(1) 求航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程;

(2) 试问: 当航天器在$x$轴上方时, 观测点$A$、$B$测得离航天器的距离分别为多少时, 应向航天器发出变轨指令?


21. **(本题满分16分)本题共有3个小题, 第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分6分.**

设函数$f(x)=|x^2-4x-5|$.

(1) 在区间$[-2,6]$上画出函数$f(x)$的图象;

(2) 设集合$A=\{x|f(x)\geqslant 5\}$, $B=(-\infty,-2]\cup[0,4]\cup[6,+\infty)$. 试判断集合$A$和$B$之间的关系, 并给出证明;

(3) 当$k>2$时, 求证: 在区间$[-1,5]$上, $y=k(x+3)$的图象位于函数$f(x)$图象的上方.




22. **(本题满分18分)本题共有3个小题, 第1小题满分4分, 第2小题满分8分, 第3小题满分6分.**

已知数列$a_1,a_2,\cdots,a_{30}$, 其中$a_1,a_2,\cdots,a_{10}$是首项为1, 公差为1的等差数列; $a_{10},a_{11},\cdots,a_{20}$是公差为$d$的等差数列; $a_{20},a_{21},\cdots,a_{30}$是公差为$d^2$的等差数列$(d\neq 0)$.

(1) 若$a_{20}=40$, 求$d$;

(2) 试写出$a_{30}$关于$d$的关系式, 并求$a_{30}$的取值范围;

(3) 续写已知数列, 使得$a_{30},a_{31},\cdots,a_{40}$是公差为$d^3$的等差数列, ……, 依次类推, 把已知数列推广为无穷数列. 提出同(2)类似的问题((2)应当作为特例), 并进行研究, 你能得到什么样的结论?

## 参考答案

**一、(第1至12题)**

1. $\dfrac{3}{4}$. 2. 2. 3. $\dfrac{1}{3}(x-5), x\in[5,8]$.

4. $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$. 5. $(0,\sqrt{10})$.

6. $-x-x^4$. 7. 48.

8. $\dfrac{16}{3}$. 9. $\dfrac{7}{25}$. 10. 2. 11. 4.

12. $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_m}{m}\leqslant\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

$(1 \leqslant m < n)$ 和 $\dfrac{a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_n}{n-m} \geqslant \dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ $(1 \leqslant m < n)$.

**二、(第13至16题)**

| 题号 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 代号 | B | C | A | B |

**三、(第17至22题)**


17. [解法一] 连接$A_1D$, $\because A_1D /\!/ B_1C$,

$\therefore \angle BA_1D$为异面直线$A_1B$与$B_1C$所成的角.

连接$BD$, 在$\triangle A_1DB$中, $A_1B = A_1D = 5$, $BD = 4\sqrt{2}$, 则

$$\cos\angle BA_1D = \frac{A_1B^2 + A_1D^2 - BD^2}{2\cdot A_1B\cdot A_1D} = \frac{25+25-32}{2\cdot 5\cdot 5} = \frac{9}{25}.$$

$\therefore$ 异面直线$A_1B$与$B_1C$所成角的大小为$\arccos\dfrac{9}{25}$.




[解法二]以$D$为坐标原点, 分别以$DA$、$DC$、$DD_1$所在直线为$x$轴、$y$轴、$z$轴, 建立空间直角坐标系. 则

$A_1(4,0,3)$、$B(4,4,0)$、$B_1(4,4,3)$、$C(0,4,0)$,

得$\overrightarrow{A_1B} = (0,4,-3)$, $\overrightarrow{B_1C} = (-4,0,-3)$.

设$\overrightarrow{A_1B}$与$\overrightarrow{B_1C}$的夹角为$\theta$,

则$\cos\theta = \dfrac{\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}|\cdot|\overrightarrow{B_1C}|} = \dfrac{9}{25}$,

$\therefore \overrightarrow{A_1B}$与$\overrightarrow{B_1C}$的夹角大小为$\arccos\dfrac{9}{25}$,

即异面直线$A_1B$与$B_1C$所成角的大小为$\arccos\dfrac{9}{25}$.

18. [解法一] $\because w(1+2\mathrm{i}) = 4+3\mathrm{i}$,

$\therefore w = \dfrac{4+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = 2-\mathrm{i}$,

$\therefore z = \dfrac{5}{2-\mathrm{i}} + |-\mathrm{i}| = 3+\mathrm{i}$.

若实系数一元二次方程有虚根$z = 3+\mathrm{i}$, 则必有共轭虚根$\bar{z} = 3-\mathrm{i}$.

$\because z+\bar{z} = 6$, $z\cdot\bar{z} = 10$,

$\therefore$ 所求的一个一元二次方程可以是$x^2 - 6x + 10 = 0$.

[解法二] 设$w = a+b\mathrm{i}$, $(a、b \in \mathbf{R})$

$a+b\mathrm{i} - 4 = 3\mathrm{i} - 2a\mathrm{i} + 2b$,

得$\begin{cases} a-4 = 2b, \\ b = 3-2a, \end{cases}$ $\therefore \begin{cases} a = 2, \\ b = -1, \end{cases}$

$\therefore w = 2-\mathrm{i}$,

以下解法同[解法一].

19. [解](1) $\because \sin x = \dfrac{4}{5}$, $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$,

$\therefore \cos x = -\dfrac{3}{5}$,

$$f(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x\right) - 2\cos x$$
$$= \sqrt{3}\sin x - \cos x$$
$$= \frac{4}{5}\sqrt{3} + \frac{3}{5}.$$

(2) $f(x) = 2\sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)$,

$\because \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi$,


$\therefore \dfrac{\pi}{3} \leqslant x - \dfrac{\pi}{6} \leqslant \dfrac{5\pi}{6}$, $\dfrac{1}{2} \leqslant \sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right) \leqslant 1$,

$\therefore$ 函数$f(x)$的值域为$[1,2]$.

20. [解](1) 设曲线方程为$y = ax^2 + \dfrac{64}{7}$,

由题意可知, $0 = a\cdot 64 + \dfrac{64}{7}$. $\therefore a = -\dfrac{1}{7}$.

$\therefore$ 曲线方程为$y = -\dfrac{1}{7}x^2 + \dfrac{64}{7}$.




(2) 设变轨点为$C(x,y)$, 根据题意可知

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{25} = 1, & (1) \\ y = -\dfrac{1}{7}x^2 + \dfrac{64}{7}, & (2) \end{cases}$$

得$4y^2 - 7y - 36 = 0$,

$y = 4$或$y = -\dfrac{9}{4}$(不合题意, 舍去).

$\therefore y = 4$.


得$x = 6$或$x = -6$(不合题意, 舍去).

$\therefore C$点的坐标为$(6,4)$,

$|AC| = 2\sqrt{5}$, $|BC| = 4$.

答:当观测点$A$、$B$测得$AC$、$BC$距离分别为$2\sqrt{5}$、4时, 应向航天器发出变轨指令.

21. [解](1)




(2) 方程$f(x)=5$的解分别是$2-\sqrt{14}, 0, 4$和$2+\sqrt{14}$, 由于$f(x)$在$(-\infty,-1]$和$[2,5]$上单调递减, 在$[-1,2]$和$[5,+\infty)$上单调递增, 因此

$A=(-\infty,2-\sqrt{14}]\cup[0,4]\cup[2+\sqrt{14},+\infty)$.

由于$2+\sqrt{14}<6$, $2-\sqrt{14}>-2$,

$\therefore B\subset A$.

(3) [解法一] 当$x\in[-1,5]$时,

$f(x)=-x^2+4x+5$.

$g(x)=k(x+3)-(-x^2+4x+5)$

$=x^2+(k-4)x+(3k-5)$

$=\left(x-\dfrac{4-k}{2}\right)^2-\dfrac{k^2-20k+36}{4}$,

$\because k>2, \therefore \dfrac{4-k}{2}<1$. 又$-1\leqslant x\leqslant 5$,

① 当$-1\leqslant\dfrac{4-k}{2}<1$, 即$2<k\leqslant 6$时, 取$x=\dfrac{4-k}{2}$, $g(x)_{\min}=-\dfrac{k^2-20k+36}{4}=-\dfrac{1}{4}[(k-10)^2-64]$.

$\because 16\leqslant(k-10)^2<64$,

$\therefore (k-10)^2-64<0$,

则$g(x)_{\min}>0$.

② 当$\dfrac{4-k}{2}<-1$, 即$k>6$时, 取$x=-1$, $g(x)_{\min}=2k>0$.

由①、②可知, 当$k>2$时, $g(x)>0$, $x\in[-1,5]$.

因此, 在区间$[-1,5]$上, $y=k(x+3)$的图象位于函数$f(x)$图象的上方.

[解法二] 当$x\in[-1,5]$时,

$f(x)=-x^2+4x+5$.

由$\begin{cases} y=k(x+3), \\ y=-x^2+4x+5, \end{cases}$得

$x^2+(k-4)x+(3k-5)=0$,

令$\Delta=(k-4)^2-4(3k-5)=0$, 解得$k=2$或$k=18$,

在区间$[-1,5]$上, 当$k=2$时, $y=2(x+3)$的图象与函数$f(x)$的图象只交于一点$(1,8)$; 当$k=18$时, $y=18(x+3)$的图象与函数$f(x)$的图象没有交点.

如图可知, 由于直线$y=k(x+3)$过点$(-3,0)$, 当$k>2$时, 直线$y=k(x+3)$是由直线$y=2(x+3)$绕点$(-3,0)$逆时针方向旋转得到. 因此, 在区间$[-1,5]$上, $y=k(x+3)$的图象位于函数$f(x)$图象的上方.

22. [解] (1) $a_{10}=10$. $a_{20}=10+10d=40$, $\therefore d=3$.

(2) $a_{30}=a_{20}+10d^2$

$=10(1+d+d^2)$ $(d\neq 0)$,

$a_{30}=10\left[\left(d+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}\right]$,

当$d\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$时,

$a_{30}\in\left[\dfrac{15}{2},+\infty\right)$.

(3) 所给数列可推广为无穷数列$\{a_n\}$, 其中$a_1,a_2,\cdots,a_{10}$是首项为1, 公差为1的等差数列, 当$n\geqslant 1$时, 数列$a_{10n},a_{10n+1},\cdots,a_{10(n+1)}$是公差为$d^n$的等差数列.

研究的问题可以是: 试写出$a_{10(n+1)}$关于$d$的关系式, 并求$a_{10(n+1)}$的取值范围.

研究的结论可以是: 由$a_{40}=a_{30}+10d^3=10(1+d+d^2+d^3)$, 依次类推可得$a_{10(n+1)}=10(1+d+\cdots+d^n)=\begin{cases} 10\times\dfrac{1-d^{n+1}}{1-d}, & d\neq 1, \\ 10(n+1), & d=1. \end{cases}$

当$d>0$时, $a_{10(n+1)}$的取值范围为$(10,+\infty)$等.