1994 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. 设全集 $I=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, 集合 $A=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 集合 $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$ (　)

(A) $\{0\}$　(B) $\{0,\ 1\}$

(C) $\{0,\ 1,\ 4\}$　(D) $\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是 (　)

(A) $(0,+\infty)$　(B) $(0,2)$　(C) $(1,+\infty)$　(D) $(0,1)$

3. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是 (　)

(A) $\dfrac{5}{2}$　(B) $\sqrt{5}$　(C) $\dfrac{3}{2}$　(D) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有 (　)

(A) $\tan\dfrac{\theta}{2}>\cot\dfrac{\theta}{2}$　(B) $\tan\dfrac{\theta}{2}<\cot\dfrac{\theta}{2}$　(C) $\sin\dfrac{\theta}{2}>\cos\dfrac{\theta}{2}$　(D) $\sin\dfrac{\theta}{2}<\cos\dfrac{\theta}{2}$

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟分裂一次 (一个分裂为两个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个可繁殖成 (　)

(A) 511 个　(B) 512 个　(C) 1023 个　(D) 1024 个

6. 在下列函数中, 以 $\dfrac{\pi}{2}$ 为周期的函数是 (　)

(A) $y=\sin 2x+\cos 4x$　(B) $y=\sin 2x\cos 4x$

(C) $y=\sin 2x+\cos 2x$　(D) $y=\sin 2x\cos 2x$

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为 (　)

(A) $32\sqrt{3}$　(B) $28\sqrt{3}$　(C) $24\sqrt{3}$　(D) $20\sqrt{3}$

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积是 (　)

(A) 1　(B) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　(C) 2　(D) $\sqrt{5}$

9. 如果复数 z 满足 $|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$, 那么 $|z+\mathrm{i}+1|$ 的最小值是 (　)

(A) 1　(B) $\sqrt{2}$　(C) 2　(D) $\sqrt{5}$

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有 (　)


(A) 1260 种　(B) 2025 种　(C) 2520 种　(D) 5040 种


11. 对于直线 m、n 和平面 α、β, $\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是 (　)


(A) $m\perp n$, $m/\!/\alpha$, $n/\!/\beta$　(B) $m\perp n$, $\alpha\cap\beta=m$, $n\subset\alpha$


(C) $m/\!/n$, $n\perp\beta$, $m\subset\alpha$　(D) $m/\!/n$, $m\perp\alpha$, $n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}$ $(-1\leqslant x\leqslant 0)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是 (　)

(A)


(B)


(C)


(D)


13. 已知过球面上 A、B、C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半, 且 $AB=BC=CA=2$, 则球面面积是 (　)

(A) $\dfrac{16}{9}\pi$　(B) $\dfrac{8}{3}\pi$　(C) 4π　(D) $\dfrac{64}{9}\pi$

14. 如果函数 $y=\sin 2x+a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x=-\dfrac{\pi}{8}$ 对称, 那么 $a=$(　)

(A) $\sqrt{2}$　(B) $-\sqrt{2}$　(C) 1　(D) -1

15. 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和, 如果 $f(x)=\lg(10^x+1)$, $x\in(-\infty,+\infty)$, 那么(　)

(A) $g(x)=x$, $h(x)=\lg(10^x+10^{-x}+2)$

(B) $g(x)=\dfrac{1}{2}[\lg(10^x+1)+x]$, $h(x)=\dfrac{1}{2}[\lg(10^x+1)-x]$

(C) $g(x)=\dfrac{x}{2}$, $h(x)=\lg(10^x+1)-\dfrac{x}{2}$

(D) $g(x)=-\dfrac{x}{2}$, $h(x)=\lg(10^x+1)+\dfrac{x}{2}$

16. 在 $(3-x)^7$ 的展开式中, x^5 的系数是_____. (用数字作答)

17. 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是_____, 圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

18. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{5}$, $\theta\in(0,\pi)$, 则 $\cot\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A、B 间的距离为 2, 圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$, AB 和圆锥的轴的距离为 1, 则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中, 因仪器和观察的误差, 使得 n 次测量分别得到 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 共 n 个数据, 我们规定所测量物理量的"最佳近似值"a 是这样一个量: 与其他近似值比较, a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定, 从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 推出的 $a=$_____.


21. 求函数 $y=\dfrac{\sin 3x\sin^3x+\cos 3x\cos^3x}{\cos^2 2x}+\sin 2x$ 的最小值.

22. 已知函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0$ 且 $a\neq 1, x\in\mathbf{R}_+)$, 若 x_1, $x_2\in\mathbf{R}_+$, 判断 $\dfrac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$ 与 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$ 的大小, 并加以证明.

23. 如图, 已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱, D 是 AC 中点.

(1) 证明: $AB_1/\!/$ 平面 DBC_1;

(2) 假设 $AB_1\perp BC_1$, $BC=2$, 求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.



24. 已知直角坐标平面上点 $Q(2,0)$ 和圆 C: $x^2+y^2=1$, 动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于常数 λ $(\lambda>0)$. 求动点 M 的轨迹方程, 说明它表示什么曲线.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若对于所有的自然数 n, 都有 $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$, 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.