2003 普通高等学校招生考试 (上海卷文)

一、填空题

1. 函数 $y=\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=$_____.

2. 若 $x=\frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x+\alpha)=1$ 的解, 其中 $\alpha\in(0,2\pi)$, 则 $\alpha=$_____.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5=3$, $a_6=-2$, 则 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=$_____.

4. 已知定点 $A(0,1)$, 点 B 在直线 $x+y=0$ 上运动, 当线段 AB 最短时, 点 B 的坐标是_____.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 若侧面与底面所成二面角的大小为 $60°$, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____. (结果用反三角函数值表示)

6. 设集合 $A=\{x\,|\,|x|<4\}$, $B=\{x\,|\,x^2-4x+3>0\}$, 则集合 $\{x\,|\,x\in A$ 且 $x\notin A\cap B\}=$_____.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$, 则 $\angle ABC=$_____. (结果用反三角函数值表示)

8. 若首项为 a_1, 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和, 则首项 a_1, 公比 q 的一组取值可以是 $(a_1,q)=$_____.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人、4 个法国人和 5 个中国人组成. 现从中随机选出两位作为成果发布人, 则此两人不属于同一个国家的概率为_____. (结果用分数表示)

10. 方程 $x^3+\lg x=18$ 的根 $x\approx$_____. (结果精确到 0.1)

11. 已知点 $A\left(0,\frac{2}{n}\right)$, $B\left(0,-\frac{2}{n}\right)$, $C\left(4+\frac{2}{n},0\right)$, 其中 n 为正整数. 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

12. 给出问题: F_1、F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{20}=1$ 的焦点, 点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9, 求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下: 双曲线的实轴长为 8, 由 $||PF_1|-|PF_2||=8$, 即 $|9-|PF_2||=8$, 得 $|PF_2|=1$ 或 17. 该学生的解答是否正确? 若正确, 请将他的解题依据填在下面空格内, 若不正确, 将正确的结果填在下面空格内_____.

二、选择题

13. 下列函数中, 既为偶函数又在 $(0,\pi)$ 上单调递增的是 ( )

(A) $y=\tan|x|$ (B) $y=\cos(-x)$

(C) $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ (D) $y=\left|\cot\frac{x}{2}\right|$

14. 在下列条件中, 可判断平面 α 与 β 平行的是 ( )

(A) α、β 都垂直于平面 γ

(B) α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等


(C) l, m 是 α 内两条直线, 且 $l\parallel\beta$, $m\parallel\beta$

(D) l, m 是两条异面直线, 且 $l\parallel\alpha$, $m\parallel\alpha$, $l\parallel\beta$, $m\parallel\beta$

15. 在 $P(1,1)$、$Q(1,2)$、$M(2,3)$ 和 $N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 四点中, 函数 $y=a^x$ 的图象与其反函数的图象的公共点只可能是点 ( )

(A) P (B) Q (C) M (D) N

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c,c]$ 上的奇函数, 其图象如图所示: 令 $g(x)=af(x)+b$, 则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是 ( )



(A) 若 $a<0$, 则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称

(B) 若 $a=-1$, $-2<b<0$, 则方程 $g(x)=0$ 有大于 2 的实根


(C) 若 $a\neq0$, $b=2$, 则方程 $g(x)=0$ 有两个实根

(D) 若 $a\geqslant1$, $b<2$, 则方程 $g(x)=0$ 有三个实根

三、解答题


17. 已知复数 $z_1=\cos\theta-\mathrm{i}$, $z_2=\sin\theta+\mathrm{i}$, 求 $|z_1\cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

18. 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A\perp$ 平面 $ABCD$, $AB=4$, $AD=2$. 若 $B_1D\perp BC$, 直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 $30°$, 求平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积.



19. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{x}-\log_2\frac{1+x}{1-x}$, 求函数 $f(x)$ 的定义域, 并讨论它的奇偶性和单调性.

20. 如图, 某隧道设计为双向四车道, 车道总宽 22 米, 要求通行车辆限高 4.5 米, 隧道全长 2.5 千米, 隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.
(1) 若最大拱高 h 为 6 米, 则隧道设计的拱宽 l 是多少?
(2) 若最大拱高 h 不小于 6 米, 则应如何设计拱高 h 和拱宽 l, 才能使半个椭圆形隧道的土方工程量最最小?
注: 半个椭圆的面积公式为 $S=\dfrac{\pi}{4}lh$, 柱体体积为: 底面积乘以高. 本题结果精确到 0.1 米



21. 在以 O 为原点的直角坐标系中, 点 $A(4,-3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB|=2|OA|$, 且点 B 的纵坐标大于零.
(1) 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标;
(2) 求圆 $x^2-6x+y^2+2y=0$ 关于直线 OB 对称的圆的方程;
(3) 是否存在实数 a, 使抛物线 $y=ax^2-1$ 上总有关于直线 OB 对称的两个点? 若不存在, 说明理由: 若存在, 求 a 的取值范围.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ (n 为正整数) 是首项是 a_1, 公比为 q 的等比数列.
(1) 求和: $a_1\mathrm{C}_2^0-a_2\mathrm{C}_2^1+a_3\mathrm{C}_2^2$, $a_1\mathrm{C}_3^0-a_2\mathrm{C}_3^1+a_3\mathrm{C}_3^2-a_4\mathrm{C}_3^3$;
(2) 由 (1) 的结果归纳概括出关于正整数 n 的一个结论, 并加以证明;
(3) 设 $q\neq 1$, S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 求: $S_1\mathrm{C}_n^0-S_2\mathrm{C}_n^1+S_3\mathrm{C}_n^2-S_4\mathrm{C}_n^3+\cdots+(-1)^nS_{n+1}\mathrm{C}_n^n$.