2003 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

一、选择题

1. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$, $\cos x=\frac{4}{5}$, 则 $\tan 2x=$ ( )

(A) $\frac{7}{24}$ (B) $-\frac{7}{24}$ (C) $\frac{24}{7}$ (D) $-\frac{24}{7}$

2. 圆锥曲线 $\rho=\frac{8\sin\theta}{\cos^2\theta}$ 的准线方程是 ( )

(A) $\rho\cos\theta=-2$ (B) $\rho\cos\theta=2$ (C) $\rho\sin\theta=2$ (D) $\rho\sin\theta=-2$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\leqslant 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$, 则 x_0 的取值范围是 ( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$ (D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

4. 函数 $y=2\sin x(\sin x+\cos x)$ 的最大值为 ( )

(A) $1+\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}-1$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

5. 已知圆 C: $(x-a)^2+(y-2)^2=4$ $(a>0)$ 及直线 l: $x-y+3=0$, 当直线 l 被 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时, a 的值等于 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $2-\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{2}-1$ (D) $\sqrt{2}+1$

6. 已知圆锥的底面半径为 R, 高为 $3R$, 在它的所有内接圆柱中, 全面积的最大值是 ( )

(A) $2\pi R^2$ (B) $\frac{9}{4}\pi R^2$ (C) $\frac{8}{3}\pi R^2$ (D) $\frac{3}{2}\pi R^2$

7. 已知方程 $(x^2-2x+m)(x^2-2x+n)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的的等差数列, 则 $|m-n|=$ ( )

(A) 1 (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{8}$

8. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7},0)$, 直线 $y=x-1$ 与其相交于 M、N 两点, MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$, 则此双曲线的方程是 ( )

(A) $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$ (B) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ (C) $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$ (D) $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$

9. 函数 $f(x)=\sin x$, $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ ( )

(A) $-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$ (B) $-\pi-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$

(C) $\pi+\arcsin x$, $x\in[-1,1]$ (D) $\pi-\arcsin x$, $x\in[-1,1]$

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(2,1)$ 和 $D(0,1)$, 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后, 依次反射到 CD、DA 和 AB 上的点 P_2、P_3 和 P_4 (入射角等于反射角), 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$, 若 $1<x_4<2$, 则 $\tan\theta$ 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\frac{1}{3},1\right)$ (B) $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ (C) $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{C_2^2+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_n^2}{n(C_2^1+C_3^1+C_4^1+\cdots+C_n^1)}=$ ( )

(A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) 6

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$, 四个顶点在同一球面上, 则此球的表面积为 ( )


(A) 3π (B) 4π (C) $3\sqrt{3}\pi$ (D) 6π

二、填空题


13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____.

14. 使 $\log_2(-x)<x+1$ 成立的 x 的取值范围是_____.

15. 如图, 一个地区分为 5 个行政区域, 现给地图着色, 要求相邻地区不得使用同一颜色, 现有 4 种颜色可供选择, 则不同的着色方法共有种_____. (以数字作答)



16. 下列 5 个正方体图形中, l 是正方体的一条对角线, 点 M、N、P 分别为其所在棱的中点, 能得出 $l\perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____. (写出所有符合要求的图形序号)



① ② ③ ④ ⑤


三、解答题

17. 已知复数 z 的辐角为 60°, 且 $|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项, 求 $|z|$.

18. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面是等腰直角三角形, $\angle ACB=90^\circ$, 侧棱 $AA_1=2$, D、E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点, 点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.


(1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小; (结果用反三角函数值表示)

(2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.




19. 已知 $c>0$, 设 P: 函数 $y=c^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; Q: 不等式 $x+|x-2c|>1$ 的解集为 $\mathbf{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确, 求 c 的取值范围.

20. 在某海滨城市附近海面有一台风, 据监测, 当前台风中心位于城市 O (如图) 的东偏南 θ $\left(\theta=\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{10}\right)$ 方向 300 km 的海面 P 处, 并以 20 km/h 的速度向西偏北 45° 方向移动, 台风侵袭的范围为圆形区域, 当前半径为 60 km, 并以 10 km/h 的速度不断增大, 问几小时后该城市开始受到台风的侵袭?



21. 已知常数 $a>0$, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=4a$, O 为 AB 的中点, 点 E、F、G 分别在 BC、CD、DA 上移动, 且 $\dfrac{BE}{BC}=\dfrac{CF}{CD}=\dfrac{DG}{DA}$, P 为 GE 与 OF 的交点 (如图), 问是否存在两个定点, 使 P 到这两点的距离的和为定值? 若存在, 求出这两点的坐标及此定值; 若不存在, 请说明理由.



22. 【甲】设 $\{a_n\}$ 是集合 $\{2^s+2^t\mid 0\leqslant s<t$ 且 $s,\ t\in\mathbf{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列, 即 $a_1=3$, $a_2=5$, $a_3=6$, $a_4=9$, $a_5=10$, $a_6=12$, $\cdots$. 将数列 $\{a_n\}$ 各项按照上小下大, 左小右大的原则写成如下的三角形数表:

$$\begin{array}{cccccc} & & & 3 & & \\ & & 5 & & 6 & \\ & 9 & & 10 & & 12 \\ - & & - & & - & & - \\ & & & \cdots\cdots & & \end{array}$$

(1) 写出这个三角形数表的第四行、第五行各数;

(2) 求 a_{100}.

【乙】设 $\{b_n\}$ 是集合 $\{2^r+2^s+2^t\mid 0\leqslant r<s<t$ 且 $r,\ s,\ t\in\mathbf{Z}\}$ 中所有的数从小到大排列成的数列, 已知 $b_k=1160$, 求 k.