2006 普通高等学校招生考试 (山东卷理)


一、选择题

1. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y),\ x \in A,\ y \in B\}$, 设集合 $A = \{0,\ 1\}$, $B = \{2,\ 3\}$, 则集合 $A \odot B$ 的所有元素之和为 ( )


(A) 0 (B) 6 (C) 12 (D) 18

2. 函数 $y = 1 + a^x$ $(0 < a < 1)$ 的反函数的图象大致是 ( )


(A)




(B)



(C)



(D)



3. 设 $f(x) = \begin{cases} 2e^{x-1}, & x < 2, \\ \log_3(x^2-1), & x \geqslant 2, \end{cases}$ 则不等式 $f(x) > 2$ 的解集为 ( )

(A) $(1,2) \cup (3,+\infty)$ (B) $(\sqrt{10},+\infty)$

(C) $(1,2) \cup (\sqrt{10},+\infty)$ (D) $(1,2)$

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 $A = \dfrac{\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}$, $b = 1$, 则 $c =$ ( )

(A) 1 (B) 2 (C) $\sqrt{3}-1$ (D) $\sqrt{3}$

5. 设向量 $\boldsymbol{a} = (1,-2)$, $\boldsymbol{b} = (-2,4)$, $\boldsymbol{c} = (-1,-2)$, 若表示向量 $4\boldsymbol{a}$, $4\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}$, $2(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{c})$, $\boldsymbol{d}$ 的有向线段首尾相接能构成四边形, 则向量 $\boldsymbol{d}$ 为 ( )

(A) $(2,6)$ (B) $(-2,6)$ (C) $(2,-6)$ (D) $(-2,-6)$

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$, 则 $f(6)$ 的值为 ( )

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

7. 在给定椭圆中, 过焦点且垂直于长轴的弦长为 $\sqrt{2}$, 焦点到相应准线的距离为 1, 则该椭圆的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

8. 设 p: $x^2 - x - 20 > 0$, q: $\dfrac{1-x^2}{|x|-2} < 0$, 则 p 是 q 的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

9. 已知集合 $A = \{5\}$, $B = \{1,\ 2\}$, $C = \{1,\ 3,\ 4\}$, 从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标, 则确定的不同点的个数为 ( )

(A) 33 (B) 34 (C) 35 (D) 36


10. 已知 $\left(x^3 - \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中第三项与第五项的系数之比为 $-\dfrac{3}{14}$, 其中 $\mathrm{i}^2 = -1$, 则展开式中常数项是 ( )

(A) $-45\mathrm{i}$ (B) $45\mathrm{i}$ (C) -45 (D) 45

11. 某公司招收男职员 x 名, 女职员 y 名, x 和 y 须满足约束条件 $\begin{cases} 5x - 11y \geqslant -22, \\ 2x + 3y \geqslant 9, \\ 2x \leqslant 11, \end{cases}$ 则 $z = 10x + 10y$ 的最大值是 ( )

(A) 80 (B) 85 (C) 90 (D) 95

12. 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB = 2DC = 2$, $\angle DAB = 60^\circ$, E 为 AB 的中点, 将 $\triangle ADE$ 与 $\triangle BEC$ 分别沿 ED、EC 向上折起, 使 A、B 重合于点 P, 则三棱锥 $P - DCE$ 的外接球的体积为 ( )



(A) $\dfrac{4\sqrt{3}\pi}{27}$ (B) $\dfrac{\sqrt{6}\pi}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{6}\pi}{8}$ (D) $\dfrac{\sqrt{6}\pi}{24}$


16. 下列四个命题中, 真命题的序号有_____. (写出所有真命题的序号)

① 将函数 $y = |x+1|$ 的图象按向量 $\boldsymbol{v} = (-1,0)$ 平移, 得到的图象对应的函数表达式为 $y = |x|$;

② 圆 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ 与直线 $y = \dfrac{1}{2}x$ 相交, 所得弦长为 2;

③ 若 $\sin(\alpha+\beta) = \dfrac{1}{2}$, $\sin(\alpha-\beta) = \dfrac{1}{3}$, 则 $\tan\alpha\cot\beta = 5$;

④ 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, P 为底面 $ABCD$ 内一动点, P 到平面 AA_1D_1D 的距离与到直线 CC_1 的距离相等, 则 P 点的轨迹是抛物线的一部分.



三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = A\sin^2(\omega x + \varphi)$ $\left(A > 0,\ \omega > 0,\ 0 < \varphi < \dfrac{\pi}{2}\right)$, 且 $y = f(x)$ 的最大值为 2, 其图象相邻两对称轴间的距离为 2, 并过点 $(1,2)$.

(1) 求 φ;


(2) 计算 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2008)$.

二、填空题

13. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+a} - \sqrt{n})} = 1$, 则常数 $a =$_____.


14. 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 过点 $P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 两点, 则 $y_1^2 + y_2^2$ 的最小值是_____.

15. 如图, 已知在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都相等, D 是 A_1C_1 的中点, 则直线 AD 与平面 B_1DC 所成角的正弦值为_____.



18. 设函数 $f(x)=ax-(a+1)\ln(x+1)$, 其中 $a\geqslant -1$, 求 $f(x)$ 的单调区间.

19. 如图, 已知平面 $A_1B_1C_1$ 平行于三棱锥 $V-ABC$ 的底面 ABC, 等边 $\triangle AB_1C$ 所在平面与底面 ABC 垂直, 且 $\angle ACB=90^\circ$, 设 $AC=2a$, $BC=a$.
(1) 求证直线 B_1C_1 是异面直线 AB_1 与 A_1C_1 的公垂线;
(2) 求点 A 到平面 VBC 的距离;
(3) 求二面角 $A-VB-C$ 的大小.



20. 袋中装有标有数字 1, 2, 3, 4, 5 的小球各 2 个, 从袋中任取 3 个小球, 按 3 个小球上最大数字的 9 倍计分, 每小球被取出的可能性都相等, 用 ξ 表示取出的 3 个小球上的最大数字, 求:
(1) 取出的 3 个小球上的数字互不相同的概率;
(2) 随机变量 ξ 的概率分布和数学期望;
(3) 计分介于 20 分到 40 分之间的概率.

21. 双曲线 C 与椭圆 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 有相同的焦点, 直线 $y=\sqrt{3}x$ 为 C 的一条渐近线.
(1) 求双曲线 C 的方程;
(2) 过点 $P(0,4)$ 的直线 l, 交双曲线 C 于 A, B 两点, 交 x 轴于 Q 点 (Q 点与 C 的顶点不重合). 当 $\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$, 且 $\lambda_1+\lambda_2=-\dfrac{8}{3}$ 时, 求 Q 点的坐标.

22. 已知 $a_1=2$, 点 (a_n,a_{n+1}) 在函数 $f(x)=x^2+2x$ 的图象上, 其中 $n=1$, 2, 3, $\cdots$.
(1) 证明数列 $\{\lg(1+a_n)\}$ 是等比数列;
(2) 设 $T_n=(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)$, 求 T_n 及数列 $\{a_n\}$ 的通项;
(3) 记 $b_n=\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{a_n+2}$, 求数列 $\{b_n\}$ 数列的前 n 项和 S_n, 并证明 $S_n+\dfrac{2}{3T_n-1}=1$.