# 2011 普通高等学校招生考试 (陕西卷理)

## 一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是向量, 命题"若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$"的逆命题是 ( )


(A) 若 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$ (B) 若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$


(C) 若 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$, 则 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$ (D) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$, 则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$


2. 设抛物线的顶点在原点, 准线方程为 $x=-2$, 则抛物线的方程是 ( )


(A) $y^2=-8x$ (B) $y^2=-4x$ (C) $y^2=8x$ (D) $y^2=4x$

3. 设函数 $f(x)$ $(x\in\mathbf{R})$ 满足 $f(-x)=f(x)$, $f(x+2)=f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象可能是 ( )

(A) 


(B) 



(C) 


(D) 


4. $(4^x-2^{-x})^6$ $(x\in\mathbf{R})$ 展开式中的常数项是 ( )

(A) $-20$ (B) $-15$ (C) 15 (D) 20

5. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积是 ( )




(A) $8-\dfrac{2\pi}{3}$ (B) $8-\dfrac{\pi}{3}$ (C) $8-2\pi$ (D) $\dfrac{2\pi}{3}$

6. 函数 $f(x)=\sqrt{x}-\cos x$ 在 $[0,+\infty)$ 内 ( )


(A) 没有零点 (B) 有且仅有一个零点

(C) 有且仅有两个零点 (D) 有无穷多个零点

7. 设集合 $M=\left\{y\,\middle|\, y=|\cos^2x-\sin^2x|,\ x\in\mathbf{R}\right\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,\left|x-\dfrac{1}{\mathrm{i}}\right|<\sqrt{2},\ \mathrm{i}\right.$ 为虚数单位, $\left.x\in\mathbf{R}\right\}$, 则 $M\cap N$ 为 ( )


(A) $(0,1)$ (B) $(0,1]$ (C) $[0,1)$ (D) $[0,1]$

8. 如图, $x_1$, $x_2$, $x_3$ 为某次考试三个评阅人对同一道题的独立评分, $p$ 为该题的最终得分, 当 $x_1=6$, $x_2=9$, $p=8.5$ 时, $x_3$ 等于 ( )




(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 7

9. 设 $(x_1,y_1)$, $(x_2,y_2)$, $\cdots$, $(x_n,y_n)$ 是变量 $x$ 和 $y$ 的 $n$ 个样本点, 直线 $l$ 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线 (如图), 以下结论中正确的是 ( )




(A) $x$ 和 $y$ 的相关系数为直线 $l$ 的斜率

(B) $x$ 和 $y$ 的相关系数在 0 到 1 之间

(C) 当 $n$ 为偶数时, 分布在 $l$ 两侧的样本点的个数一定相同

(D) 直线 $l$ 过点 $(\bar{x},\bar{y})$

10. 甲、乙两人一起去游"2011 西安世园会", 他们约定, 各自独立地从 1 到 6 号景点中任选 4 个进行游览, 每个景点参观 1 小时, 则最后一小时他们同在一个景点的概率是 ( )

(A) $\dfrac{1}{36}$ (B) $\dfrac{1}{9}$ (C) $\dfrac{5}{36}$ (D) $\dfrac{1}{6}$

## 二、填空题

11. 设 $(x)=\begin{cases}\lg x, & x>0,\\ x+\displaystyle\int_0^a 3t^2\mathrm{d}t, & x\leqslant 0.\end{cases}$ 若 $f(f(1))=1$, 则 $a=$_____.

12. 设 $n\in\mathbf{N}_+$, 一元二次方程 $x^2-4x+n=0$ 有整数根的充要条件是 $n=$_____.

13. 观察下列等式

$1=1$

$2+3+4=9$

$3+4+5+6+7=25$

$4+5+6+7+8+9+10=49$

$\cdots$


照此规律, 第 $n$ 个等式应为_____.

14. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树, 每人植一棵, 相邻两棵树相距 10 米, 开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边, 使每位同学从各自树坑出发前来领取树苗往返所走的路程总和最小, 这个最小值为_____米.

15. 三选一.

【A】若关于 $x$ 的不等式 $|a|\geqslant|x+1|+|x-2|$ 存在实数解, 则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【B】如图, $\angle B=\angle D$, $AE\perp BC$, $\angle ACD=90^\circ$, 且 $AB=6$, $AC=4$, $AD=12$, 则 $BE=$_____.





【C】直角坐标系 $xOy$ 中, 以原点为极点, $x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设点 $A$, $B$ 分别在曲线 $C_1$: $\begin{cases}x=3+\cos\theta,\\ y=4+\sin\theta,\end{cases}$ ($\theta$ 为参数) 和曲线 $C_2$: $\rho=1$ 上, 则 $|AB|$ 的最小值为_____.

## 三、解答题

16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle BAC=90^\circ$, $AD$ 是 $BC$ 上的高, 沿 $AD$ 把 $\triangle ABD$ 折起, 使 $\angle BDC=90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ADB\perp$ 平面 $BDC$;


(2) 设 $E$ 为 $BC$ 的中点, 求 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{DB}$ 夹角的余弦值.



17. 如图, 设 $P$ 是圆 $x^2+y^2=25$ 上的动点, 点 $D$ 是 $P$ 在 $x$ 轴上的投影, $M$ 为 $PD$ 上一点, 且 $|MD|=\dfrac{4}{5}|PD|$.

(1) 当 $P$ 在圆上运动时, 求点 $M$ 的轨迹 $C$ 的方程;

(2) 求过点 $(3,0)$ 且斜率为 $\dfrac{4}{5}$ 的直线被 $C$ 所截线段的长度.





18. 叙述并证明余弦定理.

19. 如图, 从点 $P_1(0,0)$ 作 $x$ 轴的垂线交曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 于点 $Q_1(0,1)$, 曲线在 $Q_1$ 点处的切线与 $x$ 轴交于点 $P_2$, 再从 $P_2$ 作 $x$ 轴的垂线交曲线于点 $Q_2$, 依次重复上述过程得到一系列点: $P_1$, $Q_1$; $P_2$, $Q_2$; $\cdots$; $P_n$, $Q_n$, 记 $P_k$ 点的坐标为 $(x_k,0)$ $(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$.

(1) 试求 $x_k$ 与 $x_{k-1}$ 的关系 $(2\leqslant k\leqslant n)$;

(2) 求 $|P_1Q_1|+|P_2Q_2|+|P_3Q_3|+\cdots+|P_nQ_n|$.





20. 如图, $A$ 地到火车站共有两条路径 $L_1$ 和 $L_2$, 据统计, 通过两条路径所用的时间互不影响, 所用时间落在各时间段内的频率如下表:

| 所用时间 (分钟) | $10\sim20$ | $20\sim30$ | $30\sim40$ | $40\sim50$ | $50\sim60$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择 $L_1$ 的人数 | 6 | 12 | 18 | 12 | 12 |
| 选择 $L_2$ 的人数 | 0 | 4 | 16 | 16 | 4 |

现甲、乙两人分别有 40 分钟和 50 分钟时间用于赶往火车站.

(1) 为了尽最大可能在各自允许的时间内赶到火车站, 甲和乙应如何选择各自的路径?

(2) 用 $X$ 表示甲、乙两人中在允许的时间内能赶到火车站的人数, 针对 (1) 的选择方案, 求 $X$ 的分布列和数学期望.




21. 设函数 $f(x)$ 定义在 $(0,+\infty)$ 上, $f(1)=0$, 导函数 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$, $g(x)=f(x)+f'(x)$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值;

(2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 的大小关系;

(3) 是否存在 $x_0>0$, 使得 $|g(x)-g(x_0)|<\dfrac{1}{x}$ 对任意 $x>0$ 成立? 若存在, 求出 $x_0$ 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.