# 2012 普通高等学校招生考试 (四川卷理)

## 一、选择题

1. $(1+x)^7$ 的展开式中 $x^2$ 的系数是 ( )

(A) 42 (B) 35 (C) 28 (D) 21

2. 复数 $\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{2\mathrm{i}}=$ ( )

(A) 1 (B) $-1$ (C) i (D) $-\mathrm{i}$

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9}{x-3}, & x<3,\\ \ln(x-2), & x\geqslant 3,\end{cases}$ 在 $x=3$ 处的极限是 ( )

(A) 不存在 (B) 等于 6 (C) 等于 3 (D) 等于 0

4. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 延长 $BA$ 至 $E$, 使 $AE=1$, 连接 $EC$, $ED$, 则 $\sin\angle CED=$ ( )




(A) $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ (B) $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$ (D) $\dfrac{\sqrt{5}}{15}$

5. 函数 $y=a^x-\dfrac{1}{a}$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 的图象可能是 ( )

(A)




(B)




(C)




(D)




6. 下列命题正确的是 ( )

(A) 若两条直线和同一个平面所成的角相等, 则这两条直线平行

(B) 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面平行

(C) 若一条直线平行于两个相交平面, 则这条直线与这两个平面的交线平行

(D) 若两个平面都垂直于第三个平面, 则这两个平面平行

7. 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中, 使 $\dfrac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\dfrac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 成立的充分条件是 ( )

(A) $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$ (B) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

(C) $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$ (D) $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

8. 已知抛物线关于 $x$ 轴对称, 它的顶点在坐标原点 $O$, 并且经过点 $M(2,y_0)$. 若点 $M$ 到该抛物线焦点的距离为 3, 则 $|OM|=$ ( )

(A) $2\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) 4 (D) $2\sqrt{5}$

9. 某公司生产甲、乙两种桶装产品. 已知生产甲产品 1 桶需耗 $A$ 原料 1 千克、$B$ 原料 2 千克; 生产乙产品 1 桶需耗 $A$ 原料 2 千克, $B$ 原料 1 千克. 每桶甲产品的利润是 300 元, 每桶乙产品的利润是 400 元. 公司在生产这两种产品的计划中, 要求每天消耗 $A$, $B$ 原料都不超过 12 千克. 通过合理安排生产计划, 从每天生产的甲、乙两种产品中, 公司共可获得的最大利润是 ( )

(A) 1800 元 (B) 2400 元 (C) 2800 元 (D) 3100 元

10. 如图, 半径为 $R$ 的半球 $O$ 的底面圆 $O$ 在平面 $\alpha$ 内, 过点 $O$ 作平面 $\alpha$ 的垂线交半球面于点 $A$, 过圆 $O$ 的直径 $CD$ 作与平面 $\alpha$ 成 $45^\circ$ 角的平面与半球面相交, 所得交线上到平面 $\alpha$ 的距离最大的点为 $B$, 该交线上的一点 $P$ 满足 $\angle BOP=60^\circ$, 则 $A$, $P$ 两点间的球面距离为 ( )




(A) $R\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ (B) $\dfrac{\pi R}{4}$ (C) $R\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\dfrac{\pi R}{3}$

11. 方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 $a$, $b$, $c\in\{-3,\ -2,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 且 $a$, $b$, $c$ 互不相同, 在所有这些方程所表示的曲线中, 不同的抛物线共有 ( )

(A) 60 条 (B) 62 条 (C) 71 条 (D) 80 条

12. 设函数 $f(x)=2x-\cos x$, $\{a_n\}$ 是公差为 $\dfrac{\pi}{8}$ 的等差数列, $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_5)=5\pi$, 则 $[f(a_3)]^2-a_1a_5=$ ( )

(A) 0 (B) $\dfrac{1}{16}\pi^2$ (C) $\dfrac{1}{8}\pi^2$ (D) $\dfrac{13}{16}\pi^2$

## 二、填空题

13. 设全集 $U=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, 集合 $A=\{a,\ b\}$, $B=\{b,\ c,\ d\}$, 则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$_____.

14. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $M$, $N$ 分别是 $CD$, $CC_1$ 的中点, 则异面直线 $A_1M$ 与 $DN$ 所成角的大小是_____.




15. 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左焦点为 $F$, 直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 $A$, $B$, 当 $\triangle FAB$ 的周长最大时, $\triangle FAB$ 的面积是_____.

16. 记 $[x]$ 为不超过实数 $x$ 的最大整数, 例如, $[2]=2$, $[1.5]=1$, $[-0.3]=-1$. 设 $a$ 为正整数, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=a$, $x_{n+1}=\left[\dfrac{x_n+\left[\dfrac{a}{x_n}\right]}{2}\right]$ $(n\in\mathbf{N}^*)$, 现有下列命题:

① 当 $a=5$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 的前 3 项依次为 5, 3, 2;

② 对数列 $\{x_n\}$ 都存在正整数 $k$, 当 $n\geqslant k$ 时总有 $x_n=x_k$;

③ 当 $n\geqslant 1$ 时, $x_n>\sqrt{a}-1$;

④ 对某个正整数 $k$, 若 $x_{k+1}\geqslant x_k$, 则 $x_n=[\sqrt{a}]$.

其中的真命题有_____. (写出所有真命题的编号)

## 三、解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统 (简称系统)$A$ 和 $B$, 系统 $A$ 和 $B$ 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\dfrac{1}{10}$ 和 $p$.

(1) 若在任意时刻至少有一个系统不发生故障的概率为 $\dfrac{49}{50}$, 求 $p$ 的值;

(2) 设系统 $A$ 在 3 次相互独立的检测中不发生故障的次数为随机变量 $\xi$, 求 $\xi$ 的概率分布列及数学期望 $E\xi$.

18. 函数 $f(x)=6\cos^2\dfrac{\omega x}{2}+\sqrt{3}\sin\omega x-3$ $(\omega>0)$ 在一个周期内的图象如图所示, $A$ 为图象的最高点, $B$, $C$ 为图象与 $x$ 轴的交点, 且 $\triangle ABC$ 为正三角形.

(1) 求 $\omega$ 的值及函数 $f(x)$ 的值域;

(2) 若 $f(x_0)=\dfrac{8\sqrt{3}}{5}$, 且 $x_0\in\left(-\dfrac{10}{3},\dfrac{2}{3}\right)$, 求 $f(x_0+1)$ 的值.




19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\angle APB=90^\circ$, $\angle PAB=60^\circ$, $AB=BC=CA$, 平面 $PAB\perp$ 平面 $ABC$.

(1) 求直线 $PC$ 与平面 $ABC$ 所成角的正弦值;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的余弦值.




20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$, 且 $a_2a_n=S_2+S_n$ 对一切正整数 $n$ 都成立.

(1) 求 $a_1$, $a_2$ 的值;

(2) 设 $a_1>0$, 数列 $\left\{\lg\dfrac{10a_1}{a_n}\right\}$ 的前 $n$ 项和为 $T_n$, 当 $n$ 为何值时, $T_n$ 最大? 并求出 $T_n$ 的最大值.

21. 如图, 动点 $M$ 与两定点 $A(-1,0)$, $B(2,0)$ 构成 $\triangle MAB$, 且 $\angle MBA=2\angle MAB$, 设动点 $M$ 的轨迹为 $C$.

(1) 求轨迹 $C$ 的方程;

(2) 设直线 $y=-2x+m$ 与 $y$ 轴相交于点 $P$, 与轨迹 $C$ 相交于点 $Q$、$R$, 且 $|PQ|<|PR|$, 求 $\dfrac{|PR|}{|PQ|}$ 的取值范围.




22. 已知 $a$ 为正实数, $n$ 为自然数, 抛物线 $y=-x^2+\dfrac{a^n}{2}$ 与 $x$ 轴正半轴相交于点 $A$, 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 $A$ 处的切线在 $y$ 轴上的截距.

(1) 用 $a$ 和 $n$ 表示 $f(n)$;

(2) 求对所有 $n$ 都有 $\dfrac{f(n)-1}{f(n)+1}\geqslant\dfrac{n^3}{n^3+1}$ 成立的 $a$ 的最小值;

(3) 当 $0<a<1$ 时, 比较 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{f(k)-f(2k)}$ 与 $\dfrac{27}{4}\cdot\dfrac{f(1)-f(n)}{f(0)-f(1)}$ 的大小, 并说明理由.