# 1992年全国普通高等学校招生统一考试

# 上海　数学试题

**考生注意：这份试卷共有26道试题，满分150分.**

**一、填空题　(本大题满分30分)本大题共有10题，只要求直接填写结果，每个空格填对得3分，否则一律得零分.**

1. 求值：$\cos\frac{5\pi}{8}\cos\frac{\pi}{8}=$_____.

2. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$的展开式中$\frac{1}{x^2}$的系数是_____(结果用数值表示).

3. 函数 $y=\sin^2x-\sin x\cos x+\cos^2x$ 的最大值是_____.

4. 方程 $\log_5(x+1)-\log_{\frac{1}{5}}(x-3)=1$ 的解是_____.

5. 计算$(\sqrt{3}+i)^6=$_____ ($i$ 是虚数单位).


6. 如果直线 $l$ 与直线 $x+y-1=0$ 关于 $y$ 轴对称，那么直线 $l$ 的方程是_____.

7. 已知圆台的下底面半径为 8cm，高为 6cm，母线与下底面成 45°的角，那么圆台的侧面积是_____$cm^2$(结果中保留 $\pi$).

8. 已知函数 $y=f(x)$的反函数是$f^{-1}(x)=\sqrt{x}-1(x\geqslant 0)$，那么函数 $y=f(x)$的定义域是_____.

9. 由 1,2,3,4,5 组成比 40000 小的没有重复数字的五位数的个数是_____(结果用数值表示).

10. 如图，直平行六面体 $A_1C$ 的上底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=60°$，侧面为正方形. $E$、$F$ 分别是 $A_1B_1$、$AA_1$ 的中点，$M$是





【编者注】 高考上海卷满分为 150 分，平均得分为 101 分；题量已比以往减少一个大题，并适当降低了压轴题的难度.

$AC$ 与 $BD$ 的交点，则 $EF$ 与 $B_1M$ 所成角的大小为_____(用反三角函数表示).

**二、选择题 (本大题满分30分)本大题共有10题，每题都给出代号为 $A$、$B$、$C$、$D$ 的四个结论，其中有且只有一个结论是正确的，必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内，选对得3分，不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内)，一律得零分.**

11. 当 $0<a<1$ 时，函数 $y=a^x$ 和 $y=(a-1)x^2$ 的图象只可能是……( )



(A) (B) (C) (D)

12. 下列函数中，在区间(0,1]上为减函数的是……( )

(A) $y=\log_{\frac{1}{2}}x$; (B) $y=x^{\frac{1}{2}}$;

(C) $y=\cos x$; (D) $y=\arcsin x$.

13. $\alpha$、$\beta$ 是两个不重合的平面，在下列条件中，可判定平面 $\alpha$ 与 $\beta$ 平行的是 ……( )

(A) $\alpha$、$\beta$ 都垂直平面 $\gamma$;

(B) $\alpha$ 内不共线的三点到 $\beta$ 的距离都相等;

(C) $l$、$m$ 是 $\alpha$ 内两条直线，且 $l\parallel\beta$, $m\parallel\beta$;

(D) $l$、$m$ 是两条异面直线，且 $l\parallel\alpha, m\parallel\alpha, l\parallel\beta, m\parallel\beta$.

14. 下列函数中，最小正周期为 $\pi$ 的偶函数是……( )

(A) $y=\sin 2x$; (B) $y=\cos\frac{x}{2}$;

(C) $y=\sin 2x+\cos 2x$; (D) $y=\frac{1-\operatorname{tg}^2 x}{1+\operatorname{tg}^2 x}$.

15. 在方程 $\begin{cases}x=\sin\theta,\\ y=\cos 2\theta\end{cases}$ ($\theta$ 为参数) 所表示的曲线上的一个点的坐标是……( )

(A) $(2,-7)$; (B) $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$;

(C) $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$; (D) $(1,0)$.

16. 抛物线 $(y+2)^2=4(x+1)$ 的焦点坐标是……( )

(A) $(0,-2)$; (B) $(2,2)$;

(C) $(1,-2)$; (D) $(3,2)$.

17. 下列命题中的真命题是……( )

(A) 各侧面都是矩形的棱柱是长方体;

(B) 有两个相邻侧面是矩形的棱柱是直棱柱;

(C) 各侧面都是等腰三角形的四棱锥是正四棱锥;

(D) 有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体是四棱台.

18. 函数 $y=\arccos\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的值域是…( )

(A) $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$; (B) $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$;

(C) $[0,\pi)$; (D) $(0,\pi]$.

19. 在极坐标系中，与圆 $\rho=4\sin\theta$ 相切的一条直线的方程是……( )

(A) $\rho\sin\theta=2$; (B) $\rho\cos\theta=2$;

(C) $\rho\cos\theta=4$; (D) $\rho\cos\theta=-4$.

20. 设集合 $M=\{x|x>2\}$, $P=\{x|x<3\}$，那么"$x\in M$ 或 $x\in P$"是"$x\in M\cap P$"的 …( )

(A) 充分条件但非必要条件;

(B) 必要条件但非充分条件;

(C) 充分必要条件;

(D) 非充分条件也非必要条件.

**三、(本大题满分36分) 本大题共有3题，解下列各题必须写出必要的步骤.**

21. **(本题满分 12 分)**

已知 $\cos 2\alpha=\frac{7}{25}$, $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\beta=-\frac{5}{13}$, $\beta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$,

求 $\alpha+\beta$(用反三角函数表示).

22. **(本题满分 12 分)**

设 $w=z+ai$，其中 $a$ 是实数，$i$ 是虚数单位，$z=\frac{(1-4i)(1+i)+2+4i}{3+4i}$，且 $|w|\leqslant\sqrt{2}$，求 $w$ 的辐角主值 $\theta$ 的取值范围.

23. **(本题满分 12 分)**

设动直线 $l$ 垂直于 $x$ 轴，且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 $A$、$B$ 两点，$P$ 是 $l$ 上满足 $|PA|\cdot|PB|=1$ 的点，求点 $P$ 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

**四、（本大题满分 54 分）本大题共有 3 题，解下列各题必须写出必要的步骤.**


**24.（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 6 分.**

如图，圆锥的轴截面为等腰直角三角形 $SAB$，$Q$ 为底面圆周上一点.

(1) 如果 $QB$ 的中点为 $C$，$OH\perp SC$，求证 $OH\perp$ 平面 $SBQ$；

(2) 如果 $\angle AOQ=60°$，$QB=2\sqrt{3}$，求此圆锥的体积；

(3) 如果二面角 $A$-$SB$-$Q$ 的大小为 $\operatorname{arc\,tg}\frac{\sqrt{6}}{3}$，求 $\angle AOQ$ 的大小.




**25.（本题满分18分） 本题共有2个小题，第 1 小题满分 9 分，第 2 小题满分 9 分.**


已知数列 $\{a_n\}$，$a_n>0(n\in N)$，它的前 $n$ 项的和记为 $S_n$.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 是一个首项为 $a$，公比为 $q$ $(0<q\leqslant 1)$ 的等比数列，且 $G_n=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2$ $(n\in N)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{G_n}$；

(2) 如果 $S_1^2, S_2^2, \cdots, S_n^2, \cdots$ 是一个首项为 3，公差为 1 的等差数列，试比较 $S_n$ 与 $3na_n(n\in N)$ 的大小.

**26.（本题满分 20 分）**

如图，已知双曲线 $C$：$(1-a^2)x^2+a^2y^2-a^2=0$（参数 $a>0$）. 若 $C$ 的上半支的顶点为 $A$，且与直线 $y=-x$ 交于点 $P$. 以 $A$ 为焦点，$M(0,m)$ 为顶点的开口向下的抛物线通过点 $P$. 当 $C$ 的一条渐近线的斜率在区间 $\left[\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 上变化时，求直线 $PM$ 斜率的最大值.




# 解　答

**一、第 1 题至第 10 题.**

1. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$；　2. 56；　3. $\frac{3}{2}$；　4. 4；

5. $-64$；　6. $x-y+1=0$；　7. $60\sqrt{2}\pi$；

8. $[-1,+\infty)$；　9. 72；

10. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$.

**二、第 11 题至第 20 题.**

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | D | C | D | D | C | A | B | A | B | B |

三、21. [解]　$\cos\alpha=\sqrt{\frac{1+\cos 2\alpha}{2}}=\frac{4}{5}$，

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{3}{5},$$

$$\cos\beta=-\sqrt{1-\sin^2\beta}=-\frac{12}{13},$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=-\frac{33}{65}.$$

$\because\ \pi<\alpha+\beta<2\pi$，

$$\therefore\quad \alpha+\beta=\pi+\arccos\frac{33}{65}.$$

22. [解]　$z=\dfrac{(1-4i)(1+i)+2+4i}{3+4i}$

$$=\frac{7+i}{3+4i}$$

$$=1-i.$$

因为 $w=z+ai=1+(a-1)i$, $|w|\leqslant\sqrt{2}$,

所以 $\sqrt{1+(a-1)^2}\leqslant\sqrt{2}$,

解得 $0\leqslant a\leqslant 2$,

又由 $w=1+(a-1)i$,得 $\operatorname{tg}\theta=a-1$. 因此


$$-1\leqslant\operatorname{tg}\theta\leqslant 1.$$

所以 $\theta$ 的取值范围是

$$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{7\pi}{4},\ 2\pi\right).$$

23. [解] 设点 $P$ 的坐标为 $(x,y)$,点 $A$ 的坐标为 $(x,y_1)$. 于是,点 $B$ 的坐标为 $(x,\ -y_1)$. 由于 $A$、$B$ 两点在椭圆上,所以

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y_1^2}{2}=1. \qquad ①$$




又由 $1-\frac{x^2}{4}=\frac{y_1^2}{2}$,得 $-2<x<2$.

$\because$ $|PA|=|y_1-y|$, $|PB|=|y_1+y|$,

$|PA|\cdot|PB|=1$, $\therefore$ $|y_1-y||y_1+y|=1$,

即 $y_1^2-y^2=\pm 1$.

把 $y_1^2=y^2+1$ 和 $y_1^2=y^2-1$ 分别代入①式,得点 $P$ 的轨迹方程是

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1,$$

和 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1\ (-2<x<2)$.

因此,所求轨迹是椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$,以及椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 夹在两直线 $x=2$, $x=-2$ 之间的部分.

四、24. [解] (1) 连结 $OC$, $\because SQ=SB$, $OQ=OB$, $QC=CB$. $\therefore QB\perp SC$, $QB\perp OC$,


$\therefore$ $QB\perp$ 平面 $SOC$.

$\because$ $OH\subset$ 平面 $SOC$,

$\therefore$ $QB\perp OH$.

又 $OH\perp SC$,

$\therefore$ $OH\perp$ 平面 $SBQ$.




(2) 连结 $AQ$. $\because$ $Q$ 为圆周上一点,

$AB$ 为直径, $\therefore AQ\perp QB$.

在 $Rt\triangle AQB$ 中, $\angle QBA=30°$, $QB=2\sqrt{3}$,

$$\therefore\ AB=\frac{2\sqrt{3}}{\cos 30°}=4.$$

$\because$ $\triangle SAB$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore\ SO=\frac{1}{2}AB=2,$$

$$\therefore\quad V_{圆锥}=\frac{1}{3}\pi\cdot OA^2\cdot SO=\frac{8}{3}\pi.$$

(3) 过 $Q$ 作 $QM\perp AB$,垂足为 $M$.

$\because$ 平面 $SAB\perp$ 平面 $ABQ$,

$\therefore$ $QM\perp$ 平面 $SAB$.

过 $M$ 作 $MP\perp SB$,垂足为 $P$,连结 $PQ$,则 $QP\perp SB$(三垂线定理).

$\therefore$ $\angle MPQ$ 是二面角 $A$-$SB$-$Q$ 的平面角,

$$\angle MPQ=\operatorname{arc\,tg}\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

设圆锥底面半径为 $R$, $\angle AOQ=\alpha$. 在 $Rt\triangle OMQ$ 中,

$$QM=R\sin\alpha,\ OM=R\cos\alpha.$$

在 $Rt\triangle MPB$ 中, $\angle PBM=45°$, $MB=R(1+\cos\alpha)$,

$$\therefore\quad MP=\frac{\sqrt{2}}{2}R(1+\cos\alpha).$$

$$\because\quad \operatorname{tg}\angle MPQ=\frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\therefore\quad \frac{R\sin\alpha}{\frac{\sqrt{2}}{2}R(1+\cos\alpha)}=\frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{3},$$

即 $$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\therefore\ \angle AOQ=60°.$$

25. (1) [解一] 当 $q=1$ 时, $S_n=na$, $G_n$

$=na^2$.

$\because\ a\neq 0,\quad \therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{G_n}=\dfrac{1}{a}$.

当 $0<q<1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a}{1-q}.$$

$\because\ \dfrac{a_n^2}{a_{n-1}^2}=q^2<1$,

$\therefore$ $\{a_n^2\}$是首项为 $a^2$，公比为 $q^2$ 的等比数列，

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty}G_n=\frac{a^2}{1-q^2}.$$

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{G_n}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}S_n}{\lim\limits_{n\to\infty}G_n}=\frac{1+q}{a}.$$

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{G_n}=\begin{cases}\dfrac{1}{a}, & q=1.\\ \dfrac{1+q}{a}, & 0<q<1.\end{cases}$$

[解二] 当 $q=1$ 时，同解一得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{G_n}=\frac{1}{a}.$$

当 $0<q<1$ 时，$S_n=\dfrac{a(1-q^n)}{1-q}$.

同解一得$\{a_n^2\}$是首项为 $a^2$，公比为 $q^2$ 的等比数列，

$$\therefore\quad G_n=\frac{a^2(1-q^{2n})}{1-q^2}.$$

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{G_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+q}{a(1+q^n)}=\frac{1+q}{a}.$$

结论同解一.

(2) [解] 由题设知 $S_1=a_1=\sqrt{3}$.

$S_n^2=3+(n-1)=n+2\ (n\in N)$.

$\because\ S_n>0,\quad \therefore\ S_n=\sqrt{n+2}$.

$a_n=S_n-S_{n-1}=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\ (n\geqslant 2)$.

当 $n=1$ 时，$S_1<3a_1$.

当 $n\geqslant 2$ 时，

$$S_n-3na_n=\sqrt{n+2}-3n(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})$$
$$=3n\sqrt{n+1}-(3n-1)\sqrt{n+2}.$$

由 $(3n\sqrt{n+1})^2-[(3n-1)\sqrt{n+2}]^2$

$$=-3n^2+11n-2$$
$$=-3\left(n-\frac{11-\sqrt{97}}{6}\right)\left(n-\frac{11+\sqrt{97}}{6}\right),$$

可得当 $n=2,3$ 时，$S_n>3na_n$；当 $n\geqslant 4\ (n\in N)$时，$S_n<3na_n$.

综上所述，得

当 $n=1$ 及 $n\geqslant 4(n\in N)$时，$S_n<3na_n$；

当 $n=2,3$ 时，$S_n>3na_n$.

26. [解一] 因为$(1-a^2)x^2+a^2y^2-a^2=0$是双曲线，所以 $1-a^2<0$，从而它可表为

$$y^2-\frac{x^2}{\dfrac{a^2}{a^2-1}}=1.$$

双曲线的两条渐近线的斜率为 $\pm\dfrac{\sqrt{a^2-1}}{a}$，

于是$\dfrac{\sqrt{3}}{2}\leqslant\dfrac{\sqrt{a^2-1}}{a}\leqslant\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，即 $4\leqslant a^2\leqslant 9$，又由 $a>0$ 得 $a$ 的取值范围是$[2,3]$.

把 $y=-x$ 代入双曲线方程，得点 $P$ 的坐标为$(-a,a)$.

双曲线上半支的顶点为 $A(0,1)$.

以 $A(0,1)$为焦点，$M(0,m)$为顶点的开口向下的抛物线方程为

$$x^2=-4(m-1)(y-m).$$

因为 $P(-a,a)$在抛物线上，所以

$$a^2=-4(m-1)(a-m),\qquad ①$$

即 $m^2-(1+a)m+\left(a-\dfrac{a^2}{4}\right)=0$. 解得

$$m=\frac{1}{2}(1+a\pm\sqrt{1-2a+2a^2}),$$

根据题设抛物线的顶点位置，由①可知 $m>1$，$m>a$，所以 $m>\dfrac{1+a}{2}$.

因此只取

$$m=\frac{1}{2}(1+a+\sqrt{1-2a+2a^2}).$$

直线 $PM$ 的斜率为

$$k=\frac{m-a}{0-(-a)}$$
$$=\frac{1}{2a}(1-a+\sqrt{1-2a+2a^2}),\qquad ②$$

在②中，令 $u=\dfrac{1}{a}$，有

$$k=\frac{1}{2}(u-1+\sqrt{u^2-2u+2})$$

$$=\frac{1}{2}[\sqrt{(1-u)^2+1}-(1-u)]$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{(1-u)^2+1}+(1-u)}.$$

在[2,3]上，$u$ 是减函数，$1-u$ 是增函数. 由 $1-u>0$，可知$(1-u)^2$也是增函数，从而 $k$ 在[2,3]上是减函数. 故当 $a=2$ 时，$k$ 取最大值

$$k_{max}=\frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

[解二] 同解一得双曲线方程为

$$y^2-\frac{x^2}{\frac{a^2}{a^2-1}}=1.$$

$a$ 的取值范围为 [2, 3]，

点 $P$ 的坐标为$(-a,a)$.

以 $A$ 为焦点，$M$ 为顶点的开口向下的抛物线方程为

$$x^2=-4(m-1)(y-m).$$

$$a^2=-4(m-1)(a-m), \qquad ①$$

$$k=\frac{m-a}{a}, \qquad ②$$

由②得 $m=ka+a$，代入①得

$$a^2=4(ka+a-1)ka.$$

因为 $a\neq 0$，所以

$$(4k^2+4k-1)a=4k.$$

根据题设抛物线顶点的位置，由①可知 $m>a$，所以 $k>0$. 因此

$$4k^2+4k-1>0.$$

这样 $\quad a=4k/(4k^2+4k-1).$

由 $a$ 的取值范围，得

$$2\leqslant\frac{4k}{4k^2+4k-1}\leqslant 3. \qquad ③$$

由 $4k^2+4k-1>0$，得 $k>\frac{\sqrt{2}-1}{2}$. 于是，可由③解得

$$\frac{\sqrt{13}-2}{6}\leqslant k\leqslant\frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

因此 $k_{max}=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.