2009 普通高等学校招生考试 (山东卷文)

一、选择题

1. 集合 $A=\{0,\ 2,\ a\}$, $B=\{1,\ a^2\}$. 若 $A\cup B=\{0,\ 1,\ 2,\ 4,\ 16\}$, 则 a 的值为 (　)

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 4

2. 复数 $\dfrac{3-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 等于 (　)


(A) $1+2\mathrm{i}$　　(B) $1-2\mathrm{i}$　　(C) $2+\mathrm{i}$　　(D) $2-\mathrm{i}$

3. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 所得图象的函数解析式是 (　)

(A) $y=\cos 2x$　　(B) $y=2\cos^2 x$

(C) $y=1+\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$　　(D) $y=2\sin^2 x$

4. 一空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 (　)




(A) $2\pi+2\sqrt{3}$　　(B) $4\pi+2\sqrt{3}$　　(C) $2\pi+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　(D) $4\pi+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$


5. 在 $\mathbf{R}$ 上定义运算 $\odot$: $a\odot b=ab+2a+b$, 则满足 $x\odot(x-2)<0$ 的实数 x 的取值范围为 (　).


(A) $(0,2)$　　(B) $(-2,1)$


(C) $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$　　(D) $(-1,2)$

6. 函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}$ 的图象大致为 (　)

(A)


(B)


(C)


(D)


7. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\begin{cases}\log_2(4-x), & x\leqslant 0,\\ f(x-1)-f(x-2), & x>0,\end{cases}$ 则 $f(3)$ 的值为 (　)

(A) -1　　(B) -2　　(C) 1　　(D) 2

8. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点, $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BP}$, 则 (　)

(A) $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=\mathbf{0}$　　(B) $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$

(C) $\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}=\mathbf{0}$　　(D) $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$

9. 已知 α, β 表示两个不同的平面, m 为平面 α 内的一条直线, 则"$\alpha\perp\beta$"是"$m\perp\beta$"的 (　)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

10. 设斜率为 2 的直线 l 过抛物线 $y^2=ax$ $(a\neq 0)$ 的焦点 F, 且和 y 轴交于点 A. 若 $\triangle OAF$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线方程为 (　)

(A) $y^2=\pm 4x$　　(B) $y^2=\pm 8x$　　(C) $y^2=4x$　　(D) $y^2=8x$

11. 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上随机取一个数 x, $\cos x$ 的值介于 0 到 $\dfrac{1}{2}$ 之间的概率为 (　)

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{2}{\pi}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

12. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x-4)=-f(x)$, 且在区间 $[0,2]$ 上是增函数, 则 (　)

(A) $f(-25)<f(11)<f(80)$　　(B) $f(80)<f(11)<f(-25)$


(C) $f(11)<f(80)<f(-25)$　　(D) $f(-25)<f(80)<f(11)$

二、填空题

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3=7$, $a_5=a_2+6$, 则 $a_6=$_____.

14. 若函数 $f(x)=a^x-x-a$ $(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

15. 执行如图的程序框图, 输出的 $T=$_____.



16. 某公司租赁甲、乙两种设备生产 A, B 两类产品, 甲种设备每天能生产 A 类产品 5 件和 B 类产品 10 件, 乙种设备每天能生产 A 类产品 6 件和 B 类产品 20 件. 已知设备甲每天的租赁费为 200 元, 设备乙每天的租赁费为 300 元. 现该公司至少要生产 A 类产品 50 件, B 类产品 140 件, 所需租赁费最少为_____元.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x\cos^2\dfrac{\varphi}{2}+\cos x\sin\varphi-\sin x$ $(0<\varphi<\pi)$ 在 $x=\pi$ 处取最小值.


(1) 求 φ 的值;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边. 已知 $a=1$, $b=\sqrt{2}$, $f(A)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 求角 C.

18. 如图, 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AB\parallel CD$, $AB=4$, $BC=CD=2$, $AA_1=2$, E、E_1 分别是棱 AD、AA_1 的中点.

(1) 设 F 是棱 AB 的中点, 证明: 直线 $EE_1\parallel$ 平面 FCC_1;

(2) 证明: 平面 $D_1AC\perp$ 平面 BB_1C_1C.



19. 一汽车厂生产 A, B, C 三类轿车, 每类轿车均有舒适型和标准型两种型号, 某月的产量如下表 (单位: 辆) :

	轿车 A	轿车 B	轿车 C
舒适型	100	150	z
标准型	300	450	600

按类型分层抽样的方法在这个月生产的轿车中抽取 50 辆, 其中有 A 类轿车 10 辆.

(1) 求 z 的值;

(2) 用分层抽样的方法在 C 类轿车中抽取一个容量为 5 的样本. 将该样本看成一个总体, 从中任取 2 辆, 求至少有 1 辆舒适型轿车的概率;

(3) 用随机抽样的方法从 B 类舒适型轿车中抽取 8 辆, 经检测它们的得分如下: 9.4, 8.6, 9.2, 9.6, 8.7, 9.3, 9.0, 8.2. 把这 8 辆轿车的得分看作一个总体, 从中任取一个数, 求该数与样本平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$, 点 (n,S_n) 均在函数 $y=b^x+r$ ($b>0$ 且 $b\neq1$, b, r 均为常数) 的图象上.

(1) 求 r 的值;

(2) 当 $b=2$ 时, 记 $b_n=\dfrac{n+1}{4a_n}$ ($n\in\mathbf{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}ax^3+bx^2+x+3$, 其中 $a\neq0$.

(1) 当 a, b 满足什么条件时, $f(x)$ 取得极值?

(2) 已知 $a>0$, 且 $f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上单调递增, 试用 a 表示出 b 的取值范围.

22. 设 $m\in\mathbf{R}$, 在平面直角坐标系中, 已知向量 $\boldsymbol{a}=(mx,y+1)$, 向量 $\boldsymbol{b}=(x,y-1)$, $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$, 动点 $M(x,y)$ 的轨迹为 E.

(1) 求轨迹 E 的方程, 并说明该方程所表示曲线的形状;

(2) 已知 $m=\dfrac{1}{4}$. 证明: 存在圆心在原点的圆, 使得该圆的任意一条切线与轨迹 E 恒有两个交点 A, B, 且 $OA\perp OB$ (O 为坐标原点), 并求出该圆的方程;

(3) 已知 $m=\dfrac{1}{4}$. 设直线 l 与圆 C: $x^2+y^2=R^2$ ($1<R<2$) 相切于 A_1, 且 l 与轨迹 E 只有一个公共点 B_1. 当 R 为何值时, $|A_1B_1|$ 取得最大值? 并求最大值.