# 2010 普通高等学校招生考试 (福建卷理)

## 一、选择题

1. 计算 $\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ$ 的结果等于 ( )

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 以抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为圆心, 且过坐标原点的圆的方程为 ( )

(A) $x^2+y^2+2x=0$ (B) $x^2+y^2+x=0$

(C) $x^2+y^2-x=0$ (D) $x^2+y^2-2x=0$


3. 设等差数列 $\{a_n\}$ 前 $n$ 项和为 $S_n$. 若 $a_1=-11$, $a_4+a_6=-6$, 则当 $S_n$ 取最小值时, $n$ 等于 ( )

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\leqslant 0,\\ -2+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 的零点个数为 ( )


(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

5. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 $i$ 值等于 ( )




(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

6. 如图, 若 $\Omega$ 是长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 被平面 $EFGH$ 截去几何体 $EFGHB_1C_1$ 后得到的几何体, 其中 $E$ 为线段 $A_1B_1$ 上异于 $B_1$ 的点, $F$ 为线段 $BB_1$ 上异于 $B_1$ 的点, 且 $EH\parallel A_1D_1$, 则下列结论中不正确的是( )




(A) $EH\parallel FG$ (B) 四边形 $EFGH$ 是矩形

(C) $\Omega$ 是棱柱 (D) $\Omega$ 是棱台

7. 若点 $O$ 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ $(a>0)$ 的中心和左焦点, 点 $P$ 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的取值范围为 ( )

(A) $\left[3-2\sqrt{3},+\infty\right)$ (B) $\left[3+2\sqrt{3},+\infty\right)$

(C) $\left[-\frac{7}{4},+\infty\right)$ (D) $\left[\frac{7}{4},+\infty\right)$

8. 设不等式组 $\begin{cases}x\geqslant 1,\\ x-2y+3\geqslant 0,\\ y\geqslant x\end{cases}$ 所表示的平面区域是 $\Omega_1$, 平面区域 $\Omega_2$ 与 $\Omega_1$ 关于直线 $3x-4y-9=0$ 对称. 对于 $\Omega_1$ 中的任意点 $A$ 与 $\Omega_2$ 中的任意点 $B$, $|AB|$ 的最小值等于 ( )

(A) $\frac{28}{5}$ (B) 4 (C) $\frac{12}{5}$ (D) 2

9. 对于复数 $a$, $b$, $c$, $d$, 若集合 $S=\{a,\ b,\ c,\ d\}$ 具有性质"对任意 $x$, $y\in S$, 必有 $xy\in S$", 则当 $\begin{cases}a=1,\\ b^2=1,\\ c^2=b\end{cases}$ 时, $b+c+d$ 等于 ( )

(A) 1 (B) $-1$ (C) 0 (D) i

10. 对于具有相同定义域 $D$ 的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 若存在函数 $h(x)=kx+b$ ($k$, $b$ 为常数), 对任给的正数 $m$, 存在相应的 $x_0\in D$, 使得当 $x\in D$ 且 $x>x_0$ 时, 总有 $\begin{cases}0<f(x)-h(x)<m,\\ 0<h(x)-g(x)<m,\end{cases}$ 则称直线 $l$: $y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的"分渐近线". 给出定义域均为 $D=\{x\mid x>1\}$ 的四组函数如下:

① $f(x)=x^2$, $g(x)=\sqrt{x}$;

② $f(x)=10^{-x}+2$, $g(x)=\frac{2x-3}{x}$;

③ $f(x)=\frac{x^2+1}{x}$, $g(x)=\frac{x\ln x+1}{\ln x}$;

④ $f(x)=\frac{2x^2}{x+1}$, $g(x)=2(x-1-\mathrm{e}^{-x})$.


其中, 曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 存在"分渐近线"的是 ( )

(A) ①④ (B) ②③ (C) ②④ (D) ③④

## 二、填空题

11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若公比 $q=4$, 且前 3 项之和等于 21, 则该数列的通项公式为 $a_n=$_____.

12. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示, 则其表面积等于_____.




13. 某次知识竞赛规则如下: 在主办方预设的 5 个问题中, 选手若能连续正确回答出两个问题, 即停止答题, 晋级下一轮. 假设某选手正确回答每个问题的概率都是 0.8, 且每个问题的回答结果相互独立, 则该选手恰好回答了 4 个问题就晋级下一轮的概率等于_____.

14. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$ $(\omega>0)$ 和 $g(x)=2\cos(2x+\varphi)+1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, 则 $f(x)$ 的取值范围是_____.

15. 已知定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足, (1) 对任意 $x\in(0,+\infty)$, 恒有 $f(2x)=2f(x)$ 成立; (2) 当 $x\in(1,2]$ 时, $f(x)=2-x$, 给出结论如下:

① 对任意 $m\in\mathbf{Z}$, 有 $f(2^m)=0$;

② 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$;

③ 存在 $n\in\mathbf{Z}$, 使得 $f(2^n+1)=9$;

④ "函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 上单调递减"的充要条件是"存在 $k\in\mathbf{Z}$, 使得 $(a,b)\subseteq\left(2^k,2^{k+1}\right)$".

其中所有正确结论的序号是_____.

## 三、解答题


16. 设 $S$ 是不等式 $x^2-x-6\leqslant 0$ 的解集, 整数 $m$, $n\in S$.

(1) 记使得"$m+n=0$ 成立的有序数组 $(m,n)$"为事件 $A$, 试列举 $A$ 包含的基本事件;

(2) 设 $\xi=m^2$, 求 $\xi$ 的分布列及其数学期望 $E\xi$.

17. 已知中心在坐标原点 $O$ 的椭圆 $C$ 经过点 $A(2,3)$, 且点 $F(2,0)$ 为其右焦点.
(1) 求椭圆 $C$ 的方程;
(2) 是否存在平行于 $OA$ 的直线 $l$, 使得直线 $l$ 与椭圆 $C$ 有公共点, 且直线 $OA$ 与 $l$ 的距离等于 4? 若存在, 求出直线 $l$ 的方程; 若不存在, 请说明理由.

18. 如图, 圆柱 $OO_1$ 内有一个三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, 三棱柱的底面为圆柱底面的内接三角形, 且 $AB$ 是圆 $O$ 直径.
(1) 证明: 平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 $B_1BCC_1$;
(2) 设 $AB=AA_1$, 在圆柱 $OO_1$ 内随机选取一点, 记该点取自于三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内的概率为 $p$.
① 当点 $C$ 在圆周上运动时, 求 $p$ 的最大值;
② 记平面 $A_1ACC_1$ 与平面 $B_1OC$ 所成的角为 $\theta$ $(0^\circ<\theta\leqslant 90^\circ)$, 当 $p$ 取最大值时, 求 $\cos\theta$ 的值.




19. 某港口 $O$ 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时, 轮船位于港口 $O$ 北偏西 $30^\circ$ 且与该港口相距 20 海里的 $A$ 处, 并以 30 海里/小时的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 $v$ 海里/小时的航行速度匀速行驶, 经过 $t$ 小时与轮船相遇.
(1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小, 则小艇航行速度的大小应为多少?
(2) 假设小艇的最高航行速度只能达到 30 海里/小时, 试设计航行方案 (即确定航行方向与航行速度的大小), 使得小艇能以最短时间与轮船相遇, 并说明理由.

20. (1) 已知函数 $f(x)=x^3-x$, 其图象记为曲线 $C$.
① 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
② 证明: 若对于任意非零实数 $x_1$, 曲线 $C$ 与其在点 $P_1(x_1,f(x_1))$ 处的切线交于另一点 $P_2(x_2,f(x_2))$, 曲线 $C$ 与其在点 $P_2(x_2,f(x_2))$ 处的切线交于另一点 $P_3(x_3,f(x_3))$, 线段 $P_1P_2$, $P_2P_3$ 与曲线 $C$ 所围成封闭图形的面积分别记为 $S_1$, $S_2$, 则 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 为定值;
(2) 对于一般的三次函数 $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a\neq 0)$, 请给出类似于 (1) ②的正确命题, 并予以证明.

21. 三选二.
【A】已知矩阵 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1 & a\\ b & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}c & 2\\ 0 & d\end{pmatrix}$, 且 $\boldsymbol{MN}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}$.
(1) 求实数 $a$, $b$, $c$, $d$ 的值;
(2) 求直线 $y=3x$ 在矩阵 $\boldsymbol{M}$ 所对应的线性变换下的像的方程.

【B】在直角坐标系 $xOy$ 中, 直线 $l$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=3-\dfrac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=\sqrt{5}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}t,\end{cases}$ ($t$ 为参数). 在极坐标系 (与直角坐标系 $xOy$ 取相同的长度单位, 且以原点 $O$ 为极点, 以 $x$ 轴正半轴为极轴) 中, 圆 $C$ 的方程为 $\rho=2\sqrt{5}\sin\theta$.
(1) 求圆 $C$ 的直角坐标方程;
(2) 设圆 $C$ 与直线 $l$ 交于点 $A$、$B$, 若点 $P$ 的坐标为 $\left(3,\sqrt{5}\right)$, 求 $|PA|+|PB|$.

【C】已知函数 $f(x)=|x-a|$.
(1) 若不等式 $f(x)\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 5\}$, 求实数 $a$ 的值;
(2) 在 (1) 的条件下, 若 $f(x)+f(x+5)\geqslant m$ 对一切实数 $x$ 恒成立, 求实数 $m$ 的取值范围.