2011 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. 已知 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$, $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$, $B=\{2,\ 4,\ 5\}$, 则 $\complement_U(A\cup B)=$ (　)

(A) $\{6,\ 8\}$　　(B) $\{5,\ 7\}$

(C) $\{4,\ 6,\ 7\}$　　(D) $\{1,\ 3,\ 5,\ 6,\ 8\}$

2. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$, $\boldsymbol{b}=(1,-1)$, 则 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的夹角等于 (　)

(A) $-\dfrac{\pi}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi}{6}$　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　　(D) $\dfrac{3\pi}{4}$


3. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=\mathrm{e}^x$, 则 $g(x)=$ (　)

(A) $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$　　(B) $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$　　(C) $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)$　　(D) $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$

4. 将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 上, 另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n, 则 (　)

(A) $n=0$　　(B) $n=1$　　(C) $n=2$　　(D) $n\geqslant 3$

5. 有一个容量为 200 的样本, 其频率分布直方图如图所示, 根据样本的频率分布直方图估计, 样本数据落在区间 $[10,12)$ 内的频数为 (　)



(A) 18　　(B) 36　　(C) 54　　(D) 72

6. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x$, $x\in\mathbf{R}$. 若 $f(x)\geqslant 1$, 则 x 的取值范围为 (　)

(A) $\left\{x\,\middle|\,2k\pi+\dfrac{\pi}{3}\leqslant x\leqslant 2k\pi+\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(B) $\left\{x\,\middle|\,k\pi+\dfrac{\pi}{3}\leqslant x\leqslant k\pi+\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(C) $\left\{x\,\middle|\,2k\pi+\dfrac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant 2k\pi+\dfrac{5\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(D) $\left\{x\,\middle|\,k\pi+\dfrac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant k\pi+\dfrac{5\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

7. 设球的体积为 V_1, 它的内接正方体的体积为 V_2, 下列说法中最合适的是 (　)

(A) V_1 比 V_2 大约多一半　　(B) V_1 比 V_2 大约多两倍半

(C) V_1 比 V_2 大约多一倍　　(D) V_1 比 V_2 大约多一倍半

8. 直线 $2x+y-10=0$ 与不等式组 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\\ x-y\geqslant -2,\\ 4x+3y\leqslant 20\end{cases}$ 表示的平面区域的公共点有 (　)

(A) 0 个　　(B) 1 个　　(C) 2 个　　(D) 无数个

9. 《九章算术》"竹九节"问题: 现有一根 9 节的竹子, 自上而下各节的容积成等差数列, 上面 4 节的容积共 3 升, 下面 3 节的容积共 4 升, 则第 5 节的容积为 (　)

(A) 1 升　　(B) $\dfrac{67}{66}$ 升　　(C) $\dfrac{47}{44}$ 升　　(D) $\dfrac{37}{33}$ 升

10. 若实数 a, b 满足 $a\geqslant 0$, $b\geqslant 0$, 且 $ab=0$, 则称 a 与 b 互补. 记 $\varphi(a,b)=\sqrt{a^2+b^2}-a-b$, 那么 $\varphi(a,b)=0$ 是 a 与 b 互补的 (　)

(A) 必要而不充分条件　　(B) 充分而不必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

二、填空题

11. 某市有大型超市 200 家、中型超市 400 家、小型超市 1400 家. 为掌握各类超市的营业情况, 现按分层抽样方法抽取一个容量为 100 的样本, 应抽取中型超市_____家.

12. $\left(x-\dfrac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为_____. (结果用数值表示)

13. 在 30 瓶饮料中, 有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶, 则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为_____. (结果用最简分数表示)

14. 过点 $(-1,-2)$ 的直线 l 被圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 截得的弦长为 $\sqrt{2}$, 则直线 l 的斜率为_____.

15. 里氏震级 M 的计算公式为: $M=\lg A-\lg A_0$, 其中 A 是测震仪记录的地震曲线的最大振幅, A_0 是相应的标准地震的振幅. 假设在一次地震中, 测震仪记录的最大振幅是 1000, 此时标准地震的振幅为 0.001, 则此次地震的震级为_____级; 9 级地震的最大的振幅是 5 级地震最大振幅的_____倍.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $a=1$, $b=2$, $\cos C=\dfrac{1}{4}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的周长;

(2) 求 $\cos(A-C)$ 的值.

17. 成等差数列的三个正数的和等于 15, 并且这三个数分别加上 2, 5, 13 后成为等比数列 $\{b_n\}$ 中的 b_3, b_4, b_5.


(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 求证: 数列 $\left\{S_n+\dfrac{5}{4}\right\}$ 是等比数列.

18. 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2, 侧棱长为 $3\sqrt{2}$, 点 E 在侧棱 AA_1 上, 点 F 在侧棱 BB_1 上, 且 $AE=2\sqrt{2}$, $BF=\sqrt{2}$.

(1) 求证: $CF\perp C_1E$;

(2) 求二面角 $E-CF-C_1$ 的大小.



19. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下, 大桥上的车流速度 v (单位: 千米/小时) 是车流密度 x (单位: 辆/千米) 的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米时, 造成堵塞, 此时车流速度为 0; 当车流密度不超过 20 辆/千米时, 车流速度为 60 千米/小时. 研究表明: 当 $20 \leqslant x \leqslant 200$ 时, 车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.
(1) 当 $0 \leqslant x \leqslant 200$ 时, 求函数 $v(x)$ 的表达式;
(2) 当车流密度 x 为多大时, 车流量 (单位时间内通过桥上某观测点的车辆数, 单位: 辆/小时)$f(x)=x \cdot v(x)$ 可以达到最大, 并求出最大值. (精确到 1 辆/小时)

20. 设函数 $f(x)=x^3+2ax^2+bx+a$, $g(x)=x^2-3x+2$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, a, b 为常数, 已知曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在点 $(2,0)$ 处有相同的切线 l.
(1) 求 a, b 的值, 并写出切线 l 的方程;
(2) 若方程 $f(x)+g(x)=mx$ 有三个互不相同的实根 0, x_1, x_2, 其中 $x_1<x_2$, 且对任意的 $x \in [x_1, x_2]$, $f(x)+g(x)<m(x-1)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

21. 平面内与两定点 $A_1(-a,0)$, $A_2(a,0)$ $(a>0)$ 连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹, 加上 A_1, A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.
(1) 求曲线 C 的方程, 并讨论 C 的形状与 m 值的关系;
(2) 当 $m=-1$ 时, 对应的曲线为 C_1; 对给定的 $m \in (-1,0) \cup (0,+\infty)$, 对应的曲线为 C_2. 设 F_1, F_2 是 C_2 的两个焦点. 试问: 在 C_1 上, 是否存在点 N, 使得 $\triangle F_1NF_2$ 的面积 $S=|m|a^2$? 若存在, 求 $\tan\angle F_1NF_2$ 的值; 若不存在, 请说明理由.