

Теория вероятности и математическая статистика, 2 курс, 2 семестр

22 февраля 2020 г.

Содержание

1	Сходимости случайных величин	2
2	Характеристические функции	6
3	Неравенство типа Хефдинга-Чернова	9
4	Теоремы непрерывности	11
5	Многомерная характеристическая функция и ЦПТ	14
6	Многомерное нормальное распределение	16
7	Условные математические ожидания: дискретный случай	19
8	Условные математические ожидания: общий случай	22

1 Сходимости случайных величин

Определение 1. Последовательность случайных величин ξ_n сходится к случайной величине ξ :

1. Почти наверное ($\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$), если

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi\right) = 1$$

2. По вероятности ($\xi_n \xrightarrow{P} \xi$), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0$$

3. По распределению ($\xi_n \xrightarrow{d} \xi$), если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(x) = F_{\xi}(x)$$

для любых x , в которых непрерывна F_{ξ}

Теорема 1. (Эквивалентное определение сходимости по распределению) $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall g$ — непрерывна и ограничена на \mathbb{R} верно $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}g(\xi_n) = \mathbb{E}g(\xi)$

Доказательство. \Rightarrow

Пусть t — точка непрерывности $F_{\xi}(t)$. Заметим, что $F_{\xi}(t) = P(\xi \in (-\infty, t]) = \mathbb{E}\text{Ind}_{(-\infty, t]}(\xi)$.

В силу:

$$(1) \mathbb{E}\text{Ind}_{(a_i, b_i]}(\xi_n) = F_{\xi_n}(b_i) - F_{\xi_n}(a_i) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(b_i) - F_{\xi}(a_i) = \mathbb{E}\text{Ind}_{(a_i, b_i]}(\xi)$$

(2) Линейность предела (с какими-то коэффициентами c_i)

Верна следующая сходимость:

$$\mathbb{E} \sum_{i=1}^N c_i \cdot \text{Ind}_{(a_i, b_i]}(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E} \sum_{i=1}^N c_i \cdot \text{Ind}_{(a_i, b_i]}(\xi)$$

Теперь нам бы хотелось от непрерывной ограниченной функции на прямой перейти к функции на отрезке, а там мы уже сможем ее приблизить ступенчатой и воспользоваться предыдущим утверждением и все доказать. Мы знаем, что

$\forall \varepsilon > 0 \exists A: P(-A < \xi \leq A) > 1 - \varepsilon$ (потому что $P(\xi \in \mathbb{R}) = 1$). Тогда получаем:

$$F_{\xi_n}(A) - F_{\xi_n}(-A) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(A) - F_{\xi}(-A) = P(-A < \xi \leq A) > 1 - \varepsilon$$

То есть для $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N$ верно:

$$|(F_{\xi_n}(A) - F_{\xi_n}(-A)) - (F_{\xi}(A) - F_{\xi}(-A))| < \varepsilon$$

Комбинируя последние два утверждения, получаем для $\forall \varepsilon > 0 \exists A \exists N \forall n > N$:

$$F_{\xi_n}(A) - F_{\xi_n}(-A) > F_{\xi}(A) - F_{\xi}(-A) - \varepsilon > 1 - 2\varepsilon$$

Из чего следует $\forall \varepsilon > 0 \exists A \exists N \forall n > N$:

$$P(-A \leq \xi_n \leq A) \geq F_{\xi_n}(A) - F_{\xi_n}(-A) > 1 - \varepsilon$$

Теперь возьмем любую непрерывную ограниченную функцию g , приблизим ее на отрезке $[-A, A]$ ступенчатой функцией g_{ε} , что $|g(x) - g_{\varepsilon}(x)| < \varepsilon$, а вне отрезка положим $g_{\varepsilon} = 0$. Имеем $\forall \varepsilon > 0 \exists A \forall n$:

$$|\mathbb{E}g(\xi_n) - \mathbb{E}g(\xi)| \leq |\mathbb{E}(1 - \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi_n)) \cdot g(\xi_n) - \mathbb{E}(1 - \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi)) \cdot g(\xi)| +$$

$$+ |\mathbb{E} \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi_n) \cdot g(\xi_n) - \mathbb{E} \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi) \cdot g(\xi)|$$

Ясно, что первый модуль $< C \cdot 2\varepsilon$ (из ограниченности $g \forall x_1, x_2: |g(x_1) - g(x_2)| < C$ и так как $P(|\xi| > A), P(|\xi_n| > A) < \varepsilon$). А во втором модуле g заменим на g_ε с погрешностью ε , то есть он $< 2\varepsilon + |\mathbb{E} \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi_n) \cdot g_\varepsilon(\xi_n) - \mathbb{E} \text{Ind}_{[-A, A]}(\xi) \cdot g_\varepsilon(\xi)|$. А про оставшийся модуль мы уже знаем, что он сходится к 0, так как ступенчатая функция (то есть $< \varepsilon$ для $\forall n > N$). В итоге имеем: $|\mathbb{E} g(\xi_n) - \mathbb{E} g(\xi)| < \varepsilon$. То есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} g(\xi_n) = \mathbb{E} g(\xi)$

←

Пусть t — точка непрерывности $F_\xi(t)$. Мы знаем, что $F_\xi(t) = \mathbb{E} \text{Ind}_{(-\infty, t]}(\xi)$. Для $\forall \delta > 0$ определим функции:

$$g_{-\delta}(x) = \begin{cases} 1 & x < t - \delta \\ \frac{1}{\delta} \cdot (t - x) & t - \delta \leq x \leq t \\ 0 & t < x \end{cases}$$

$$g_{+\delta}(x) = \begin{cases} 1 & x < t \\ \frac{1}{\delta} \cdot (t - x) & t \leq x \leq t + \delta \\ 0 & t + \delta < x \end{cases}$$

Заметим, что $\forall x$:

$$\text{Ind}_{(-\infty, t-\delta]}(x) \leq g_{-\delta}(x) \leq \text{Ind}_{(-\infty, t]}(x) \leq g_{+\delta}(x) \leq \text{Ind}_{(\infty, t+\delta]}(x)$$

Взяв матожидания ($x = \xi_n$) от второго и третьего неравенств, получим:

$$\mathbb{E} g_{-\delta}(\xi_n) \leq F_{\xi_n}(t) \leq \mathbb{E} g_{+\delta}(\xi_n)$$

Теперь устремим $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{E} g_{-\delta}(\xi) \leq \inf_{n \rightarrow \infty} \lim F_{\xi_n}(x) \leq \sup_{n \rightarrow \infty} \lim F_{\xi_n}(x) \leq \mathbb{E} g_{+\delta}(x)$$

Рассмотрим первое и последнее неравенство той цепочки ($x = \xi$ и возьмем то него матожидание), получим:

$$F_\xi(t - \delta) \leq \mathbb{E} g_{-\delta}(\xi) \leq \mathbb{E} g_{+\delta}(\xi) \leq F_\xi(t + \delta)$$

Теперь $\delta \rightarrow 0$:

$$F_\xi(t) = \mathbb{E} g_{-\delta}(\xi) = \inf_{n \rightarrow \infty} \lim F_{\xi_n}(t) = \sup_{n \rightarrow \infty} \lim F_{\xi_n}(t) = \mathbb{E} g_{+\delta}(\xi)$$

Получаем: $F_\xi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(t)$

■

Теорема 2. $\xi_n \xrightarrow{n.n.} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{p} \xi$

Доказательство. Знаем $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi\right) = 1$. Заметим вложенность следующих событий для $\forall \varepsilon >$

0: $\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi\right\} \Rightarrow \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\}$ (это по сути и есть определение предела, что для $\forall \varepsilon$, начиная с некоторого N выполняется условие). То есть:

$$1 = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi\right) \leq P\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\}\right) = 1$$

Так как последовательность множеств $A_N = \bigcap_{n=N}^{\infty} \{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\}$ расширяющаяся ($A_N \subseteq A_{N+1}$), в объединении они дают событие вероятности 1, значит по теореме непрерывности $\lim_{N \rightarrow \infty} P(A_N) = 1$.

Теперь заметим: $P(A_N) \leq P(|\xi_N - \xi| < \varepsilon)$. То есть: $\lim_{N \rightarrow \infty} P(|\xi_N - \xi| < \varepsilon) = 1$. Или что то же самое: $\lim_{N \rightarrow \infty} (1 - P(|\xi_N - \xi| < \varepsilon)) = \lim_{N \rightarrow \infty} P(|\xi_N - \xi| \geq \varepsilon) = 0$ — определение сходимости по вероятности. ■

Теорема 3. (Теорема Лебега о мажорируемой сходимости) $\xi_n \xrightarrow{p} \xi$ и $|\xi_n|, |\xi| \leq \eta$ п. н. (где η — случайная величина, что $\mathbb{E}\eta < \infty$), то $\mathbb{E}\xi_n \rightarrow \mathbb{E}\xi$

Доказательство. Докажем теорему в частном случае, когда $\eta \equiv C$. $\forall \varepsilon > 0 \forall n$ $|\mathbb{E}\xi_n - \mathbb{E}\xi| \leq \mathbb{E}|\xi_n - \xi| = \mathbb{E}|\xi_n - \xi| \cdot \text{Ind}_{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon} + \mathbb{E}|\xi_n - \xi| \cdot \text{Ind}_{|\xi_n - \xi| < \varepsilon} \leq 2C \cdot P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) + \varepsilon \cdot 1$. Так как $\xi_n \xrightarrow{p} \xi$, то $\exists N \forall n > N: P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) < \varepsilon$. Тогда получаем: $|\mathbb{E}\xi_n - \mathbb{E}\xi| < 2C \cdot \varepsilon + \varepsilon$. То есть $\mathbb{E}\xi_n \rightarrow \mathbb{E}\xi$. ■

Предложение 1. $\xi_n \xrightarrow{p} \xi \Rightarrow$ для $\forall g$ — непрерывная, $g(\xi_n) \xrightarrow{p} g(\xi)$

Доказательство. Знаем для любой случайной величины $\forall \varepsilon > 0 \exists A: P\left(|\xi| > \frac{A}{2}\right) < \varepsilon$. $\exists N \forall n > N: P(|\xi_n| > A) \leq P(|\xi - \xi_n| + |\xi| > A) \leq P\left(|\xi - \xi_n| > \frac{A}{2}\right) + P\left(|\xi| > \frac{A}{2}\right) < \varepsilon$. Теперь возьмем g , она равномерно непрерывна на $[-A, A]$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \varepsilon \quad \forall x, y \in [-A, A]$$

Докажем $g(\xi_n) \xrightarrow{p} g(\xi)$:

$$\begin{aligned} P(|g(\xi_n) - g(\xi)| \geq \varepsilon) &= P(|g(\xi_n) - g(\xi)| \geq \varepsilon \mid \xi_n, \xi \in [-A, A]) \cdot P(\xi_n, \xi \in [-A, A]) + \\ &+ P(|g(\xi_n) - g(\xi)| \geq \varepsilon \mid \xi_n, \xi \notin [-A, A]) \cdot P(\xi_n, \xi \notin [-A, A]) \end{aligned}$$

Посмотрев на определение равномерной непрерывности, заметим, что:

$$P(|g(\xi_n) - g(\xi)| \geq \varepsilon \mid \xi_n, \xi \in [-A, A]) \leq P(|\xi_n - \xi| \geq \delta)$$

А это уже, так как у нас есть сходимость по вероятности $\rightarrow 0$. И заметим, что

$$P(\xi_n, \xi \notin [-A, A]) \leq P(|\xi_n| > A) + P(|\xi| > A) < 2\varepsilon$$

То есть $\rightarrow 0$ при $n, A \rightarrow \infty$ Все, получили, что $P(|g(\xi_n) - g(\xi)| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$ при $n, A \rightarrow \infty$. ■

Следствие 1. $\xi_n \xrightarrow{p} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{d} \xi$

Доказательство. Берем предыдущее предложение. Потом используем теорему Лебега для произвольной непрерывной ограниченной g и вспоминаем эквивалентное определение сходимости по распределению. ■

Теорема 4. (Эквивалентное определение сходимости почти наверное)

$$\xi_n \xrightarrow{n.n.} \xi \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon\right) = 0$$

Доказательство. Рассмотрим следующие события:

$$A_k^\varepsilon = \{|\xi_k - \xi| > \varepsilon\}$$

$$A^\varepsilon = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k^\varepsilon$$

Заметим, что:

$$\left\{ \sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon \right\} = \{ \exists k \geq n : |\xi_k - \xi| > \varepsilon \} = \bigcup_{k \geq n} A_k^\varepsilon$$

$$\left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \neq \xi \right\} = \{ \exists \varepsilon > 0 \forall n \exists k \geq n : |\xi_k - \xi| \geq \varepsilon \} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n} \bigcup_{k \geq n} A_k^{\varepsilon = \frac{1}{m}} = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m^{\frac{1}{m}}$$

Тогда имеем:

$$\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Leftrightarrow P \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \neq \xi \right) = 0 \Leftrightarrow P \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m^{\frac{1}{m}} \right) = 0 \Leftrightarrow \forall m P \left(A_m^{\frac{1}{m}} \right) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 P \left(A^\varepsilon \right) = 0 \Leftrightarrow$$

Теперь заметим вложенность последовательности событий $B_n^\varepsilon = \bigcup_{k \geq n} A_k^\varepsilon$ и, взглянув на определение A^ε , по теореме о непрерывности вероятностной меры продолжаем цепочку:

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\bigcup_{k \geq n} A_k^\varepsilon \right) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon \right) = 0$$

■

Теперь приведем некоторые примеры, опровергающие остальные следствия сходимостей

Пример 1.

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \not\Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

Пусть $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{2}$. Определим $\forall n \xi_n(\omega_i) = (-1)^i$. Положим $\xi = -\xi_n$. Тогда $\forall f$ непрерывной и ограниченной:

$$\mathbb{E}f(\xi_n) = \frac{f(1) + f(-1)}{2} = \mathbb{E}f(\xi)$$

То есть $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$. Однако $\forall n |\xi_n - \xi| = 2$, то есть $\xi_n \not\xrightarrow{P} \xi$

Пример 2.

$$\xi_n \xrightarrow{P} \xi \not\Rightarrow \xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$$

Возьмем $\Omega = [0, 1]$, $\xi_{2^n+p} = \text{Ind}_{[\frac{p}{2^n}, \frac{p+1}{2^n}]}$, $0 \leq p < 2^n$. Ясно, что $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi_n > 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{\lfloor \log n \rfloor}} = 0$$

, но $\xi_n \not\xrightarrow{\text{п.н.}} 0$, так как для любого исхода ω существует бесконечно много n , что $\xi_n(\omega) = 1$. Теперь осталось посмотреть на теорему 4 и все станет ясно.

Пример 3.

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \not\Rightarrow \xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$$

Если бы следствие имело место, то отсюда вытекало бы, что:

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \not\Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

противоречие

2 Характеристические функции

Определение 2. Характеристической функцией случайной величины ξ называется функция:

$$\varphi_{\xi}(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \mathbb{E}(\cos(t\xi) + i \sin(t\xi))$$

Предложение 2. (Свойства характеристических функций)

1. $\varphi_{\xi}(0) = 1, |\varphi_{\xi}(t)| \leq 1 \forall t \in \mathbb{R}$
2. $\varphi_{a\xi+b}(t) = e^{itb} \varphi_{\xi}(at)$
3. если ξ_1, \dots, ξ_n — независимые случайные величины и $S = \xi_1 + \dots + \xi_n$, то

$$\varphi_S(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \cdots \varphi_{\xi_n}(t)$$

Доказательство. .

1. Понятно, так как в матожидании могут быть только комплексные числа с модулем ≤ 1 .
2. $\varphi_{a\xi+b}(t) = \mathbb{E}e^{it(a\xi+b)} = e^{itb} \mathbb{E}e^{i(at)\xi} = e^{itb} \varphi_{\xi}(at)$
3. $\varphi_S(t) = \mathbb{E}(e^{it\xi_1} \dots e^{it\xi_n}) = \mathbb{E}e^{it\xi_1} \dots \mathbb{E}e^{it\xi_n} = \varphi_{\xi_1}(t) \cdots \varphi_{\xi_n}(t)$

■

Пример 4. Вычислим $\varphi_{\xi}(t)$, где $\xi \sim N(0, 1)$:

$$\varphi_{\xi}(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Заметим, что $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$, так как это интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку. Тогда имеем:

$$\varphi_{\xi}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Возьмем производную по t :

$$\begin{aligned} \varphi'_{\xi}(t) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(tx) d\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0 - \frac{t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t\varphi_{\xi}(t) \end{aligned}$$

Теперь надо решить дифференциальное уравнение:

$$\varphi'_{\xi}(t) = -t\varphi_{\xi}(t)$$

$$\frac{\varphi'_{\xi}(t)}{\varphi_{\xi}(t)} = -t$$

Интегрируем обе части:

$$\int \frac{\varphi'_{\xi}(t)}{\varphi_{\xi}(t)} = \ln|\varphi_{\xi}(t)| + C = \int -tdt = -\frac{t^2}{2}$$

$$\varphi_{\xi}(t) = C'e^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$\varphi_{\xi}(0) = 1 = C' \Rightarrow C' = 1$$

(Ответ никак нулевым быть не может, поэтому, когда мы поделили на хар функцию ничего плохого не произошло)

Предложение 3. Пусть случайная величина ξ обладает конечным k -тым моментом, то есть $\mathbb{E}|\xi|^k < \infty$. Тогда φ имеет непрерывную k -тую производную и $\varphi^{(k)}(t) = i^k \mathbb{E}\xi^k$

Доказательство. Заметим, что:

$$\left| \frac{e^{i\Delta t\xi} - 1}{\Delta t} \right| \leq \frac{\sqrt{(\cos(\Delta t\xi) - 1)^2 + \sin^2(\Delta t\xi)}}{|\Delta t|} = \frac{\sqrt{2 - 2\cos(\Delta t\xi)}}{|\Delta t|} = \frac{2|\sin(\frac{\Delta t\xi}{2})|}{\Delta t} \leq \frac{2 \cdot \frac{|\Delta t\xi|}{2}}{|\Delta t|} = |\xi|$$

Возьмем вместо Δt последовательность $a_n \rightarrow 0$. Получим, что последовательность случайных величин, сходящихся почти наверное и ее предел $(i\xi)$ ограничены случайной величиной (ξ) с конечным ожиданием, получаем по теореме Лебега:

$$\mathbb{E} \frac{e^{ian\xi} - 1}{a_n} \rightarrow \mathbb{E}i\xi$$

Теперь посчитаем производную хар функции:

$$\varphi'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t + \Delta t) - \varphi(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbb{E} e^{it\xi} \cdot \frac{e^{i\Delta t\xi} - 1}{\Delta t} = i\mathbb{E} e^{it\xi} \xi$$

Теперь очевидна непрерывность первой производной и $\varphi'(t) = i\mathbb{E}\xi$, для производных высших порядков аналогично

■

Теорема 5.

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall t \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\xi_n}(t) = \varphi_{\xi}(t)$$

Доказательство. \Rightarrow

Очевидно по Теореме 1

\Leftarrow

Докажем при условии $\sup_n \mathbb{E}\xi_n^2 \leq C < \infty$. По неравенству Чебышева:

$$P(|\xi_n| \geq A) \leq \frac{\mathbb{E}\xi_n^2}{A^2} \leq \frac{C}{A^2}$$

Пусть f — ограниченная непрерывная функция и $M = \sup|f|$. Из записанного неравенства Чебышева следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists A$:

$$P(|\xi_n| \geq A) \leq \varepsilon, \quad P(|\xi| \geq A) \leq \varepsilon$$

Пусть непрерывная ограниченная f_ε совпадает с f на $[-A, A]$, потом от $-A-1$ до $-A$ и от $A+1$ до A она будет прямой из 0 в $f(-A)$ и $f(A)$ соответственно, а дальше будет повторять этот шаблон (периодическая). Заметим, что:

$$|\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi_n) - \mathbb{E}f(\xi_n)| < 2M\varepsilon, \quad |\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) - \mathbb{E}f(\xi)| < 2M\varepsilon$$

Теперь равномерно приблизим f_ε комбинацией \sin, \cos (знаем с матана, что периодическую можно так приблизить). А из сходимости хар функции мы знаем, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \sin(\xi_n) = \mathbb{E} \sin(\xi)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \cos(\xi_n) = \mathbb{E} \cos(\xi)$$

То есть получаем $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f_\varepsilon(\xi_n) = \mathbb{E}f_\varepsilon(\xi)$. В итоге, вспоминая те неравенства с $2M\varepsilon$ и устремляя $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{E}f(\xi) - 4M\varepsilon \leq \inf_{n \rightarrow \infty} \lim \mathbb{E}f(\xi_n) \leq \sup_{n \rightarrow \infty} \lim \mathbb{E}f(\xi_n) \leq \mathbb{E}f(\xi) + 4M\varepsilon$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(\xi_n) = \mathbb{E}f(\xi)$, что доказывает сходимость по распределению.

■

Следствие 2. $\varphi_\xi \equiv \varphi_\eta \Rightarrow F_\xi \equiv F_\eta$

Доказательство. Предыдущая теорема + Теорема 1. ■

Теорема 6. (Центральная предельная теорема)

Пусть ξ_n — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, причем $\mathbb{E}\xi_1 = \mu$, $\mathbb{D}\xi_1 = \sigma^2$. Тогда $\forall x$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq t\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

(справа записана $F(t)$ — функция распределения случайной величины с распределением $N(0, 1)$)

Доказательство. Переходя к случайным величинам $\xi_i = \frac{\xi_i - \mu}{\sigma}$ далее будем считать, что $\mathbb{E}\xi_i = 0$ и $\mathbb{D}\xi_i = 1$. Пусть φ — хар функция случайной величины ξ_1 . Тогда хар функция случайной величины

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{\sqrt{n}}$$

равна

$$\varphi_n(t) = \left(\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

Разложим $\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$ в ряд Тейлора в 0 (при $n \rightarrow \infty$), помним предложение 3:

$$\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + \dots = 1 + 0 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Следовательно получаем:

$$\varphi_n(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{-\frac{2n}{t^2} \cdot \left(-\frac{t^2}{2}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Получили характеристическую функцию нормального распределения, то есть и функции распределения должны совпадать. ■

3 Неравенство типа Хефдинга-Чернова

Теорема 7. (Неравенство Хефдинга-Чернова)

Пусть случайные величины ξ_1, \dots, ξ_n независимы и $a_i \leq \xi_i \leq b_i$. Тогда для случайной величины $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ и для каждого $t > 0$ выполнено

$$P(|S_n - \mathbb{E}S_n| \geq t) \leq 2 \exp \left(-\frac{t^2}{4 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \right)$$

Доказательство. Пусть $\eta_i = \xi_i - \mathbb{E}\xi_i$, тогда $|\eta_i| \leq b_i - a_i$. Заметим, что для каждого $\lambda > 0$ (просто домножили и взяли экспоненту):

$$P(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) = P\left(\sum_{i=1}^n \eta_i \geq t\right) = P(e^{\lambda \sum \eta_i} \geq e^{\lambda t})$$

Теперь применим неравенство Маркова:

$$P(e^{\lambda \sum \eta_i} \geq e^{\lambda t}) \leq e^{-\lambda t} \mathbb{E}e^{\lambda \sum \eta_i}$$

Вспомним, что η_1, \dots, η_n независимы:

$$e^{-\lambda t} \mathbb{E}e^{\lambda \sum \eta_i} = e^{-\lambda t} \prod \mathbb{E}e^{\lambda \eta_i}$$

Оценим каждый множитель $\mathbb{E}e^{\lambda \eta_i}$ отдельно. Разложим его в ряд Тейлора:

$$\mathbb{E}e^{\lambda \eta_i} = 1 + \lambda \mathbb{E}\eta_i + \lambda^2 \mathbb{E}\eta_i^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda^k \mathbb{E}\eta_i^k \leq 1 + \lambda^2 (b_i - a_i)^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda^k (b_i - a_i)^k$$

Докажем, что при $R > 0$:

$$1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} R^k \leq e^{R^2}$$

Если $R > 1$:

$$1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} R^k = 1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} R^{2k} \left(\frac{k!}{(2k-1)!} R^{-1} + \frac{n!}{(2n)!} \right) \leq 1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} R^{2k} = e^{R^2}$$

Если же $R \leq 1$:

$$1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} R^k \leq 1 + \frac{1}{2}R^2 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} R^2 = 1 + R^2 \leq e^{R^2}$$

Таким образом:

$$P(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) \leq \exp \left(-\lambda t + \lambda^2 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 \right)$$

Взяв $\lambda = \frac{t}{2 \sum (a_i - b_i)^2}$ получим желаемое неравенство. Для $P(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t)$ получим такую же оценку, и, объединяя их, получим оценку на модуль, только придется домножить оценку на 2. ■

Следствие 3. Пусть $\xi_i \sim \text{Bern}(p)$ – набор n независимых случайных величин, $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, тогда

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq t\right) \leq 2e^{-\frac{nt^2}{4}}$$

Доказательство. Разделим каждую случайную величину на n , тогда $\mathbb{E} \frac{S_n}{n} = p$, а $\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2 = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$. Подставляем и получаем, нужное неравенство ■

Пример 5. Пусть в ящике какое-то количество черных и белых шаров. Каким должен быть размер выборки, чтобы оценить долю белых шаров с малой погрешностью? Пусть ξ_i — бернуллевская случайная величина, равная 1, если шар белого цвета и 0, если цвет черный. Мы хотим оценить вероятность успеха p . По неравенству выше:

$$P \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| \geq t \right) \leq 2e^{-\frac{nt^2}{4}} \leq \varepsilon$$

Тогда при размере выборки $n = O \left(\frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{t^2} \right)$ выборочное среднее приближает реальную долю белых шаров с точностью t с вероятностью более $1 - \varepsilon$ (то есть вероятность, что наша оценка верна $\geq 1 - \varepsilon$)

4 Теоремы непрерывности

Для применения ЦПТ на практике важную роль играют так называемые теоремы о непрерывности.

Предложение 4. Если последовательность случайных величин $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то для всякой непрерывной g $g(\xi_n) \xrightarrow{d} g(\xi)$

Доказательство. Следует из Теоремы 1 (эквивалентное определение сходимости по распределению). ■

Лемма 1. Пусть X, Y, Z – случайные величины. Тогда

$$P(X + Y \leq t) \leq P(X + Z \leq t + \varepsilon) + P(|Y - Z| \geq \varepsilon), \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$$

Доказательство. Заметим, что

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq t) &\leq P(X + Y \leq t, |Y - Z| \leq \varepsilon) + P(X + Y \leq t, |Y - Z| \geq \varepsilon) \leq \\ &\leq P(X + Z - \varepsilon \leq t) + P(|Y - Z| \geq \varepsilon) \end{aligned}$$

■

Предложение 5. Если $\xi_n \xrightarrow{P} a = \text{const}$ и $\eta_n \xrightarrow{d} \eta$, то $\xi_n \eta_n \xrightarrow{d} a\eta$, $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} a + \eta$

Доказательство. Докажем утверждение для суммы. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда по лемме имеем:

$$P(\xi_n + \eta_n \leq t) \leq F_{\eta_n}(t - a + \varepsilon) + P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon)$$

и

$$P(\xi_n + \eta_n \leq t) \geq F_{\eta_n}(t - a - \varepsilon) - P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon)$$

Устремляя сначала $n \rightarrow \infty$, а затем $\varepsilon \rightarrow 0$. Из сходимости по вероятности получаем, что $P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$. Тогда в итоге имеем:

$$\begin{aligned} \lim (F_{\eta_n}(t - a - \varepsilon) - P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon)) &\leq \lim F_{\xi_n + \eta_n}(t) \leq \lim (F_{\eta_n}(t - a + \varepsilon) + P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon)) \\ \lim F_{\xi_n + \eta_n}(t) &= F_{\eta}(t - a) = F_{a + \eta}(t) \end{aligned}$$

Теперь докажем утверждение для произведения. Пусть $a = 0$ (случай, когда $a \neq 0$ выводится из суммы $(\xi_n - a)\eta_n$ и $a\eta_n$). Теперь заметим, что $\forall \varepsilon > 0 \forall C > 0$ верно включение:

$$\{|\xi_n \eta_n| > \varepsilon\} \subseteq \{|\eta_n| > C\} \cup \left\{|\xi_n| > \frac{\varepsilon}{C}\right\}$$

(Пояснение: это верно, так как пересечение отрицания обоих событий точно приводит к противоречию). Тогда, переходя к вероятностям, получаем:

$$P(|\xi_n \eta_n| > \varepsilon) \leq 1 - F_{\eta_n}(C) + F_{\eta_n}(-C) + P\left(|\xi_n| > \frac{\varepsilon}{C}\right)$$

Устремляя сначала $n \rightarrow \infty$, а затем $C \rightarrow \infty$, получаем, что $\xi_n \eta_n \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \xi_n \eta_n \xrightarrow{d} 0$. ■

Пример 6. (Выборочная дисперсия)

Пусть задана последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин ξ_i , причем $\mathbb{E}\xi_i = \mu$ и $\mathbb{D}\xi_i = \sigma^2$. Тогда последовательность случайных величин

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi}_n)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$$

где $\bar{\xi}_n = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ (умножаем на $\frac{1}{n-1}$, а не на $\frac{1}{n}$, чтобы $\mathbb{E}s_n^2 = \sigma^2$, то есть таким образом посчитанная дисперсия по вероятности сходится к именно тому, чему и надо, в другом случае будет небольшое смещение в $\frac{n-1}{n}$ раз, но с увеличением n разница в любом случае будет стираться). Действительно:

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \xi_i^2 - 2n\bar{\xi}_n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i + n\bar{\xi}_n^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \xi_i^2 - n\bar{\xi}_n^2 \right) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{\xi}_n^2$$

Теперь заметим, что по ЗБЧ:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu, \quad \bar{\xi}_n \xrightarrow{P} \mu$$

Получили искомую сходимость

Пример 7. Пусть задана последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин ξ_i , причем $\mathbb{E}\xi_i = \mu$ и $\mathbb{D}\xi_i = \sigma^2 > 0$. Тогда из ЦПТ следует, что:

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$$

Более того, так как $s_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 > 0$, то имеет место сходимость по распределению величин:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{\xi}_n - \mu)}{s_n^2} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$$

Предложение 6. Пусть $a, h_n \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ и f — непрерывно дифференцируемая функция на \mathbb{R} . Если последовательность случайных величин ξ_n сходится по распределению к ξ , то:

$$\frac{f(a + h_n \xi_n) - f(a)}{h_n} \xrightarrow{d} f'(a) \xi$$

Доказательство. Имеет место равенство:

$$\begin{aligned} \frac{f(a + h_n \xi_n) - f(a)}{h_n} &= \frac{f(a + 1 \cdot h_n \xi_n) - f(a + 0 \cdot h_n \xi_n)}{h_n} = \frac{1}{h_n} \int_0^1 f(a + th_n \xi_n) d(a + th_n \xi_n) = \\ &= \xi_n \int_0^1 f(a + th_n \xi_n) dt \end{aligned}$$

Из предложения 5(самый конец) получаем, что $h_n \xi_n \xrightarrow{P} 0$. Также заметим, что функция

$$g(y) = \int_0^1 f(a + ty) dt$$

непрерывна. Следовательно по предложению 4:

$$g(h_n \xi_n) = \int_0^1 f(a + th_n \xi_n) dt \xrightarrow{P} g(0) = f'(a)$$

Теперь снова используя предложение 5, получаем нужную сходимость. ■

Пример 8. Пусть задана последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин ξ_i , причем $\mathbb{E}\xi_i = \mu$ и $\mathbb{D}\xi_i = \sigma^2 > 0$. Если h — непрерывно дифференцируемая функция, то

$$\sqrt{n} (h(\bar{\xi}_n) - h(\mu)) \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, q^2), \quad q = \sigma h'(\mu)$$

Действительно, имеем равенство

$$\sqrt{n} \frac{(h(\bar{\xi}_n) - h(\mu))}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{h\left(\mu + n^{-\frac{1}{2}} \sigma \zeta_n\right) - h(\mu)}{n^{-\frac{1}{2}}}$$

где (сходимость по ЦПТ)

$$\zeta_n = \frac{\sqrt{n} (\bar{\xi}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, 1)$$

Используем предложение 6 и получаем требуемое.

Пример 9. Пусть ξ_1, \dots, ξ_n положительные независимые одинаково распределенные случайные величины, $\mathbb{E}\xi_1 = \mu$, $0 < \mathbb{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Рассмотрим случайную величину $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ и найдем предел в смысле сходимости по распределению у последовательности случайных величин

$$\sqrt{n} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{1}{\mu} \right).$$

Первый способ:

$$\sqrt{n} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{1}{\mu} \right) = -\frac{1}{\mu} \frac{n}{S_n} \sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right)$$

По ЦПТ

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right) \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, \sigma^2)$$

По ЗБЧ

$$\frac{n}{S_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{\mu}$$

Таким образом имеем:

$$\sqrt{n} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{1}{\mu} \right) \xrightarrow{d} -\frac{1}{\mu} \xi \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{\mu^4}\right)$$

Второй способ:

Пусть $h(x) = \frac{1}{x}$, тогда

$$\sqrt{n} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{1}{\mu} \right) = \sqrt{n} \left(h\left(\frac{S_n}{n}\right) - h(\mu) \right) \xrightarrow{d} \xi \sim N\left(0, \sigma^2 (h'(\mu))^2\right) = N\left(0, \frac{\sigma^2}{\mu^4}\right)$$

5 Многомерная характеристическая функция и ЦПТ

Определение 3. Характеристическая функция случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)^T$ определяется равенством

$$\varphi_\xi(x) = \mathbb{E}e^{ix\xi} = \mathbb{E}e^{i\sum_{i=1}^m x_i \xi_i}$$

Предложение 7. $\varphi_\xi \equiv \varphi_\eta \Leftrightarrow \xi$ и η имеют одинаковые распределения

Доказательство. Заметим, что

$$F_\xi(x_1, \dots, x_m) = \mathbb{E}I_{\leq x_1}(\xi_1) \cdots I_{\leq x_m}(\xi_m)$$

По аналогии с одномерным случаем, нам достаточно доказать, что

$$\mathbb{E}g_1(\xi_1) \cdots g_m(\xi_m) = \mathbb{E}g_1(\eta_1) \cdots g_m(\eta_m)$$

для непрерывных периодических функций $g_k(u)$. Такие функции приближаются линейными комбинациями функций вида $e^{i\mu_k u}$. Значит, достаточно проверять совпадение выражений вида

$$\mathbb{E} \exp(i\mu_1 \xi_1 + \cdots + i\mu_m \xi_m) = \mathbb{E} \exp(i\mu_1 \eta_1 + \cdots + i\mu_m \eta_m)$$

А это у нас есть (это хар функции). ■

Следствие 4. Случайные величины ξ_1, \dots, ξ_m независимы тогда и только тогда, когда

$$\varphi_\xi(y_1, \dots, y_m) = \varphi_{\xi_1}(y_1) \cdots \varphi_{\xi_m}(y_m)$$

Доказательство. \Rightarrow

$$\varphi_\xi(y_1, \dots, y_m) = \mathbb{E}e^{i(\xi_1 y_1 + \cdots + \xi_m y_m)} = \mathbb{E}e^{i\xi_1 y_1} \cdots e^{i\xi_m y_m} =$$

В силу независимости ξ_i

$$= \mathbb{E}e^{i\xi_1 y_1} \cdots \mathbb{E}e^{i\xi_m y_m} = \varphi_{\xi_1}(y_1) \cdots \varphi_{\xi_m}(y_m)$$

\Leftarrow

Сделаем новый вектор (η_1, \dots, η_m) , так что:

1. Распр $\eta_i = \text{распр } \xi_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$
2. η_1, \dots, η_m независимы

Определим $F(y) = F_{\eta_1}(y_1) \cdots F_{\eta_m}(y_m)$. Тогда мы знаем, что существует вектор, у которого такая функция распределения, из чего непременно следует независимость η_1, \dots, η_m

Посчитаем хар. функцию $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)$

$$\varphi_\eta(y) = \left[\begin{array}{l} \text{в силу} \\ \text{нез - сти } \eta_i \end{array} \right] = \varphi_{\eta_1}(y_1) \cdots \varphi_{\eta_m}(y_m) = \varphi_{\xi_1}(y_1) \cdots \varphi_{\xi_m}(y_m) = \varphi_\xi(y)$$

По предыдущему предложению и независимости $\eta_1, \dots, \eta_m \Rightarrow \xi_1, \dots, \xi_m$ независимы. ■

Теорема 8. Пусть последовательность независимых одинаково распределенных случайных векторов $\xi^n = (\xi_1^n, \dots, \xi_m^n) \in \mathbb{E}$ имеют конечные

$$\mathbb{E}\xi_i^1 = \mu_i, \quad r_{ij} = \text{cov}(\xi_i^1, \xi_j^1)$$

Тогда величины

$$\eta_i^n = \frac{\xi_i^1 + \dots + \xi_i^n - n\mu_i}{\sqrt{n}}$$

таковы, что последовательность векторов $\eta^n = (\eta_1^n, \dots, \eta_m^n) \xrightarrow{d} \eta$, характеристическая функция которого имеет вид

$$\varphi_\eta(y) = \exp\left(-\frac{\langle yR, y \rangle}{2}\right), \quad R = (r_{ij})$$

Доказательство. В векторной форме:

$$\eta^n = \frac{\sum_{s=1}^n \xi^s - \mu n}{\sqrt{n}}$$

Запишем хар. функцию:

$$\varphi_{\eta^n}(t) = \varphi_{(\xi^1 - \mu + \dots + \xi^n - \mu)/\sqrt{n}}(t) = \varphi_{\xi^1 - \mu + \dots + \xi^n - \mu}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) =$$

В силу независимости ξ_i и их одинаковой распределенности

$$= \left(\varphi_{\xi^1 - \mu}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

Разложим в ряд тейлора:

$$\left(\varphi_{\xi^1 - \mu}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 + \nabla \varphi_{\xi^1 - \mu}(0) \cdot \frac{t}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2} \cdot D^2 \varphi_{\xi^1 - \mu}(0) \left\langle \frac{t}{\sqrt{n}}, \frac{t}{\sqrt{n}} \right\rangle + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n$$

Рассмотрим на 2-мерном случае (на других аналогично):

$$\varphi_\xi(t_1, t_2) = \mathbb{E}e^{it_1\xi_1 + it_2\xi_2}$$

Первая производная:

$$\frac{d}{dt_j} \varphi_\xi(t) = i\mathbb{E}\xi_j e^{it_1\xi_1 + it_2\xi_2}; \quad \frac{d}{dt_j} \varphi_\xi(0) = i\mathbb{E}\xi_j$$

В нашем случае нетрудно понять, что $\nabla \varphi_{\xi^1 - \mu}(0) = 0$, так как у нас ξ это $\xi^1 - \mu$, а $i\mathbb{E}(\xi_i^1 - \mu_i) = 0$

Вторая производная:

$$\frac{d^2}{dt_j dt_s} \varphi_\xi(t) = -\mathbb{E}\xi_j \xi_s e^{it_1\xi_1 + it_2\xi_2}; \quad \frac{d^2}{dt_j dt_s} \varphi_\xi(0) = -\mathbb{E}\xi_j \xi_s$$

В нашем случае $-\mathbb{E}(\xi_j^1 - \mu_j)(\xi_s^1 - \mu_s) = -r_{js}$

Получаем:

$$\left(1 - \frac{1}{2} \langle Rt, t \rangle \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2} \langle Rt, t \rangle}$$

■

6 Многомерное нормальное распределение

Определение 4. Случайный вектор $\xi \in \text{Mat}_{m \times 1}$ имеет *нормальное распределение* или является *гауссовским*, если $\forall x \in \mathbb{R}^m$

$$\varphi_{\xi}(x) = \mathbb{E} e^{ix\xi} = e^{ix\mu - \frac{1}{2}xRx^T}$$

где $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_m)^T$, $R \in \text{Mat}_{m \times m}$ – симметричная неотрицательно определенная. Далее кратко пишем

$$\xi \sim N(\mu, R)$$

Определение 5. Пусть $\xi \in \text{Mat}_{m \times 1}$ случайный вектор. Матрица $R \in \text{Mat}_{m \times m}$ с компонентами $r_{ij} = \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$ называется *ковариационной матрицей* вектора ξ . Можно еще написать, что

$$R = \text{cov}(\xi, \xi) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi)^T$$

Лемма 2. Симметричная неотрицательно определенная матрица $R \in \text{Mat}_{m \times m}$ является ковариационной матрицей случайного вектора-столбца $\xi \in \text{Mat}_{m \times 1}$ тогда и только тогда, когда $\forall x, y \in \mathbb{R}^m$

$$\text{cov}(x\xi, y\xi) = x \text{cov}(\xi, \xi) y^T = xRy^T$$

Доказательство. \Rightarrow

Распишем по определению ковариации двух случайных величин (у нас именно они):

$$\text{cov}(x\xi, y\xi) = \mathbb{E}[(x\xi - \mathbb{E}x\xi)(y\xi - \mathbb{E}y\xi)] = \mathbb{E}[x(\xi - \mathbb{E}\xi)y(\xi - \mathbb{E}\xi)] =$$

Транспонируя скаляр, получаем тот же скаляр:

$$= \mathbb{E}\left[x(\xi - \mathbb{E}\xi)(y(\xi - \mathbb{E}\xi))^T\right] = \mathbb{E}\left[x(\xi - \mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi)^T y^T\right] = x \mathbb{E}\left[(\xi - \mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi)^T\right] y^T = x \text{cov}(\xi, \xi) y^T$$

\Leftarrow

Возьмем $x = e_i$, $y = e_j$ (базисные единичные вектора). Тогда из данного равенства получим:

$$\text{cov}(e_i\xi, e_j\xi) = \text{cov}(\xi_i, \xi_j) = e_i R e_j = r_{ij}$$

Следовательно $R = \text{cov}(\xi, \xi)$ по определению. ■

Предложение 8. $\forall A \in \text{Mat}_{m \times m} \forall b \in \text{Mat}_{m \times 1}$ и $\xi \in \text{Mat}_{m \times 1}$ – случайного вектора, верно:

$$\text{cov}(A\xi + b, A\xi + b) = AR_{\xi}A^T$$

Доказательство. Распишем по определению:

$$\begin{aligned} \text{cov}(A\xi + b, A\xi + b) &= \mathbb{E}\left[(A\xi + b - \mathbb{E}(A\xi + b))(A\xi + b - \mathbb{E}(A\xi + b))^T\right] = \\ &= \mathbb{E}\left[(A\xi + b - b - \mathbb{E}A\xi)(A\xi + b - b - \mathbb{E}A\xi)^T\right] = \mathbb{E}\left[(A\xi - \mathbb{E}A\xi)(A\xi - \mathbb{E}A\xi)^T\right] = \\ &= A \mathbb{E}\left[(\xi - \mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi)^T\right] A^T = AR_{\xi}A^T \end{aligned}$$

■

Следствие 5. Если вектор $\xi \sim N(\mu, R)$, то вектор $A\xi + b \sim N(A\mu + b, AR_{\xi}A^T)$

Теорема 9. Вектор $\xi \in \text{Mat}_{m \times 1}$ имеет нормальное распределение тогда и только тогда, когда $\forall x \in \mathbb{R}^m$ случайная величина $x\xi$ имеет нормальное распределение

Доказательство. \Rightarrow

Если ξ нормальный вектор, то

$$\begin{aligned}\varphi_{x\xi}(t) &= \mathbb{E}e^{itx\xi} = \varphi_{\xi}(tx) = \exp\left(-\frac{1}{2}txR(tx)^T + itx\mu\right) = \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}t^2xRx^T + itx\mu\right)\end{aligned}$$

Получили хар функцию нормального распределения $x\xi \sim N(x\mu, xRx^T)$.

\Leftarrow

В обратную сторону:

$$\begin{aligned}\varphi_{\xi}(x) &= \mathbb{E}e^{ix\xi} = \varphi_{x\xi}(1) = \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbb{D}x\xi + i\mathbb{E}x\xi\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}\text{cov}(x\xi, x\xi) + ix\mu\right) = \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}xRx^T + ix\mu\right)\end{aligned}$$

, где $R = \text{cov}(\xi, \xi)$, $\mu = \mathbb{E}\xi$. Последний переход вытекает из леммы2. ■

Следствие 6. Если $\xi \sim N(\mu, R)$, то $R = \text{cov}(\xi, \xi)$, $\mu = \mathbb{E}\xi$.

Следствие 7. Если вектор $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ имеет нормальное распределение и $\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = 0$, то случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы.

Доказательство. Пусть

$$\mu = \mathbb{E}\xi = (\mu_1, \mu_2)$$

Заметим, что

$$R = \text{cov}(\xi, \xi) = \begin{pmatrix} \text{cov}(\xi_1, \xi_1) & 0 \\ 0 & \text{cov}(\xi_2, \xi_2) \end{pmatrix}$$

Теперь запишем хар функцию ξ :

$$\begin{aligned}\varphi_{\xi}(x_1, x_2) &= \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2\mathbb{D}\xi_1 + x_2^2\mathbb{D}\xi_2) + i(x_1\mu_1 + x_2\mu_2)\right) = \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}x_1^2\mathbb{D}\xi_1 + ix_1\mu_1\right) \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}x_2^2\mathbb{D}\xi_2 + ix_2\mu_2\right) = \varphi_{\xi_1}(x_1) \varphi_{\xi_2}(x_2)\end{aligned}$$

Теперь из следствия4 вытекает независимость ξ_1 и ξ_2 ■

Следствие 8. Если $\xi \sim N(\mu, R) (\in \text{Mat}_{m \times 1})$, то $\exists A \in \text{Mat}_{m \times k}$, что $\xi = A\eta + \mu$, где $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_k)^T$, η_i — независимые $N(0, 1)$ случайные величины. Причем $AA^T = R$

Доказательство. Пусть

$$\xi' = \xi - \mu = (\xi'_1, \dots, \xi'_m)^T$$

Свели задачу к задачи нахождения ортонормированного базиса $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_k)^T$ в подпространстве $\langle \xi'_1, \dots, \xi'_m \rangle$ со скалярным произведением $(X, Y) = \mathbb{E}XY$. Эта задача решается методом Грама-Шмидта. Получили матрицу перехода A , что

$$\xi - \mu = \xi' = A\eta$$

То есть

$$\xi = A\eta + \mu$$

Осталось пояснить $AA^T = R$:

$$R = \text{cov}(\xi, \xi) = \text{cov}(\xi - \mu, \xi - \mu) = \text{cov}(A\eta, A\eta) = A\text{cov}(\eta, \eta)A^T = AEA^T = AA^T$$

$\text{cov}(\eta, \eta) = E$, так как это ортонормированный базис. ■

Теорема 10. Если $\xi \sim N(\mu, R)$ (в этой теореме сделаем $\mu := \mu^T \in R^m$) и $\det R \neq 0$, случайный вектор ξ имеет плотность

$$\rho(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}} \sqrt{\det R}} e^{-2^{-1}(x-\mu)R^{-1}(x-\mu)^T}$$

Доказательство. Так как $\xi = A\eta + \mu$, причем $\exists A^{-1}$, то

$$\begin{aligned} P(\xi \in B) &= P(A\eta + \mu \in B) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^m} \int_{A\eta + \mu \in B} e^{-2^{-1}xx^T} dx = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}}} \int_B e^{-2^{-1}(A^{-1}(x-\mu))(A^{-1}(x-\mu))^T} d(A^{-1}(x-\mu)) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}} \det A} \int_B e^{-2^{-1}(A^{-1}(x-\mu))(A^{-1}(x-\mu))^T} dx \end{aligned}$$

Остается заметить, что

$$\det AA^T = (\det A)^2 = \det R$$

и что

$$\begin{aligned} A^{-1}(x-\mu)(A^{-1}(x-\mu))^T &= (x-\mu)A^{-1}(A^{-1})^T(x-\mu)^T = \\ &= (x-\mu)(AA^T)^{-1}(x-\mu)^T = (x-\mu)R^{-1}(x-\mu)^T \end{aligned}$$

■

Пример 10. Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, где $\xi_i \sim N(0, \sigma^2)$ и независимы между собой (или, что то же самое $\xi \sim N(0, \sigma^2 E)$). Положим

$$\bar{\xi} = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}, \quad \zeta = (\xi_1 - \bar{\xi})^2 + \dots + (\xi_n - \bar{\xi})^2$$

(ζ — выборочная дисперсия). Покажем, что $\bar{\xi}$ и ζ независимы.

Пусть $U \in \text{Mat}_{n \times n}$ — ортогональная матрица ($UU^T = E$), первая строка которой имеет вид $(n^{-\frac{1}{2}}, \dots, n^{-\frac{1}{2}})$. Тогда координаты вектора $u = U\xi \sim N(0, U\sigma^2 EU^T) = N(0, \sigma^2 E)$ являются независимыми. Заметим, что $u_n = \bar{\xi}\sqrt{n}$ и что

$$u^T u = u_1^2 + \dots + u_n^2 = n\bar{\xi}^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 = \xi^T U^T U \xi = \xi^T \xi = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2$$

Иначе говоря

$$u_2^2 + \dots + u_n^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2 - n\bar{\xi}^2$$

Теперь заметим

$$\zeta = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2 - 2 \sum_{i=1}^n \xi_i \bar{\xi} + n\bar{\xi}^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2 - n\bar{\xi}^2 = u_2^2 + \dots + u_n^2$$

Так как u_1, \dots, u_n — независимы, то и $\frac{u_1}{\sqrt{n}} = \bar{\xi}$ и $u_2^2 + \dots + u_n^2 = \zeta$ тоже независимы.

Распределение величины $\chi = \eta_1^2 + \dots + \eta_n^2$, где η_i независимые с распределением $N(0, 1)$, называют распределением хи-квадрат с n степенями свободы и обозначают через χ_n^2 . Найдем плотность распределения χ_n^2 :

$$P(\chi \leq t) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \int_{\eta_1^2 + \dots + \eta_n^2 \leq t} e^{-\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{2}} dx =$$

Делаем сферическую замену (w_n — площадь n -мерной единичной сферы):

$$= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} w_n \int_0^{\sqrt{t}} r^{n-1} e^{-\frac{r^2}{2}} dr$$

Тогда

$$\rho(t) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} w_n \cdot \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} = \frac{1}{2} (2\pi)^{-\frac{n}{2}} w_n t^{\frac{n-2}{2}} e^{-\frac{t}{2}} \text{Ind}_{t>0}$$

7 Условные математические ожидания: дискретный случай

Предположим, что задана дискретная случайная величина

$$\xi(w) = \sum_{i=1}^n x_i \text{Ind}_{A_i}(w)$$

Рассмотрим следующую задачу: найти математическое ожидание ξ , если достоверно известно, что произошло событие B , $P(B) > 0$. Поскольку мы знаем, что событие B произошло, то надо пересчитать вероятности A_k с учетом новой информации, а именно, заменить $P(A_k)$ на $P(A_k|B)$. Таким образом, надо вычислить математическое ожидание не относительно исходной вероятностной меры P , а относительно условной вероятности $P(\cdot|B)$.

Определение 6. Имеем:

$$\mathbb{E}(\xi|B) = \sum_{i=1}^n x_i P(A_i|B) = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\mathbb{E}(\text{Ind}_{A_i} \text{Ind}_B)}{P(B)} = \frac{\mathbb{E}(\xi \text{Ind}_B)}{P(B)}$$

Это выражение будем называть *условным математическим ожиданием относительно события B* .

Пусть теперь имеется разбиение

$$\Omega = \bigcup_{k=1}^N B_k, \quad B_k \cap B_m = \emptyset, \quad P(B_k) > 0$$

Обозначим это разбиение $\{B_k\}$ через \mathcal{B} . Удобно собрать вместе значения условных математических ожиданий $\mathbb{E}(\xi|B_k)$.

Определение 7. Рассмотрим случайную величину:

$$\Lambda(w) = \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) \mathbb{E}(\xi|B_i)$$

Если $w \in B_i$, то эта случайная величина выдает среднее значение ξ при условии, что произошло событие B_i . Величину $\Lambda(w)$ называют *условным математическим ожиданием относительно разбиения \mathcal{B}* и обозначают через $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})$.

Случайную величину

$$P(A|\mathcal{B}) = \mathbb{E}(\text{Ind}_A|\mathcal{B})$$

называют условной вероятностью события A относительно разбиения \mathcal{B} . Ясно, что

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}) &= \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) \mathbb{E}(\xi|B_i) = \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) \sum_{j=1}^n x_j P(A_j|B_i) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) x_j P(A_j|B_i) = \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) P(A_j|B_i) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i}(w) \mathbb{E}(\text{Ind}_{A_j}|B_i) = \sum_{j=1}^n x_j \mathbb{E}(\text{Ind}_{A_j}|\mathcal{B}) = \\ &= \sum_{j=1}^n x_j P(A_j|\mathcal{B}) \end{aligned}$$

Пример 11. Рассмотрим важный пример, когда $\mathcal{B} = \{B, \overline{B}\}$. Тогда

$$P(A|\mathcal{B}) = \text{Ind}_B P(A|B) + \text{Ind}_{\overline{B}} P(A|\overline{B})$$

Если $w \in B$, то $P(A|\mathcal{B})(w) = P(A|B)$

Теорема 11. Имеют место следующие свойства условного математического ожидания:

- (1) (линейность) $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\eta|\mathcal{B}) = \alpha\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}) + \beta\mathbb{E}(\eta|\mathcal{B})$
- (2) (монотонность) из $\xi \leq \eta$ следует $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{B})$
- (3) (аналог формулы полной вероятности) $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})) = \mathbb{E}\xi$
- (4) (независимость) если случайная величина ξ не зависит от разбиения \mathcal{B} , т.е. случайные величины ξ и Ind_{B_k} независимы, то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}) = \mathbb{E}\xi$
- (5) для всякой случайной величины $\eta = \sum_{k=1}^N c_k \text{Ind}_{B_k}$ верно равенство $\mathbb{E}(\eta\xi|\mathcal{B}) = \eta\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})$

Доказательство. Свойства (1) и (2) следуют из того, что они верны отдельно для каждого B_k . Свойство (3) проверяется непосредственной подстановкой:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i} \mathbb{E}(\xi|B_i)\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^N \text{Ind}_{B_i} \frac{\mathbb{E}(\xi \text{Ind}_{B_i})}{P(B_i)}\right) = \sum_{i=1}^N \mathbb{E}(\text{Ind}_{B_i}) \frac{\mathbb{E}(\xi \text{Ind}_{B_i})}{P(B_i)} = \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbb{E}(\xi \text{Ind}_{B_i}) = \mathbb{E}\xi \end{aligned}$$

Обоснуем пункт (4). Так как ξ и Ind_{B_k} независимы, то

$$\mathbb{E}(\xi|B_k) = \frac{\mathbb{E}(\xi \text{Ind}_{B_k})}{P(B_k)} = \frac{\mathbb{E}\xi \mathbb{E} \text{Ind}_{B_k}}{P(B_k)} = \mathbb{E}\xi$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}) = \sum_{k=1}^N \text{Ind}_{B_k}(w) \mathbb{E}(\xi|B_k) = \sum_{k=1}^N \text{Ind}_{B_k}(w) \mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\xi$$

Для обоснования (5) достаточно заметить, что

$$\mathbb{E}(\eta\xi|B_k) = c_k \mathbb{E}(\xi|B_k)$$

■

Наиболее типична ситуация, когда разбиение \mathcal{B} появляется посредством некоторой случайной величины

$$\eta = \sum_{i=1}^N y_i \text{Ind}_{B_i},$$

где y_i — различные числа и $P(B_i) > 0$.

Определение 8. В этом случае $B_i = \{w : \eta(w) = y_i\}$ и условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})$ обозначают через $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ и называют *условным математическим ожиданием относительно η* .

Несложно предъявить функцию F (это можно сделать несколькими способами), что

$$\mathbb{E}(\xi|\eta)(w) = F(\eta(w))$$

Легко видеть, что $F(y_i) = \mathbb{E}(\xi|B_i)$.

Можно воспринимать $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ как проекцию ξ на η , а $\mathbb{E}\xi\eta$ как их скалярное произведение.

Лемма 3. Для условного математического ожидания выполнено

$$\mathbb{E}(\xi f(\eta)) = \mathbb{E}[f(\eta) \mathbb{E}(\xi|\eta)]$$

для произвольной функции f . Кроме того, если для какой-то случайной величины $\zeta = g(\eta)$ выполнено

$$\mathbb{E}(\xi f(\eta)) = \mathbb{E}(f(\eta) \zeta),$$

то $\zeta = \mathbb{E}(\xi|\eta)$ п.н.

Доказательство. По (5) и (4) из теоремы 11:

$$\mathbb{E}[f(\eta) \mathbb{E}(\xi|\eta)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(f(\eta) \xi|\eta)] = \mathbb{E}(f(\eta) \xi)$$

Докажем вторую часть:

$$\mathbb{E}(f(\eta) \zeta) = \mathbb{E}(\xi f(\eta)) = \mathbb{E}[f(\eta) \mathbb{E}(\xi|\eta)]$$

$$\mathbb{E}[f(\eta) (\zeta - \mathbb{E}(\xi|\eta))] = 0$$

Так как ζ и $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ — функции от η , то возьмем $f(\eta) = \zeta - \mathbb{E}(\xi|\eta)$ и получим:

$$\mathbb{E}(\zeta - \mathbb{E}(\xi|\eta))^2 = 0,$$

то есть $\zeta = \mathbb{E}(\xi|\eta)$ п.н. ■

Теперь докажем, что $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ и правда является проекцией ξ на η .

Предложение 9. Пусть $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$. Условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ среди всех случайных величин вида $f(\eta)$ является лучшим среднеквадратическим приближением для ξ , т.е.

$$\min_{\zeta=f(\eta)} \mathbb{E}(\xi - \zeta)^2 = \mathbb{E}[\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta)]^2$$

Доказательство. Пусть $\zeta = f(\eta)$. Так как $(\mathbb{E}(\xi|\eta) - \zeta)$ — функция от η

$$\mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta))(\mathbb{E}(\xi|\eta) - \zeta)] = 0,$$

то

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi - \zeta)^2 &= \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta)) + (\mathbb{E}(\xi|\eta) - \zeta)]^2 = \\ &= \mathbb{E}[\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta)]^2 + 2\mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta))(\mathbb{E}(\xi|\eta) - \zeta)] + \mathbb{E}[\mathbb{E}(\xi|\eta) - \zeta]^2 \geq \mathbb{E}[\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta)]^2 \end{aligned}$$

Последнее неравенство достигается взятием $\zeta = \mathbb{E}(\xi|\eta)$ ■

8 Условные математические ожидания: общий случай

Определение 9. ξ, η — случайные величины. $\mathbb{E}|\xi| < \infty$. Тогда случайная величина вида $F(\eta)$ называется *условным математическим ожиданием* $\mathbb{E}(\xi|\eta)$, если

$$\mathbb{E}[\xi f(\eta)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(\xi|\eta) f(\eta)]$$

для любой ограниченной f . Любые две случайные величины, удовлетворяющие этому условию почти наверное совпадают (лемма 3).

Из этого определения следует, что $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ есть наименее отличающаяся от ξ случайная величина вида $F(\eta)$, то есть проекция ξ на η .

Предложение 10. *Предположим, что распределение случайной величины (ξ, η) задано совместной плотностью $\rho_{\xi\eta}(x, y)$. Тогда*

$$\mathbb{E}(g(\xi, \eta) | \eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \frac{\rho_{\xi\eta}(x, y)}{\rho_{\eta}(y)} dx$$

Доказательство. Имеет место цепочка равенств:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(\xi, \eta) f(\eta)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(y) \rho_{\xi\eta}(x, y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \frac{\rho_{\xi\eta}(x, y)}{\rho_{\eta}(y)} \rho_{\eta}(y) dy}_{=F(y)} dy = \mathbb{E}[F(\eta) f(\eta)] \end{aligned}$$

Следовательно $F(\eta) = \mathbb{E}(\xi|\eta)$ по определению. ■