



Crises TEA



Não quer se vestir

⚠ SINAIS DA CRISE

- Recusa roupa (chora, trava, foge, empurra a roupa)
- Aceita só “aquela” roupa
- Rasga/tira a roupa após vestir

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Você interrompeu algo preferido sem aviso?
- Mudou tecido/etiqueta/temperatura/pressão da roupa?
- Ele está com pressa, sono, fome ou indo para lugar sem querer?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sensibilidade tátil (etiqueta, costura, elástico, jeans)
- Rigidez + necessidade de previsibilidade (rotina/roupa “segura”)
- Transição abrupta + baixa tolerância a demanda

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Dê 2 opções (A ou B), sem abrir “cardápio infinito”
- Use poucas palavras + gesto (mostra roupa, aponta sequência)
- Faça primeiro- depois: “Primeiro vestir, depois (algo curto e real)”
- Se preciso: ajuda física gentil (mão sobre mão), mantendo voz baixa



Crises TEA



Crise na transição (parar uma atividade)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Crise quando precisa parar (brincar/tela/parque)
- “Trava”, chora, grita, se joga no chão
- Negocia sem fim (“só mais um” infinito)

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Teve aviso (5–2–1 minutos)?
- A próxima atividade é menos preferida?
- Ele já está sobrecarregado (barulho, cansaço)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Dificuldade de transição (função executiva)
- Acesso a reforçador (quer manter o prazer)
- Ansiedade por imprevisibilidade (“o que vem depois?”)

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Use timer visual ou contagem regressiva curta
- “Primeiro X, depois Y” (Y precisa ser claro e alcançável)
- Dê uma escolha dentro da transição: “Você guarda ou eu guardo?”
- Mantenha o limite sem renegociar após crise começar



Crises TEA



Crise sensorial (barulho/luz/cheiro/lotação)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Choro, grito, tapa o ouvido, foge
- Irritação súbita em mercado/festa
- “Desliga” (fica rígido, não responde)

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Mudou o ambiente (luz forte, som alto, cheiro)?
- Ele passou tempo demais sem pausa?
- Está com fome/sono/dor (dente, ouvido, barriga)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Hipersensibilidade sensorial
- Sobrecarga acumulada (sem pausas)
- Interocepção/dor mal comunicada

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Tire do estímulo (banheiro, carro, canto quieto)
- Fale menos + tom baixo (comandos curtos)
- Ofereça ferramenta reguladora (fone, óculos, mordedor, peso/propriocepção)
- Não force permanência no pico: primeiro regular, depois retomar



Crises TEA



Agressividade (bater, morder, empurrar)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Bate em adulto/criança
- Morde quando contrariado
- Joga objetos em pessoas

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Aconteceu após “não”, demanda ou tirar algo?
- Ele tentou comunicar e não conseguiu?
- Tem padrão: fome, cansaço, transição, ambiente?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Frustração + comunicação limitada
- Fuga/evitar demanda (escapar de tarefa)
- Sobrecarga sensorial/emocional

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Segurança primeiro: bloquear golpes com antebraço/almofada, afastar objetos
- Reduzir fala (sem sermão), postura neutra
- Direcionar para comportamento alternativo: “mãos calmas” + mostrar o que fazer
- Após acalmar: ensinar pedido funcional (“pausa”, “ajuda”, “acabou”)



Crises TEA



Autoagressão (bater cabeça, se arranhar)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Bate a cabeça, se morde, se arranha
- Se joga contra parede/chão
- Aumenta quando contrariado

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Houve dor/desconforto (dente, ouvido, intestino, refluxo)?
- Ocorre em demandas específicas?
- Ocorre em ambiente muito estimulante?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Autorregulação sensorial (propriocepção/dor “organiza”)
- Comunicação de dor/desconforto
- Fuga de demanda + alto estresse

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Proteger: afastar superfícies duras, usar almofada/acolchoado
- Reduzir estímulos e demandas, conduzir para lugar seguro
- Oferecer alternativa sensorial segura (pressão profunda, abraço “sanduíche” se ele aceita)
- Se frequente/intenso: registrar e acionar equipe terapia/ tratamento



Crises TEA



Crise ao desligar telas

⚠ SINAIS DA CRISE

- Explode quando tira celular/TV
- Negocia, grita, agride, foge
- “Só mais um” sem fim

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Houve aviso (timer)? ou foi “arrancado”?
- O conteúdo é muito estimulante?
- A tela está sendo usada para acalmar sempre?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Reforço alto (dopamina + hiperestimulação)
- Transição abrupta
- Tela como principal regulador emocional (dependência comportamental)

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Não devolver no pico (evita aprender “crise = ganha tela”)
- Conduzir para transição física (água, banheiro, pular... próxima atividade que a criança goste)
- Use frase única repetida: “acabou tela, agora X”
- Reduzir estímulos (TV off, som baixo, ambiente neutro)

Recusa alimentar / seletividade

⚠ SINAIS DA CRISE

- Não aceita alimentos novos
- Só come 3-5 coisas
- Crise ao ver comida diferente

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Mudou marca/forma/temperatura?
- Ambiente com pressão ("come logo!")?
- Ele está constipado, com refluxo, dor?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sensibilidade oral (textura/cheiro/temperatura)
- Ansiedade + rigidez
- História de pressão alimentar/associação negativa

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Tirar pressão: "você não precisa comer tudo, fique apenas na mesa"
- Oferecer "seguro + desafio mínimo" (1 micro pedaço ao lado)
- Permitir estratégia "cheirar/tocar/lamber" como progresso
- Encerrar refeição se escalando, e retomar depois (sem briga)

Não quer tomar banho

⚠ SINAIS DA CRISE

- Chora, foge, briga para entrar no banho
- Não tolera água na cabeça
- Trava com barulho do chuveiro

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Mudou temperatura/pressão?
- Luz do banheiro/eco/cheiro incomodam?
- Ocorreu após evento cansativo?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sensibilidade tátil/auditiva
- Imprevisibilidade do banho
- Transição + demanda

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Reduza exigência: banho por etapas (lavar corpo hoje, cabelo depois)
- Dê controle: "você liga o chuveiro ou eu?"
- Use utensílio alternativo (copo, ducha manual, toalha úmida)
- Timer curto + reforço ao final (algo simples e imediato)

Não quer escovar dentes

⚠ SINAIS DA CRISE

- Fecha boca, foge, morde a escova
- Grita ao encostar na gengiva
- Só aceita "do jeito dele" (incompleto)

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Pasta tem sabor forte?
- Escova é dura/grande?
- Você tenta "segurar" e forçar?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Hipersensibilidade oral
- Controle/aversão por experiências ruins
- Rotina imprevisível

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Trocar para escova macia/infantil/elétrica + pasta neutra (ou sem pasta inicialmente)
- Técnica por "micro passos": 5 segundos → reforço → mais 5
- Dar escolha: "você começa em cima ou embaixo?"
- Se morde: usar mordedor antes para regular

"Se joga no chão / birra intensa"

⚠ SINAIS DA CRISE

- Se joga, chora alto, rola
- Não aceita se levantar
- Pode atrair olhares e aumentar estresse

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Aconteceu após "não" ou transição?
- Ele estava cansado/sem pausa?
- Você já cedeu antes nesses momentos?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Frustração + rigidez
- Busca de acesso (quer algo) ou fuga (evitar algo)
- Aprendizagem: "se eu faço isso, ganho/evito"

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Segurança física (afastar do perigo, proteger cabeça)
- Pouca fala, postura neutra
- Repetir frase curta: "eu ajudo quando acalmar"
- Quando reduzir: oferecer saída: "levantar comigo ou sozinho?"

Grita em público

⚠ SINAIS DA CRISE

- Gritos altos, repetidos
- Escala rápido em locais movimentados
- Pode virar fuga/agressão

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Local barulhento/luz forte/filas?
- Você está pedindo muitas coisas seguidas?
- Ele quer sair (fuga) ou quer algo (acesso)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sobrecarga sensorial
- Comunicação de necessidade ("quero sair")
- Busca de atenção quando sem alternativa

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Retirar para local neutro por 2-5 minutos
- Comunicação funcional: "mostra o cartão: pausa / sair"
- Reduzir exigências, oferecer água/lanche
- Voltar só quando regulado (ou encerrar se necessário)

Fuga (sair correndo)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Sai disparado em rua/mercado/parque
- Não atende chamado
- Risco alto de acidente

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Houve sobrecarga sensorial?
- Ele estava tentando escapar de demanda?
- Ele viu algo de interesse (perseguição/hiperfoco)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Busca sensorial/estimulação
- Fuga/evitação
- Impulsividade + baixa noção de perigo

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Prioridade: conter com segurança (mãos firmes, sem bronca longa)
- Levar para local seguro e reduzir estímulos
- Não "correr atrás gritando" como padrão (pode virar brincadeira)
- Depois de calmo: treinar comando "para" com reforço

Destrói objetos

⚠ SINAIS DA CRISE

- Quebra brinquedo, rasga papel, joga coisas
- Acontece em frustração ou tédio
- Pode virar risco para outros

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Foi contrariado/demandado?
- Estava sem atividade estruturada?
- O objeto destruído tem valor sensorial (som, textura)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Frustração e descarga motora
- Busca sensorial
- Falta de repertório para pedir pausa/ajuda

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Remover objetos perigosos e reduzir estímulos
- Direcionar para alternativa segura de “descarga” (rasgar papel, amassar jornal)
- Frase curta: “quebrar não, rasgar papel pode.”
- Reforçar assim que usar alternativa correta

Não aceita ir para escola

⚠ SINAIS DA CRISE

- Chora, trava, foge na hora de sair
- Recusa mochila/porta
- Crise ao chegar

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Mudou professor/rotina/ambiente?
- Teve conflito recente na escola?
- Está com sono/constipação/dor?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Ansiedade social ou sensorial
- Fuga de demandas escolares
- Experiências negativas (bullying, exigência sem suporte)

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Validar + manter a rota (“eu sei que é difícil, eu vou te ajudar”)
- Reduzir linguagem e demandas extras na manhã
- “Primeiro carro, depois música/objeto” (reforço breve)
- Se crise forte: entrar com plano combinado com escola (acolhimento)

Não dorme / acorda de madrugada

⚠ SINAIS DA CRISE

- Dificuldade de iniciar sono
- Desperta e quer tela/brincar
- Irritabilidade no dia seguinte

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Telas à noite? Rotina irregular? Cochilos longos?
- Refeição pesada tarde? Ambiente claro/barulhento?
- Dor, refluxo, constipação?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Higiene do sono inadequada
- Ansiedade e dificuldade de desacelerar
- Condicionamento: acordar = ganha atenção/tela

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Ambiente: escuro, silencioso, interação mínima
- Frase curta repetida: “é hora de dormir”
- Redirecionar para rotina calma (água, banheiro, deitar)
- Evitar reforçadores grandes (tela/lanche “especial”) de madrugada

Recusa tarefas (lição/terapia/arrumar)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Diz “não”, foge, chora, agride
- Procrastina até estourar
- Só faz com briga

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- A tarefa é longa/abstrata? Sem começo/fim claro?
- Ele sabe fazer ou está difícil demais?
- Você está pedindo várias demandas em sequência?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Fuga/evitação (muito difícil ou aversivo)
- Falta de clareza e previsibilidade
- Reforço insuficiente para “fazer” (só tem bronca)

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Quebrar em passos: “faz 1 minuto”
- Dar escolha: “você começa por A ou B?”
- “Primeiro tarefa curta, depois reforço”
- Ajudar no início (prompt) e ir retirando gradualmente

Não responde quando chamado

⚠ SINAIS DA CRISE

- Parece “ignorar”
- Só responde quando quer
- Aumenta em hiperfoco

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele está hiperfocado?
- Você chama de longe/sem contato visual?
- O chamado sempre vira demanda?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Processamento auditivo/atenção seletiva
- Hiperfoco/interesse restrito
- Aprendeu que “chamar = bronca/tarefa”

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Chegar perto + tocar leve no ombro + falar o nome 1 vez
- Usar comando curto e concreto (“vem aqui”)
- Reforçar imediatamente quando responde (elogio específico)
- Evitar repetir 10 vezes (vira “ruído”)

Ecolalia / repetição intensa

⚠ SINAIS DA CRISE

- Repete frases sem parar
- Usa scripts fora de contexto
- Dificulta comunicação funcional

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Aumentou em ansiedade/cansaço?
- Ele está tentando pedir algo?
- O ambiente está exigindo fala complexa?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Autorregulação (acalmar)
- Processamento de linguagem
- Tentativa de comunicação indireta

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Validar e modelar: “Você quer X?”
- Oferecer escolha visual (apontar)
- Reduzir perguntas abertas; usar perguntas fechadas
- Reforçar quando ele usa forma mais funcional

Não divide / briga por brinquedo

! SINAIS DA CRISE

- Toma brinquedo
- Bate/chora quando outro pega
- Crise em parquinho/irmãos

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele entende “turnos” (minha vez/sua vez)?
- Brinquedo é hiperpreferido?
- O adulto tentou “forçar dividir” sem preparo?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Déficit de habilidade social (troca de turno/alternar vez)
- Rigidez + posse como segurança
- Ansiedade e baixa tolerância

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Intervir cedo: bloquear tomada e organizar turnos
- Usar timer: “2 minutos você, 2 minutos ele”
- Oferecer alternativa: “troca por este”
- Reforçar quando ele espera/cede (elogio + ganho real)

Não aceita perder

! SINAIS DA CRISE

- Crise em jogos
- Rasga cartas/derruba peças
- Acusa/nega regra

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Jogo é competitivo demais para o nível atual?
- Ele está cansado?
- Você costuma “deixar ganhar” sempre?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Baixa tolerância à frustração
- Rigidez cognitiva
- Falta de treino gradual de perder

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Parar o jogo se escalou (“agora pausa”)
- Validar + ensinar frase: “perdi, tudo bem”
- Retomar com versão mais fácil/cooperativa
- Reforçar “bom perder” (quando aceita, ganha algo)

Crise com mudança de planos

! SINAIS DA CRISE

- Entra em crise quando “não vai dar”
- Insiste rigidamente
- Chora, grita, agride

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Foi avisado de surpresa?
- Ele tinha expectativa fixa (promessa)?
- Já estava no limite sensorial?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Rigidez cognitiva
- Ansiedade por imprevisibilidade
- Dificuldade de flexibilidade mental

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Falar pouco, validar: “mudou, eu sei”
- Mostrar alternativa concreta (imagem/objeto)
- Dar escolha limitada dentro do novo plano
- Usar “primeiro-depois” e manter firme

Medos intensos (barulho, banheiro, cachorro, etc.)

! SINAIS DA CRISE

- Evita, chora, trava
- Fuga ao ver/ouvir estímulo
- Pode agredir para escapar

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- O medo surgiu após evento específico?
- O estímulo aparece de repente?
- Você está expondo rápido demais?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Ansiedade + sensorial
- Associação negativa (condicionamento)
- Falta de previsibilidade/controlar

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Afastar e regular primeiro
- Nomear e validar (“assustou”)
- Exposição mínima e controlada (só olhar de longe)
- Reforçar coragem por micro passos

Hiperfoco que impede rotina

! SINAIS DA CRISE

- Só quer falar/ficar na mesma coisa
- Crise quando interrompe
- Ignora todo resto

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele está usando isso para regular ansiedade?
- Você cortou de uma vez?
- Não há atividades concorrentes interessantes?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Interesse restrito como autorregulação
- Reforço muito alto comparado ao resto
- Dificuldade em alternar atenção

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Usar como ponte: “primeiro X, depois 2 min do tema”
- Timer para delimitar
- Escolha: “você termina em 1 ou 2 minutos?”
- Redirecionar para atividade relacionada (variação do interesse)

Invasão de espaço / toque inadequado

! SINAIS DA CRISE

- Abraça desconhecido, pega no outro
- Chega muito perto
- Toca objetos/pessoas sem permissão

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele busca propriocepção/contato para regular?
- Você ensinou “distância” com exemplo visual?
- Ambiente muito estimulante?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Déficit de habilidade social/pragmática
- Busca sensorial (pressão, toque)
- Impulsividade + falta de regra clara

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Bloquear gentilmente e modelar: “mãos no bolso / mãos calmas”
- Ensinar alternativa: “toca aqui” (high-five) em vez de abraço
- Repetir regra curta: “perguntar antes”
- Reforçar quando respeita distância

Fala inadequada em público / sinceridade dura

⚠ SINAIS DA CRISE

- Diz coisas ofensivas sem intenção
- Repete palavras/scripts
- Expõe detalhes íntimos

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele copiou de vídeo/pessoas?
- Você corrigiu com bronca longa (reforça atenção)?
- Ele entende contexto social?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Déficit pragmático (uso social da linguagem)
- Ecolalia de conteúdo inadequado
- Busca de reação/atenção

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Correção curta e neutra ("isso não")
- Dar frase substituta ("fala: oi, tudo bem")
- Redirecionar para assunto seguro
- Reforçar imediatamente quando usa fala adequada

Tira a roupa em público

⚠ SINAIS DA CRISE

- Puxa a roupa, tira sapato, abaixa calça
- Pode ocorrer em calor/desconforto
- Gera risco social e estresse alto

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Roupa incomoda (costura, etiqueta, calor)?
- Ele tenta comunicar desconforto/banheiro?
- Ambiente lotado e ele busca aliviar?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sensorial (calor, pressão, textura)
- Comunicação de necessidade fisiológica
- Autorregulação/ansiedade

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Cobrir com calma (casaco/toalha) e conduzir a local reservado
- Checar banheiro/temperatura e ajustar roupa
- Dar comando curto: "roupa fica" + oferecer alternativa (abanar, água)
- Evitar sermão; resolver e retomar

Resiste à terapia (não entra/não participa)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Chora ao chegar
- Foge da sala
- Não coopera e sabotagem atividades

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Houve sessão muito difícil anterior?
- A terapia está exigente demais sem reforço?
- Ele entende o que vai acontecer (previsibilidade)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Associação negativa (histórico aversivo)
- Fuga de demanda
- Falta de motivadores e pareamento

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Pareamento rápido: 2-5 min de atividade preferida com terapeuta
- Reduzir exigência no começo ("ganhar confiança")
- Regras simples: "primeiro 1 tarefa, depois 1 prêmio"
- Manter transição consistente (sem longas despedidas)

Joga objetos no chão

⚠ SINAIS DA CRISE

- Derruba copo, comida, brinquedo
- Repete em sequência
- Pode mirar em reação do adulto

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ele quer atenção?
- Está frustrado/entediado?
- O som/efeito é sensorialmente reforçador?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Busca de atenção/reação
- Busca sensorial (som, impacto)
- Comunicação ("acabou", "não quero") mal substituída

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Reduzir reação emocional (neutro)
- Bloquear acesso a itens que viram projéteis
- Ensinar alternativa imediata: "coloca aqui" / "me dá"
- Reforçar quando entrega/usa certo

Quer controlar tudo (rigidez extrema)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Exige que tudo seja "do jeito dele"
- Não tolera pequenas variações
- Crises frequentes por controle

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Houve mudança de rotina?
- Ele está ansioso/sobrecarregado?
- Você abre muitas opções e aumenta insegurança?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Ansiedade + necessidade de previsibilidade
- Rigidez cognitiva
- Histórico de reforço: crise = adulto cede

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Dar escolhas limitadas (2 opções)
- Manter limite com frase curta e repetida
- Oferecer "controle seguro": ele escolhe a ordem de 2 tarefas
- Reforçar flexibilidade mínima ("você aceitou diferente!")

Pica (coloca/come itens não comestíveis)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Coloca objetos na boca / mastiga coisas (papel, terra, plástico)
- Engole itens pequenos
- Procura itens "proibidos" (risco)

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Acontece mais em tédio/tempo vazio?
- Ocorre em crise sensorial/ansiedade?
- Há sinais de fome, cansaço, ou desconforto gastrointestinal?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Busca sensorial oral (autorregulação)
- Fuga/ocupação em contextos sem estrutura
- Deficiência de comunicação ("preciso de pausa", "quero mastigar")

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Segurança: retirar itens pequenos/perigosos do alcance e supervisionar de perto
- Redirecionar para alternativa oral segura (mordedor, canudo grosso, alimento crocante se apropriado)
- Dar comando curto + visual: "isso não + isso sim" (mostrar alternativa)
- Reduzir estímulos e oferecer atividade de mãos (massinha, blocos) para ocupar

Comportamentos com fezes (manipular/sujar/espalhar)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Suja paredes/roupas/objetos após evacuar
- Tenta mexer na fralda/vaso repetidamente
- Acontece mais à noite ou sozinho

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ocorre com constipação, fezes endurecidas, dor ao evacuar?
- Ocorre quando fica sem supervisão (banho/noite)?
- Ocorre em busca sensorial (textura/cheiro) ou para chamar atenção?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Constipação/dor (muito comum e gatilho importante)
- Busca sensorial + falta de alternativa
- Rotina de banheiro confusa / pouca previsibilidade

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Segurança e higiene com resposta neutra (pouca fala, sem "show" emocional)
- Levantar imediatamente para limpeza com sequência visual "limpar → roupa → lavar mãos"
- Redirecionar para atividade sensorial substituta (massinha/espuma/areia cinética sob supervisão)
- Registrar gatilho (hora, antes/depois) para ajustar plano

Escapar do banheiro / recusa evacuar / retenção

⚠ SINAIS DA CRISE

- Segura cocô/xixi, evita vaso/banheiro
- Faz em locais inadequados por evitar o banheiro
- Crise quando é levado ao banheiro

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Sinais de constipação (dor, fezes duras, abdome distendido)?
- Medo do vaso (som, descarga, eco)?
- Teve experiência ruim (dor, bronca, pressa)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Dor/constipação + associação negativa
- Sensorial (eco, som da descarga, assento frio)
- Falta de previsibilidade e rotina

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Tirar pressão e reduzir linguagem ("vamos tentar 1 minuto")
- Ajustar ambiente: luz, ruído, assento confortável, banquinho para pés
- Usar reforço imediato por aproximações (sentar 10s já conta)
- Se dor suspeita: pausar treino e acionar equipe (dor muda conduta)

Autoestimulação genital / comportamento sexual inadequado (especialmente em público)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Toca a região íntima para se regular/ansiedade
- Tenta fazer isso em locais públicos (sala, escola, rua)
- Insiste apesar de redirecionamento verbal

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ocorre em tédio, ansiedade, transição, sobrecarga sensorial?
- Há irritação cutânea, coceira, roupa desconfortável, calor?
- Ocorre em busca sensorial específica (pressão/atrito) ou hábito?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Regulação sensorial/ansiedade (não é "maldade")
- Falta de compreensão de regra público x privado
- Desconforto físico (dermatite, coceira) precisa checagem

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Redirecionar sem bronca: frase curta + neutra ("isso é privado")
- Conduzir para local adequado (banheiro/quarto) se necessário
- Oferecer alternativa reguladora imediata (mãos ocupadas: massinha, bolinha, atividade pesada)
- Ajustar roupa (mais confortável) e checar irritação/banho/temperatura

fuga noturna (sair do quarto/casa)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Sai do quarto à noite e anda pela casa
- Tenta sair pela porta/portão
- Some em momentos de distração

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Acorda por desconforto, medo, fome ou barulho?
- A rotina de sono está irregular?
- Ele busca algo específico (água, tela, objeto)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Ansiedade/sono fragmentado
- Busca de reforçador (tela, comida, objetos)
- Fuga de desconforto sensorial (cama, temperatura)

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Segurança imediata (supervisão, conduzir calmamente de volta, pouca fala)
- Frase única: "é hora de dormir" + retorno ao ritual curto
- Não oferecer reforçadores grandes (tela) nesse horário
- Registrar padrão (horário/gatilho) para ajuste

Tirar o cinto / desorganizar no carro

⚠ SINAIS DA CRISE

- Solta cinto repetidamente
- Chuta banco/grita/abre porta se possível
- Crise em trajetos

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Carro associa a lugar aversivo (escola/terapia)?
- Ele tem enjoo, calor, som alto?
- O trajeto é longo sem previsibilidade?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Fuga/controle
- Desconforto sensorial (pressão do cinto, calor)
- Ansiedade por imprevisibilidade

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Parar em local seguro se necessário e reduzir estímulos (sem bronca longa)
- Dar previsibilidade: "faltam 3 minutos" (timer visual/relógio)
- Oferecer tarefa de mãos (objeto, fidget) e reforço por "cinto preso"
- Manter regra firme e curta (sem negociar no pico)

Escalada perigosa / busca por altura (sobe em móveis, janelas)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Sobe em sofá/armário/janela
- Pula de lugares altos
- Acontece em tédio ou agitação

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Ocorre quando precisa de movimento/pressão?
- Casa está com pouco "espaço permitido" para motor?
- Acontece em momentos de demanda (fuga)?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Busca vestibular/proprioceptiva intensa
- Falta de alternativa segura para movimento
- Fuga/evitar tarefa

⚡ AÇÃO IMEDIATA

- Segurança: retirar acesso imediato a áreas de risco
- Redirecionar para "altura permitida" (colchão no chão, mini-trampolim supervisionado)
- Comando curto + visual ("aqui pode / ali não")
- Reforçar imediatamente quando desce e escolhe alternativa segura

Resistência a cortar cabelo/unhas (higiene específica)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Crise ao cortar cabelo/unha
- Foge, agride, trava
- Trauma por experiências anteriores

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- É medo do som/tesoura/toque?
- Ocorre por dor (unha encravada) ou sensibilidade?
- Você tenta fazer rápido "na força"?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Sensorial (som/toque/pressão)
- Ansiedade por imprevisibilidade
- Histórico aversivo (memória do medo)

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Micro-passos (1 unha apenas) + reforço imediato
- Dar controle: "você escolhe a unha" / "pausa agora"
- Usar ferramentas mais toleráveis (lixa, tesoura adequada, máquina silenciosa)
- Fazer em ambiente calmo, com luz e posição confortável

"Perseveração": repetição de perguntas / insistência mental ("e se...?")

⚠ SINAIS DA CRISE

- Pergunta a mesma coisa dezenas de vezes
- Insiste até o adulto "explodir"
- Aumenta em ansiedade e mudanças de plano

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Acontece quando há incerteza ("que horas?", "vai ter X?")?
- Você responde diferente cada vez?
- A pergunta vem antes de uma transição/situação difícil?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Ansiedade por previsibilidade
- Rigidez cognitiva
- Atenção (se vira conversa longa)

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Resposta curta e sempre igual (script fixo)
- Direcionar para visual (quadro de rotina, timer, checklist)
- Limitar repetições: "já respondi, agora olha o quadro"
- Reforçar quando ele aceita esperar sem perguntar

Recusa de Medicação

⚠ SINAIS DA CRISE

- Cospe/remexe comprimido
- Fecha boca, vomita ao tentar dar
- Crise ao ver seringa/frasco

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Já teve experiência ruim (gosto forte/engasgo)?
- Está associando medicação a briga/força?
- Está com náusea/dor que piora aceitação?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Hipersensibilidade oral (sabor/textura)
- Ansiedade antecipatória
- Associação negativa prévia

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Manter postura neutra (sem ameaça/briga)
- Oferecer escolha controlada ("com suco ou água?")
- Usar microexposição (encostar no lábio → reforçar → avançar)
- Se falhar, pausar 2-5 min e tentar com abordagem mais regulada

Crise em Procedimento Médico/Dentista

⚠ SINAIS DA CRISE

- Pânico ao entrar na sala
- Foge/grita na hora da vacina
- Trava no consultório

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Já houve experiência traumática?
- Ele sabe o que vai acontecer?
- Está sobrecarregado antes de chegar?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Medo sensorial (luz, cheiro, toque)
- Imprevisibilidade
- Ansiedade social

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Preparar com história visual antes
- Reduzir tempo de espera
- Pareamento inicial (2-3 min ambiente neutro antes do ato)
- Reforço forte e imediato após cooperação

Risco com Água (piscina, mar, banheira)

⚠ SINAIS DA CRISE

- Corre para água sem noção de perigo
- Se joga sem avaliar profundidade
- Resiste a sair da água

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Busca sensorial forte (vestibular/proprioceptiva)?
- Já teve reforço alto associado à água?
- Está fugindo de outra demanda?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Fascínio sensorial
- Impulsividade
- Baixa percepção de risco

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Supervisão física constante
- Regra visual clara ("água só com adulto")
- Interrupção firme e calma
- Redirecionar para alternativa motora segura

Arrancar Pele/Unhas/Cabelos

⚠ SINAIS DA CRISE

- Puxa cabelo ou cílios
- Arranca casquinhas
- Machuca dedos/unhas

🔍 CHECAGEM RÁPIDA

- Acontece em ansiedade/tédio?
- Ocorre antes de dormir?
- Ele percebe que está fazendo?

🧠 O QUE PODE ESTAR POR TRÁS (CAUSAS)

- Autorregulação sensorial
- Ansiedade compulsiva
- Falta de alternativa motora

⚡ ACÃO IMEDIATA

- Redirecionar para objeto de mãos (bolinha, massinha)
- Cobrir área quando necessário (luva leve, curativo)
- Reduzir fala e oferecer tarefa manual
- Reforçar quando mãos ficam ocupadas