

**Лабораторная работа №5.****Корреляционный анализ****Цели занятия:**

- определения законов распределения случайных величин;
- научиться определять условные законы распределения случайных величин;
- приобрести навыки установления функциональной и статистической зависимостей между случайными величинами.

**Задание:**

- на основе лекционного материала и представленной методики выполнения заданий определить законы распределения случайных величин, ковариацию и коэффициент корреляции в соответствии с заданным вариантом;
- для автоматизации расчётов использовать MS Excel;
- оформить отчёт по лабораторной работе в соответствии с установленными правилами.

**Краткие сведения из теории**

Зависимость между двумя случайными величинами называется **вероятностной** (стохастической, статистической), если каждому значению одной из них соответствует определённое (условное) распределение другой.

**Ковариацией** (корреляционным моментом)  $K_{xy}$  случайных величин  $X$  и  $Y$  называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от своих математических ожиданий, т.е.  $K_{xy} = M[(X - M(X))(Y - M(Y))]$ , или  $K_{xy} = M[(X - a_x)(Y - a_y)]$ .

Из определения:  $K_{xy} = K_{yx}$ .

Свойства ковариации случайных величин:

1. Ковариация двух независимых случайных величин равна нулю.
2. Ковариация двух случайных величин равна математическому ожиданию их произведения минус произведение их математических ожиданий:  
 $K_{xy} = M(XY) - M(X)M(Y)$  или  $K_{xy} = M(XY) - a_x a_y$ .
3. Ковариация двух случайных величин по абсолютной величине не превосходит произведения их средних квадратических отклонений, т.е.  $|K_{xy}| \leq \sigma_x \sigma_y$ .

**Коэффициентом корреляции** двух случайных величин ( $\text{corr}(X, Y)$ ) называется отношение их ковариации к произведению средних квадратических отклонений этих

величин:  $\rho_{xy} = \frac{k_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$ .

Из определения следует  $\rho_{xy} = \rho_{yx} = \rho$ .

Свойства коэффициента корреляции:

1.  $-1 \leq \rho \leq 1$ .
2. Если случайные величины независимы, то  $\rho = 0$ , так как  $K_{xy} = 0$ .
3. Если  $\rho = |1|$ , то между этими случайными величинами существует линейная функциональная зависимость.

**Пример 1.** Закон распределения дискретной двумерной случайной величины  $(X, Y)$  задан в табл. 1.

Таблица 1.

$y_j$	-1	0	1	2
$x_i$				
1	0,1	0,25	0,30	0,15
2	0,1	0,05	0	0,05

Найти:

- закон распределения одномерных случайных величин  $X$  и  $Y$ ;
- условные законы распределения случайной величины  $X$  при условии  $Y = 2$  и случайной величины  $Y$  при условии  $X = 1$ ;
- вычислить  $P(Y < X)$ .
- ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин  $X$  и  $Y$ .

Решение.

Таблица 2

- Случайная величина  $X$  может принимать значения:  
 $X=1$  с вероятностью  $p_1 = 0,1+0,25+0,3+0,15 = 0,8$ ;  
 $X=2$  с вероятностью  $p_2 = 0,1+0,05+0+0,05 = 0,2$ .  
 Отсюда строится её закон распределения (табл. 2).

$x_i$	1	2
$p_i$	0,8	0,2

Таблица 3

- Случайная величина  $Y$  может принимать значения:  
 $Y=-1$  с вероятностью  $p_1 = 0,1+0,1 = 0,2$ ;  
 $Y=0$  с вероятностью  $p_2 = 0,25+0,05 = 0,3$ ;  
 $Y=1$  с вероятностью  $p_3 = 0,3+0 = 0,3$ ;  
 $Y=2$  с вероятностью  $p_4 = 0,15+0,05 = 0,2$ .  
 Отсюда строится её закон распределения (табл. 3).

$y_j$	-1	0	1	2
$p_j$	0,2	0,3	0,3	0,2

Таблица 4

- Условный закон распределения  $X$  при условии, что  $Y = 2$  можно получить, если вероятности  $p_{ij}$ , стоящие в последнем столбце табл. 1, разделить на их сумму, т.е. на 0,2:

$x_i$	1	2
$p_i$	0,75	0,25

Таблица 5

- Условный закон распределения  $Y$  при условии, что  $X = 1$  можно получить, если вероятности  $p_{ij}$ , стоящие в первой строке столбца табл. 1, разделить на их сумму, т.е. на 0,8:

$y_j$	-1	0	1	2
$p_j$	0,125	0,3125	0,375	0,1875

- Для нахождения вероятности  $P(Y < X)$  складываем вероятности событий  $p_{ij}$  из табл. 1, для которых  $y_j < x_i$ . Получим:  $P(Y < X) = 0,1+0,25+0,1+0,05+0=0,5$ .

- $a_x = \sum x_i p_i = 1*0,8+2*0,2 = 1,2$ ;  
 $M(X^2) = \sum x_i^2 p_i = 1^2*0,8+2^2*0,2 = 1,6$ ;  
 $D(X) = M(X^2) - a_x^2 = 1,6 - 1,2^2 = 0,16$ ;  $\sigma_x = (D(X))^{0,5} = 0,4$ ;  
 $a_y = \sum y_j p_j = (-1)*0,2+0*0,3+1*0,3+2*0,2 = ,5$ ;  
 $M(Y^2) = \sum y_j^2 p_j = (-1)^2*0,2+0^2*0,3+1^2*0,3+2^2*0,2 = 1,3$ ;  
 $D(Y) = M(Y^2) - a_y^2 = 1,3 - 0,5^2 = 1,05$ ;  $\sigma_y = (D(Y))^{0,5} = 1,025$ ;

$$M(XY) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij} =$$

$$= 1*(-1)*0,1+(-1)*0*0,25+1*1*0,3+1*2*0,15+2*(-1)*0,1+2*0*0,05+2*1*0+2*2*0,05=0,5;$$

$$k_{xy} = M(XY) - a_x a_y = 0,5 - 1,2 * 0,5 = -0,1.$$

$\rho = k_{xy} / (\sigma_x \sigma_y) = (-0,1) / (0,4 * 1,025) = -0,244$ . Следовательно между случайными величинами X и Y существует отрицательная линейная зависимость.

Пример решения этой же задачи в среде MS Excel представлен на рис. 1.




Рис. 1

## Варианты заданий

### Задание 1

1. Закон распределения дискретной двумерной случайной величины (X,Y) задан в табл. 6.

Таблица 6

Найти: закон распределения одномерных случайных величин X и Y.

	$y_j$	0	1	2	3
$x_i$					
-1		0,02	0,03	0,09	0,01
0		0,04	0,2	0,16	0,1
1		0,05	0,1	0,15	0,05

2. Закон распределения дискретной двумерной случайной величины (X,Y) задан в табл. 6. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии Y = 2 и случайной величины Y при условии X = 1.
3. Закон распределения дискретной двумерной случайной величины (X,Y) задан в табл. 6. Вычислить P(Y>X). ( $P(Y>X) = 0,81$ )

**Задание 2**

1. Закон распределения дискретной двумерной случайной величины  $(X, Y)$  задан в табл. 6. Вычислить ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин  $X$  и  $Y$ . ( $K_{xy} = -0,012$ ;  $\rho = -0,02006$ )
2. Дискретная случайная величина имеет ряд распределения, представленный в табл. 7.

Таблица 7

$x_i$	-1	0	1	2
$p_i$	0,2	0,1	0,3	0,4

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  $Y = 2^x$ .

( $M(Y) = 2,4$ ;  $D(Y) = 1,99$ )

3. Имеются две случайные величины  $X$  и  $Y$ , связанные соотношением  $Y = 2 - 3X$ . Известны характеристики величины  $X$ :  $a_x = -1$ ;  $D(X) = 4$ . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  $Y$ . ( $M(Y) = 5$ ;  $D(Y) = 36$ )
4. Имеются две случайные величины  $X$  и  $Y$ , связанные соотношением  $Y = 2 - 3X$ . Известны характеристики величины  $X$ :  $a_x = -1$ ;  $D(X) = 4$ . Найти ковариацию и коэффициент корреляции случайной величины  $X$  и  $Y$ . ( $K_{xy} = -12$ ;  $\rho = -1$ )
5. Имеется случайная величина  $X$  с математическим ожиданием  $m_x$  и дисперсией  $D_x$ . Найти математическое ожидание и дисперсию следующих случайных величин:  $Y = -X$ ;  $Z = X + 2Y - 1$ .
6. Дискретная случайная величина имеет ряд распределения, представленный в табл. 8.

Таблица 8

$x_i$	-1	0	1	2
$p_i$	0,2	0,1	0,3	0,4

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  $Y = e^{-x}$ .

( $M(Y) = 0,80815$ ;  $D(Y) = 0,97262$ )

7. Имеются две случайные величины  $X$  и  $Y$ , связанные соотношением  $Y = 2X + 3$ . Известны характеристики величины  $X$ :  $a_x = -1$ ;  $D(X) = 4$ . Найти ковариацию и коэффициент корреляции случайной величины  $X$  и  $Y$ . ( $K_{xy} = 8$ ;  $\rho = 1$ )
8. Дискретная случайная величина имеет ряд распределения, представленный в табл. 9.

Таблица 9

$x_i$	1	3	5	7
$p_i$	0,2	0,1	0,3	0,4

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины  $Y = 2 + x^{1/2}$ .

( $M(Y) = 4,102326$ ;  $D(Y) = 0,3802254$ )