

ŠVK 2025

Poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine
v šolskem letu 2024/25



Avtorji: Gregor Starc, Marjeta Kovač, Bojan Leskošek, Maroje Sorić, Gregor Jurak

Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Naslov: ŠVK 2025 – Poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine v šolskem letu 2024/25

Avtorji: Gregor Starc¹, Marjeta Kovač¹, Bojan Leskošek¹, Maroje Sorić¹, Gregor Jurak¹

¹ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja

Izdala: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo

Kraj izdaje: Ljubljana

Leto izdaje: 2025

Oblikovanje: Gregor Starc

Podatki, predstavljeni v letnem poročilu ŠVK, ki ga vodi prof. dr. Gregor Starc s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, so bili zbrani na osnovnih šolah v Sloveniji. Izpeljavo zbiranja, obdelave in analize podatkov ter izdajo poročila je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Za sodelovanje pri pridobivanju podatkov se zahvaljujemo vsem šolam, učiteljem, otrokom, mladostnikom in njihovim staršem ter Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Avtorske pravice © 2025 so last Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

KAZALO

PREDGOVOR	4
VKLJUČENOST OTROK IN MLADOSTNIKOV V SPREMLJAVO SLOfit	5
TELESNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV	7
Telesna višina	8
Telesna masa	11
Kožna guba nadlahti	13
Indeks telesne mase	16
Prehranjenost otrok in mladostnikov	19
GIBALNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV	24
Indeks gibalne učinkovitosti	26
Dotikanje plošč z roko	30
Skok v daljino z mesta	33
Poligon nazaj	37
Dviganje trupa	40
Predklon na klopci	43
Vesa v zgibi	46
Tek na 60 m	49
Tek na 600 m	52
POVZETEK SPREMEMB TELESNEGA IN GIBALNEGA RAZVOJA OTROK IN MLADINE	55
Priloga 1: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov telesnega razvoja	58
Priloga 2: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov gibalnega razvoja	60

PREDGOVOR

Pred vami je letno poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok, ki jih Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja objavlja že od šolskega leta 1982/83 naprej.

Spremljava ŠVK služi kot podpora učiteljem osnovnih in srednjih šol in je v vseh letih svojega obstoja je kljub resnim izzivom svoje poslanstvo uspešno izpolnjevala. V prvi vrsti gre zahvala seveda vsem slovenskim športnim pedagogom, ki vsakoletne meritve vestno organizirajo in obdelane podatke uporabljajo pri načrtovanju pouka, pa tudi razrednim učiteljicam in učiteljem, ki jim pomagajo pri izvedbi meritev in vnosu podatkov. Pri obdelavi podatkov jim s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na pomoč priskočimo raziskovalci Laboratorija za telesni in gibalni razvoj, ki pa ob tem skrbimo tudi za to, da se ŠVK znotraj sistema SLOfit razvija in da učiteljem ponujamo nova orodja, ki jim omogočajo bolj kakovostno delo. Zahvaliti pa se je potrebno tudi ostalim učiteljicam in učiteljem ter strokovnim delavcem na šolah, ki učiteljem športne vzgoje pogosto priskočijo na pomoč in omogočijo, da organizacija meritev poteka brez težav. Seveda gre zahvala tudi vodstvu šol, saj se večina ravnateljic in ravnateljev že zaveda, da se ustrezne učne uspešnosti učenk, učencev, dijakinj in dijakov lahko nadejamo le, če je pouk načrtovan in izveden na visoki strokovni ravni in temelji na objektivnih dejstvih. Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem staršem, ki svoje otroke vključujejo v spremljavo, saj se zavedajo, kako ranljiv je telesni in gibalni razvoj sodobnih otrok in mladine in od šolskega sistema pričakujejo, da jim pri zagotavljanju zdravega razvoja otrok pomaga.

V šolskem letu 2024/25 smo prejeli podatke 449 osnovnih šol in 76 srednjih šol, še vedno pa kar nekaj slednjih ni poslalo podatkov ali celo niso izvedle meritev, saj med ravnatelji še vedno krožijo informacije, ki jih neupravičeno odvrčajo od pošiljanja podatkov. Podatki mnogih dijakov in dijakinj zaradi tega ostajajo neobdelani in tako ne dobijo povratnih informacij, učitelji pa teh informacij ne morejo uporabljati za bolj kakovostno načrtovanje pouka. To se seveda odraža tudi na stanju telesnega in gibalnega razvoja srednješolcev in srednješolk, ki sta še posebej v poklicnih in tehničnih programih na zaskrbljujoče nizki ravni. V poročilu za šolsko leto 2024/25 so popolnoma reprezentativni le podatki osnovnošolske populacije, analiza za srednješolsko populacijo pa temelji na nepopolnem vzorcu, ki pa je vseeno dovolj velik, da lahko govorimo o njegovi reprezentativnosti.

Prof. dr. Gregor Starc

Vodja obdelav ŠVK


VKLJUČENOST OTROK IN MLADOSTNIKOV V SPREMLJAVO SLOfit

V šolskem letu 2024/25 so se šole spet srečevale z velikim trendom prezaposlovanja učiteljev, kar se je odrazilo tudi na težavah s pošiljanjem podatkov v obdelavo. V srednjih šolah brez povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju še vedno ostaja večina dijakov in dijakinj, čeprav se je delež obdelanih podatkov glede na predhodno šolsko leto povečal.


V šolskem letu 2024/2025 smo se z vidika zbiranja podatkov že drugo leto zapored srečevali s težavami, ki so posledica pomanjkanja učiteljev športne vzgoje. Zopet je namreč prihajalo do pogostih prehodov učiteljic in učiteljev z ene na drugo šolo ter do zaposlovanja učiteljev brez dokončane izobrazbe, ki svojega poklica ne obvladajo na potrebni ravni. To seveda vpliva na organiziranost in kakovost dela, pogosto pa pri odhodu učiteljev s šole ni prišlo do popolne primopredaje dela, zaradi česar veliko šol podatkov ni poslalo pravočasno in smo podatke prejeli še v drugi polovici oktobra. V srednjih šolah smo sicer uspeli obdelati več podatkov kot v preteklem šolskem letu, a še vedno velik del dijakinj in dijakov ostaja brez obdelanih podatkov, saj nekatera vodstva šol učiteljem še vedno ne dovolijo pošiljati podatkov v obdelavo, hkrati pa se srečujejo s povsem enakimi kadrovskimi težavami

kot osnovne šole in še slabšo koordinacijo in organiziranostjo dela. Njihovi podatki tako pogosto ostajajo zgolj na šolah, dijaki in dijakinje pa so prikrajšani za spremljavo lastnega telesnega in gibalnega razvoja. Hkrati to pomeni tudi slabše načrtovanje pouka in posledično nižanje kakovosti poučevanja predmeta športna vzgoja v srednješolskih programih. Spodbudno sicer je, da smo v septembru po intenzivni komunikaciji s srednjimi šolami, ki v zadnjih letih niso pošiljale podatkov, mnoge uspeli prepričati, da bodo v naslednjem šolskem letu podatke poslale. V šolskem letu 2024/25 smo tako obdelali podatke 449 osnovnih šol, v poročilu pa niso zajeti podatki otrok s posebnimi potrebami, ki so vsolani v oddelke s prilagojenim programom. V osnovni šoli smo obdelali podatke 180.695 učenk in učencev (Prikaz 1). V srednji šoli smo obdelali nekoliko večji delež podatkov kot v preteklem šolskem letu (Prikaz 2), saj je podatke poslalo 74 srednjih šol, kar je štiri šole več kot v šolskem letu 2023/24. Skupaj smo obdelali podatke 32.783 dijakov in dijakinj. Analizo srednješolskih podatkov je kljub temu potrebno interpretirati z zadržkom, saj so podatki gimnazijcev in gimnazijk zastopani v večjem deležu kot je stanje v populaciji. Zaradi tega srednješolski podatki kažejo boljšo sliko kot bi bila, če bi upoštevali podatke ustrezno zastopanih dijakov in dijakinj vseh srednješolskih programov. Podatke o številu otrok v OŠ in SŠ smo pridobili na portalu SISTAT Statističnega urada RS, izločili pa smo tiste otroke, za katere so šole poročale, da so soglašali z meritvami, a so v obdobju meritev manjkali v šoli. Kljub temu, da zakonodaja od osnovnih šol s prilagojenim programom ne zahteva izvajanja spremljave, smo prejeli in obdelali tudi podatke 1.003 učenk in učencev iz 16 osnovnih šol s prilagojenim programom.

Prikaz 1: Število otrok in delež izmerjene osnovnošolske populacije



Prikaz 2: Število mladostnikov in delež izmerjene srednješolske populacije



V srednji šoli je še vedno razviden upad deleža izmerjenih dijakov in dijakinj od prvega letnika proti zaključku šolanja, ki kaže, da srednješolski učitelji mladostnikom ne znajo ustrezno predstaviti pomena spremljave lastnega telesnega in gibalnega razvoja in da se pri urah športne vzgoje v srednjih šolah pojavlja preveč absentizma. Še posebej izrazito se to zgodi v zaključnih letnikih, ko učitelji dijakom in dijakinjam dopuščajo, da se med poukom športne vzgoje učijo za druge predmete in maturo. Na ta način se tudi zakrije nizka kakovost dela v srednjih šolah in resnični obseg gibalne neučinkovitosti ter zdravstvenih tveganj mladih ob zaključku srednješolskega izobraževanja.

TELESNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV

Analizo letnih sprememb aritmetičnih sredin in standardnih odklonov telesnih značilnosti smo opravili na podlagi presečne analize telesne višine, mase, kožne gube nadlahti in indeksa telesne mase, preverili pa smo tudi prehranjenost otrok po kriterijih World Obesity Federation (WOF). V določeno leto starosti so vključeni otroci, ki so se rodili od začetka do konca tistega leta, npr. v starostno skupino šestletnikov so vključeni otroci, ki so se rodili med 72. in 84. mesecem od meseca meritev (od 6 do 6,99 let starosti v mesecu merjenja).

Izračunali smo aritmetične sredine telesne višine, mase, kožne gube in indeksa telesne mase (Priloga 1), stanje prehranjenosti pa smo izračunali glede na krivulje indeksa telesne mase WOF. Potrebno je poudariti, da mednarodni kriteriji kot so krivulje indeksa telesne mase WOF, precenjujejo predvsem delež otrok in mladostnikov s preddebelostjo, saj so otroci v Sloveniji precej višji kot referenčne populacije, na podatkih katere so bile izdelane omenjene krivulje. Pojavnost preddebelosti je tako precenjena približno za četrtno.

Analiza telesnega razvoja v letu 2024/25 je bila izvedena s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce (ločeno po spolu ter kronološki starosti otrok in mladostnikov), s katerim smo preverili dejansko statistično značilnost razlik med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25. Statistična značilnost je v prikazih označena z zvezdico, če je $p < ,005$ ali z dvema zvezdicama, če je $p < ,001$.

Telesna višina je kazalnik telesnega razvoja, ki se na letni ravni med generacijami navadno ne spreminja kaj dosti, saj višanja povprečne telesne višine populacije zaradi ugodnejših pogojev rasti ne moremo zaznati, ker so ti pogoji na letni ravni zelo podobni.

Nekoliko opaznejše razlike se lahko pokažejo pri telesni masi, ki se precej hitreje odziva na spremembe v družbeno-ekonomskem in kulturnem okolju populacije.

Tudi debelina podkožnega maščevja, ki jo ocenjujemo prek kožne gube nadlahti, se odziva podobno kot telesna višina in so spremembe navadno neznatne.

Indeks telesne mase je ravno tako pokazatelj, ki se hitreje odziva na spremembe v socialno-ekonomskem in kulturnem okolju in z njim povezanimi dejavniki zdravstvenega tveganja.

Pri primerjavi telesne višine, mase, kožne gube nadlahti in indeksa telesne mase (ITM) se bomo osredotočili na relativne spremembe, ki jih prikazujemo v obliki centilnih vrednosti merskih nalog ter izračunanih sprememb aritmetičnih sredin kazalcev telesnih značilnosti, ločeno po starosti in spolu. Centili so izračunanih specifično glede na starost v letih in spol na celotni populaciji 8,5 milijona meritev otrok in mladostnikov obdobja 1988-2025. Aritmetične sredine surovih vrednosti vseh kazalnikov telesnega razvoja so navedene v Prilogi 1.


Telesna višina

Telesne višine po kovidnem obdobju še naprej upada in potrjuje, da se je omejevanje telesne dejavnosti botrovalo neobičajno hitri rasti, ki pa se postopno vrača v običajne tirnice. Upad je bil izrazitejši pri dekletih, ki so že skoraj na ravni pred pandemijo.


Trendi sprememb telesne višine v šolskem letu 2024/25 glede na predhodno šolsko leto v osnovni šoli zopet kažejo na upočasnjevanje telesne rasti, ki se je med osnovnošolsko populacijo v obdobju epidemije covid-19 bistveno pospešila. V večini starostnih skupin učenk in učencev smo večinoma zaznali trend upada telesne višine 2023/24, ki je bil pri 6-, 8-, 9- in 12-letnih učencih statistično značilen, 7-letniki pa so bili statistično značilno višji. Pri učenkah se je statistično značilen upad pokazal pri 6-, 8-, 11- in 13-letnicah (Prikaz 3). Pri 6-letnih učencih in učenkah je telesna višina ostala

pod povprečjem obdobja 1988-2025, ravno tako pri 6- in 7-letnih učenkah, najbolj pa so nacionalno povprečje presegali 13-letniki in 12-letnice.

Prikaz 3: Sprememba telesne višine fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 4: Sprememba telesne višine fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Pri dijakih in dijakinjah se je statistično značilno povišanje telesne višine pokazalo le v starosti 16 let (Prikaz 4).


Prikaz 5: Regijska primerjava telesne višine fantov in deklet med šolskima letom 2023/24 in 2024/25



Primerjava sprememb telesne višine po regijah (Prikaz 5) kaže, je v šolskem letu 2024/25 opazen trend nižanja telesne višine v primerjavi s šolskim letom 2023/24, ki je bil pri fantih iz pomurske in savinjske regije statistično značilen, pri dekletih pa se je telesna višina statistično značilno znižala v pomurski, savinjski, zasavski in primorsko-notranjski regiji. V šolskem letu 2024/25 so bili zopet najvišji fantje iz koroške regije, ki so jim sledili fantje iz obalno-kraške regije, najnižje rasli pa so bili fantje iz gorenjske in goriške regije. Pri dekletih so bile razlike v telesni višini med regijami podobne kot pri fantih, najvišja so bila dekleta iz koroške in posavske regije, najnižje rasla pa dekleta iz pomurske in gorenjske regije.

Zgodovinski pregled sprememb telesne višine v Sloveniji kaže, da se je izrazito pospešen trend naraščanja višine, ki smo mu bili priča v koronskem, po tem obdobju obrnil v nasprotno smer, v kateri še vedno vztraja (Prikaz 6).

Prikaz 6: Trendi sprememb telesne višine v obdobju 1991-2025



Pri dekletih je telesna višina upadla na raven šolskega leta 2019/20, pri fantih pa je bil upad nekoliko manj izrazit in je višina še vedno bistveno nad predkoronsko ravno. Fantje so v šolskem letu 2024/25 tako še vedno dosegali za 3 odstotke višjo telesno višino kot njihovi

vrstniki v šolskem letu 2018/19, dekleta pa so bila za 0,6 odstotka višja kot njihove vrstnice v tem letu.


Trendi rasti prepričljivo potrjujejo, da so dolgotrajna zaprtja šol in omejene možnosti športne vadbe v obdobju izvajanja ukrepov za zaježitev covid-19 povzročile, da je energija otrok in mladostnikov, ki bi se sicer porabila za mišično delo, pospeševala rast in dozorevanje otrok in mladostnikov. Po koronskem obdobju se je rast otrok začela normalizirati, kar traja še danes vendar pa se je treba zavedati, da je pospešeno dozorevanje pri prizadetih generacijah nereverzibilno in da bodo te generacije do odraslosti podvržene neobičajnim rastnim vzorcem, ki so bili pod izrazitim vplivom okolja pospešeni. Ponovno opozarjamo, da pospešen trend dozorevanja pomeni hitrejšo staranje organizma in če bomo v prihodnosti z dodatnimi raziskavami zdravstvenega stanja sedanjih otrok potrdili to hipotezo, lahko sklepamo, da so ukrepi za zaježitev covid-19 povzročili nepopravljive spremembe v razvoju otrok in mladostnikov, ki bodo ob zmanjšani gibalni učinkovitosti doprinesle k možni zgodnejši umrljivosti prizadete populacije.

Telesna masa


Telesna masa je v šolskem letu 2024/25 zopet ostala na skoraj enaki ravni kot v predhodnem šolskem letu, kar ob hkratnem upadu telesne višine prinaša povečana tveganja prekomerne prehranjenosti populacije.

V šolskem letu 2024/25 pri telesni masi populacije ni prišlo do izrazitejših sprememb v primerjavi s predhodnim šolskim letom. Pri osnovnošolcih se je statistično značilen upad pokazal le pri 12-letnikih, medtem ko so 7-letniki imeli statistično značilno višjo telesno maso kot njihovi vrstniki iz šolskega leta 2023/24 (Prikaz 7), pri osnovnošolkah pa ni bilo statistično značilnih sprememb. Telesna višina je pri osnovnošolcih v povprečju upadla 5-krat, pri osnovnošolkah pa 3-krat bolj kot telesna masa. Pri 6- in 7-letnih učencih in učenkah je bila telesna masa pod povprečjem obdobja 1988-2025 in nakazuje na trend odloga vpisovanja večjega števila otrok v prvi razred. Ostale starostne skupine so v telesni masi presegale nacionalno povprečje obdobja 1988-2025, najbolj izrazito 13-letniki in 12-letnice, ki so bili hkrati tudi najvišji, kar nakazuje na zgodnejše vstopanje trenutnih generacij otrok v puberteto.

Prikaz 7: Sprememba telesne mase fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 8: Sprememba telesne mase fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V srednješolski populaciji smo zaznali statistično značilen upad telesne mase le pri 17-letnih dijakih in dijakinjah ter pri 18-letnih dijakinjah, medtem ko je pri ostalih starostnih skupinah telesna masa ostala na podobni ravni kot v preteklem šolskem letu (Prikaz 8). Zelo očitno je, da srednješolci in srednješolke bistveno bolj presegajo nacionalno povprečje telesne mase obdobja 1988-2025 kot osnovnošolci in osnovnošolke. V povprečju se je telesna masa dijakov glede na šolsko leto 2023/24 zmanjšala za več kot odstotek ob povečanju telesne višine za skoraj odstotek, pri dijakinjah pa je telesna masa upadla za skoraj dva odstotka ob pol odstotnem povečanju telesne višine, kar morda nakazuje na povečano pojavnost tveganega uravnavanja telesne mase z odrekanjem hrani.


Prikaz 9: Regijska primerjava telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Regijska primerjava telesne mase je pokazala, da je, v primerjavi s šolskim letom 2023/24, pri fantih prišlo do statistično značilnega upada telesne mase le v pomurski regiji, pri dekletih pa v podravski in primorsko-notranjski regiji (Prikaz 9). V gorenjski, goriški in osrednjeslovenski regiji so dijakinje in dijaki bili najbližje povprečju obdobja 1988-2025, v vseh ostalih regijah pa je bila telesna masa bistveno nad to ravno.

Analiza trendov sprememb telesne mase je pokazala, da so fantje v šolskem letu 2024/25 ostali rahlo nad ravno vrstnikov v predkoronskem šolskem letu 2018/19, telesna masa deklet pa je padla pod raven predkoronskega šolskega leta 2018/19.

Prikaz 10: Trendi sprememb telesne mase v obdobju 1991-2025




Kožna guba nadlahti

Naraščanje podkožnega maščevja ob hkratnem upadu telesne mase nakazuje na slabšanje sestave telesa in tvegano uravnavanje mase z odrekanjem hrani.


Analiza sprememb debeline kožne gube nadlahti je pokazala, nadaljevanje povečevanja podkožnega maščevja osnovnošolcev in osnovnošolk (Prikaz 11). Pri osnovnošolcih je bila statistično značilno večja pri 7-, 10-, 11-, 13- in 14-letnikih. Edini statistično značilni upad kožne gube nadlahti je bil zaznan pri 6-letnih učenkah, pri 8- in 13-letnicah pa je bila kožna guba statistično značilno večja kot predhodno šolsko leto. Pri osnovnošolcih je kožna

guba nadlahti v povprečju zrasla za odstotek, hkrati pa je telesna masa v povprečju upadla za 0,2 odstotka, kar kaže na nadaljevanje neugodnega trenda sestave telesa z upadanjem mišične in naraščanjem maščobne mase. Pri osnovnošolkah je telesna masa v povprečju upadla za pol odstotka, kožna guba nadlahti pa je za podoben odstotek narasla. Takšna kombinacija nakazuje na uravnavanje mase z odrekanjem hrani namesto s povečevanjem telesne dejavnosti.

Prikaz 11: Sprememba kožne gube nadlahti fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 12: Sprememba kožne gube nadlahti fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da kožna guba nadlahti v skoraj vseh starostnih skupinah, z izjemo 6-letnih osnovnošolcev, ostaja bistveno nad slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025 in je v večini starostnih skupin tudi bistveno nad povprečjem telesne mase tega obdobja. Nesorazmerje med skupno in maščobno maso ostaja izjemno zaskrbljujoče in se stopnjuje, saj so v šolskem letu 2024/25 osnovnošolci v kožni gubi nadlahti dosegali za 2,4, osnovnošolke pa kar za 3,2 centila višje vrednosti kot v telesni masi kar pomeni 60-odstotno povečanje nesorazmerja pri osnovnošolcih in 25-odstotno pri osnovnošolkah glede na predhodno šolsko leto.

Pri srednješolski populaciji (Prikaz 12) je debelina kožne gube nadlahti ostala na podobni ravni kot v šolskem letu 2023/24, pri 18-letnih dijakinjah pa je prišlo do statistično značilnega upada. Da se stanje prehranjenosti med dijaki slabša, kaže tudi trend sprememb maščobne in skupne telesne mase, saj se je skupna masa v enem letu zmanjšala za odstotek, medtem ko je maščobna za odstotek zrasla. Pri dijakinjah je bilo to nesorazmerje še očitnejše, saj je skupna masa v povprečju upadla za skoraj 2 odstotka, maščobna masa pa je kljub temu narasla za pol odstotka. Še posebej zaskrbljujoče je nadaljevanje trenda naraščanja nadlahti v populaciji dijakov s starostjo, kar je nenavaden vzorec, saj bi kožna guba nadlahti proti koncu pubertete pri fantih morala upadati na račun porasta mišične mase.


Prikaz 13: Regijska primerjava kožne gube nadlahti fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Regijska primerjava trendov sprememb podkožnega maščevja glede na šolsko leto 2023/24 kaže (Prikaz 13), da je v četrtini regij pri fantih in v eni regiji pri dekletih kožna guba statistično značilno narasla, pri fantih je v gorenjski regiji prišlo do statistično značilnega upada, pri dekletih pa je bil tak trend zaznan v gorenjski in goriški regiji. Najvišjo raven podkožnega maščevja smo zabeležili pri fantih v posavski regiji in dekletih v zasavski regiji, najnižjo raven pa pri fantih in dekletih iz goriške regije, a je tudi pri njih ostala nad slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025.

Pregled longitudinalnih trendov sprememb debeline kožne gube nadlahti (Prikaz 14) kaže, da smo znova zabeležili trend naraščanja podkožnega maščevja, ki je bil pri fantih še

nekoliko bolj izrazit kot pri dekletih. Raven podkožnega maščevja je tako ostala bistveno nad ravno predkoronskega obdobja . Glede na to, da je raven podkožnega maščevja za pri fantih za 2, pri dekletih pa kar za 3 centile višja kot pa raven skupne telesne mase, lahko sklepamo, da je telesna sestava neugodna, saj se skupna telesna masa očitno spreminja na račun povečevanja maščobne in ne puste telesne mase. Posledično lahko govorimo o relativnem upadu kostne in mišične telesne mase, ki prinaša povečana zdravstvena tveganja.




Indeks telesne mase

Stagnacija ITM na najnižji ravni dveh desetletij je navidezno ugodno, a naraščanje podkožnega maščevja kaže na neustrezno razmerje med maščobno in mišično maso ter več skrite debelosti.


Indeks telesne mase (ITM) je v letošnjem šolskem nakazoval trend naraščanja, statistično značilno pa je bil višji le pri 6- in 7-letnih osnovnošolcih (Prikaz 15). Pri osnovnošolkah nismo zaznali nobene statistično značilne spremembe. Pod ravno obdobja 1988-2025 je ITM ostal pri 6- do 9-letnih osnovnošolcih ter pri 6-letnih osnovnošolkah. Izjemno neskladje med ITM in kožno gubo nadlahti kaže na resno nezanesljivost ITM kot kazalnika prekomerne prehranjenosti, hkrati pa potrjuje tezo, da že v času osnovne šole fantje in dekleta svojo telesno maso vse bolj uravnavajo na tvegan način

z odrekanjem hrane, pri čemer upada tudi mišična masa, ki bi sicer naraščala, če bi otroci energijo porabljali s telesno dejavnostjo. Izrazita je tudi razlika v trendih obeh mer, saj kožna guba nadlahti pri osnovnošolcih in osnovnošolkah narašča kar dvakrat hitreje kot ITM.

Prikaz 15: Sprememba indeksa telesne mase fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Prikaz 16: Sprememba indeksa telesne mase fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Glede na to, da v osnovnošolski populaciji povprečna razlika med ITM in kožno gubo nadlahti zopet znaša več kot 4 centile v korist kožne gube nadlahti, je prekomerna prehranjenost v resnici večja težava, kot jo kaže zgolj ITM. Osnovnošolci in osnovnošolke so kljub temu, da so bolj vitki vse bolj zamaščeni, vendar te zamaščenosti na zdravstvenih pregledih ne zaznavamo, saj stanje prehranjenosti presojamo po kazalniku ITM.

Razen pri 17-letnih dijakih in dijakinjah, ki imajo statistično značilno nižji ITM od vrstnikov iz predhodnega šolskega leta, je v srednješolski populaciji ta kazalnik ostal na podobni ravni kot v predhodnem šolskem letu (Prikaz 16) kljub sicer upadajočem trendu. Pri vseh starostnih skupinah srednješolske populacije je ITM sicer ostal nad povprečjem obdobja 1988-2025. Podobno kot pri osnovnošolski populaciji, se tudi v srednješolski populaciji kaže nesorazmerje med ravno ITM in kožne gube nadlahti, saj dosegajo dijaki za skoraj 2, dijakinje pa za skoraj 3 centile višje vrednosti kožne gube nadlahti kot ITM.


Regijska primerjava sprememb je pokazala, da v nobeni regiji ni prišlo do statistično značilnih sprememb ITM glede na šolsko leto 2023/24 (Prikaz 17). Najvišji ITM so dosegali fantje in dekleta iz zasavske regije, najnižjega pa fantje in dekleta iz osrednjeslovenske regije. Pri fantih in dekletih je v osrednjeslovenski, gorenjski in goriški regiji ITM ostal pod slovenskim povprečjem obdobja 1988/2025. Razlika med kožno gubo nadlahti in ITM je bila na regijski ravni še bolj očitna kot na nacionalni, saj je pri fantih in dekletih v osrednjeslovenski regiji npr. presegla 5 centilov.

Prikaz 17: Regijska primerjava indeksa telesne mase fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



ITM je v šolskem letu 2024/25 pri fantih ostal na podobni ravni kot v šolskem letu 2023/24 in s tem na najnižji točki v zadnjih dvajsetih letih (Prikaz 18), vendar pa kljub navidezno ugodnemu trendu ta upad predstavlja dodatno skrb, saj kožna guba nadlahti ni sledila temu trendu (Prikaz 14). To nesorazmerje potrjuje tezo, da smo zelo verjetno priča uravnavanju telesne mase z nižjim kaloričnim vnosom hrane, ne pa s povečano telesno dejavnostjo. Na ta način se na eni strani povečujejo zdravstvena tveganja, povezana z nezadostnim vnosom beljakovin in mineralov v obdobju rasti, hkrati pa se povečujejo tveganja nizke gibalne učinkovitosti zaradi nižje mišične mase, kar pa s seboj prinaša še dodatna zdravstvena tveganja.

Prikaz 18: Trendi sprememb indeksa telesne mase v obdobju 1991-2025



Prehranjenost otrok in mladostnikov


Prekomerna prehranjenost v populaciji stagnira, pojavnost debelosti pa je narasla v 2. triletnju OŠ. Fantje so z vidika debelosti bolj tvegana populacija od deklet, razlike pa so tudi med regijami zelo izrazite in kažejo na veliko neenakost. Ob upadu ITM in naraščanju podkožnega maščevja, se večja pojavnost presnovne debelosti, ki jo je težje diagnosticirati.

Prehranjenost otrok in mladine je eden izmed najpomembnejših kazalnikov kakovosti življenja, v razvitem svetu pa stanje prehranjenosti služi kot kazalnik kakovosti življenja. Pomanjkanje telesne dejavnosti v vsakdanjem življenju je ključni razlog za naraščanje prekomerne prehranjenosti saj tudi normalni režim prehranjevanja lahko pripelje do precej velikega energijskega neravnovesja, če je poraba premajhna. S pomočjo indeksa telesne mase, izračunanem po enačbi $ITM = \text{telesna masa (kg)} / \text{telesna višina (m}^2\text{)}$, najpogosteje določamo stopnjo prehranjenosti, a če pri odrasli populaciji v strokovnih krogih obstaja konsenz o tem, kateri razpon vrednosti ITM predstavlja preddebelost in debelost, so pri otrocih in mladini ti razponi specifični glede na kronološko starost. Zaradi mednarodne primerljivosti za spremljavo trendov spreminjanja prehranjenosti uporabljamo krivulje ITM glede na starost World Obesity Federation (WOF) ki so ob kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije najpogosteje uporabljeni

kriteriji. Glede na preverjanje ustreznosti obeh kriterijev za našo populacijo smo ugotovili, da dajejo kriteriji WOF nekoliko realnejšo sliko od kriterijev Svetovne zdravstvene organizacije, saj so slednji predvsem za predpubertetno obdobje slovenske populacije zelo nerealni in kažejo na občutno prevelike deleže otrok s preddebelostjo in debelostjo. Krivulje WOF otroke in mladostnike sicer razvrščajo v 7 skupin prehranjenosti: podhranjenost tipa 3, 2, in 1, normalna prehranjenost, preddebelost, debelost in morbidna debelost, pri naših prikazih pa bomo zaradi jasnosti predstavili le tri skupine prekomerne prehranjenosti. Menimo, da je uporaba mednarodnih rastnih krivulj ITM sprejemljiva zgolj za spremljanje populacijskih trendov, saj so te krivulje nenatančne, ko gre za dejansko določanje prekomerne prehranjenosti, še posebej, ko gre za individualno obravnavo otrok, v slovenski populaciji pa ta kriterij precenjuje predvsem delež otrok in mladostnikov s preddebelostjo, pa tudi z debelostjo.


V Prikazu 19 so prikazani skupni deleži otrok in mladostnikov od 6. leta dalje s preddebelostjo, debelostjo in morbidno debelostjo. Delež fantov z debelostjo je že tretje leto zapored ostal na enaki ravni 5,8 odstotkov populacije, delež fantov s preddebelostjo se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke, delež fantov z morbidno debelostjo pa je tudi ostal nespremenjen pri 1,7 odstotkov populacije. Pri fantih torej lahko govorimo o stagnaciji prekomerne prehranjenosti. Na drugi strani je tudi delež deklet z morbidno debelostjo ostal nespremenjen pri 1,3 odstotke populacije, delež deklet z debelostjo se je zmanjšal za 0,1 odstotno točko, enako pa tudi delež deklet s preddebelostjo.

Prikaz 19: Prehranjenost otrok in mladine v šolskih letih 2023/24 in 2024/25



Delež otrok s prekomerno prehranjenostjo prikazujemo tudi glede na stopnjo šolanja (Prikaz 20). V šolskem letu 2024/25 je pri fantih prišlo do porasta preddebelosti v 2. triletju OŠ, pri dekletih pa v 1. in 2. triletju OŠ, medtem ko je do upada pri fantih in dekletih prišlo v srednješolski populaciji. Z vidika preddebelosti se je njena pojavnost najbolj povečala pri dekletih v 2. triletju, kar pa je lahko tudi znak zgodnejšega dozorevanja. Debelost in morbidna debelost sta narasli pri fantih in dekletih v 1. in 2. triletju OŠ, v 3. triletju in srednji šoli pa sta obe obliki debelosti rahlo upadli.

Prikaz 20: Prekomerna prehranjenost glede na stopnjo šolanja v šolskih letih 2023/24 in 2024/25



Pri fantih je najbolj zaskrbljujoč trend viden v 2. triletju OŠ, saj je delež fantov z debelostjo narasel za več kot 4 odstotke oziroma za 0,3 odstotne točke, delež fantov z morbidno debelostjo pa kar za 11 odstotkov oziroma za 0,2 odstotni točki. Na drugi strani se je pri dekletih najbolj povečala pojavnost debelosti v 1. triletju OŠ, ki je narasla za 2 odstotka oziroma za 0,1 odstotno točko, morbidna debelost pa je pri dekletih v 1. triletju narasla za 4 odstotke oziroma 0,1 odstotno točko.

Z vidika prekomerne prehranjenosti so tudi v šolskem letu 2024/25 nekoliko bolj tvegana populacija fantje, saj se je v 2. in 3. triletju ter v srednji šoli delež tistih s preddebelostjo gibal okrog petine populacije, pri dekletih pa so podoben odstotek dosegala le osnovnošolke 2. triletja. Najvišja pojavnost morbidne debelosti se je pokazala v 1. triletju kjer se je z njo pri fantih in dekletih srečevalo okrog 2 odstotka populacije.

Največji delež populacije fantov, ki se je po standardih WOF uvrščala med prekomerno prehranjene, je imela v šolskem letu 2024/25 pomurska regija, saj je bil delež fantov s prekomerno prehranjenostjo 30,6 odstoten, sledila pa ji je posavska regija z 29 odstotki fantov s prekomerno prehranjenostjo (Prikaz 21). Največ deklet s prekomerno prehranjenostjo je bilo v zasavski regiji (28,5 odstotkov), sledila pa je pomurska regija z 28,3 odstotkov.

Prekomerna prehranjenost je bila pri fantih v šolskem letu 2024/25 v sedmih regijah na nižji ali enaki ravni kot leto poprej, v petih regijah pa na višji. Pri dekletih se je prekomerna prehranjenost povečala v štirih regijah, v ostalih pa se je zmanjšala ali ostala na enaki ravni. Pri fantih se je pojavnost prekomerne prehranjenosti najbolj povečala v posavski regiji, kjer je prirast znašal skoraj 4 odstotke, največji delež fantov in deklet z debelostjo pa smo zabeležili v pomurski regiji. V pomurski regiji se je pokazala tudi največja pojavnost morbidne debelosti tako pri fantih kot pri dekletih.

Najnižji delež fantov in deklet s prekomerno prehranjenostjo smo v šolskem letu 2024/25 zabeležili v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Največjo razliko v pojavnosti debelosti med fanti in dekleti smo zabeležili v primorsko-notranjski regiji, kjer je bilo za skoraj 33 odstotkov več fantov z debelostjo in morbidno debelostjo kot deklet. Na drugi strani je bila najmanjša razlika v pojavnosti debelosti in morbidne debelosti med fanti in dekleti zabeležena v posavski regiji, kjer je znašala 14 odstotkov, v povprečju pa je v Sloveniji skoraj 22 odstotkov večja verjetnost, da se bo z debelostjo in morbidno debelostjo srečal fant kot pa dekle, ta verjetnost pa se je od predhodnega šolskega leta povečala.

Stanje prehranjenosti kaže na še vedno velike razlike in neenakost med regijami, saj je npr. verjetnost, da se bo z morbidno debelostjo srečal fant iz Prekmurja 3,2-krat večja kot za fanta iz osrednjeslovenske regije, verjetnost debelosti pa je za fanta iz Prekmurja večja za 1,8-krat. Hkrati je verjetnost, da se bo z morbidno debelostjo ali debelostjo srečalo dekle iz Prekmurja 3,3-krat oziroma 1,9-krat večja kot za dekle iz osrednjeslovenske regije. Glede na tako velike razlike v tveganju bi lahko zapisali, da se žal srečujemo s stanjem, ko je debelost skoraj opredeljena s pošto številko.


Prikaz 21: Prekomerna prehranjenost po regijah v šolskih letih 2023/24 in 2024/25



Po izjemnem porastu deleža otrok in mladostnikov, ki se srečujejo s težavo preddebelosti, debelosti in morbidne debelosti v šolskih letih 2019/20 in 2020/21, smo bili v naslednjih šolskih letih priča upadanju deleža fantov in deklet s težavami prekomerne prehranjenosti, ki je v šolskem letu 2024/25 po kriterijih WOF padla pod predkoronsko raven (Prikaz 22). Seveda pa je treba poudariti, da je pojavnost morbidne debelosti, ki prinaša izjemno velika zdravstvena tveganja in onemogoča normalno življenje otrok, še vedno bistveno nad predkoronsko ravno. Ob tem pa je potrebno poudariti tudi zaznano povečevanje podkožnega maščevja ob hkratnem upadu ITM, ki nakazuje na presnovno debelost. Ta je z vidika diagnosticiranja še bolj tvegana, saj jo z običajnimi metodami, ki temeljijo na ITM, ni mogoče zaznati.

Tako z vidika preddebelosti, debelosti in morbidne debelosti ostajajo fantje sicer bolj tvegana skupina od deklet, saj se s prekomerno prehranjenostjo srečuje skoraj 25 odstotkov fantov in več kot 22 odstotkov deklet.

Prikaz 22: Trendi sprememb prekomerne prehranjenosti v obdobju 1991-2025



Ob neznatnem upadu prekomerne prehranjenosti, je potrebno še enkrat poudariti, da ITM, na katerem temelji razvrščanje v skupine prekomerne prehranjenosti, ni zanesljiv pokazatelj, saj upošteva zgolj razmerje med višino in maso, to pa pomeni, da ne razlikuje puste in maščobne mase. Ker je debelina kožne gube nadlahti pri otrocih in mladostnikih v šolskem letu 2024/25 narasla, smo zagotovo priča naraščanju presnovne debelosti, ki jo je bistveno težje diagnosticirati, prinaša pa enaka zdravstvena tveganja kot debelost, določena s pomočjo ITM. Na ta način se nam večja nevidni del debelosti, ki bo v zdravstvenem sistemu zelo verjetno ostal spregledan, posamezniki s tovrstno presnovno debelostjo pa bodo podvrženi še bistveno večjim zdravstvenim tveganjem kot njihovi vrstniki, saj svojo telesno maso v najbolj občutljivem obdobju rasti in razvoja zmanjšujejo z zmanjšanim vnosom hranil.

GIBALNI RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV

Analizo stanja in trendov razvoja gibalnih sposobnosti smo izvedli na surovih vrednostih merskih nalog in na podlagi izračuna standardiziranih koeficientov na podatkih v obdobju 1988-2025 (centilne vrednosti merskih nalog glede na spol in leto starosti) ter indeksa gibalne učinkovitosti.

Pri izračunu centilnih vrednosti so v določeno leto starosti vključeni otroci, ki so se rodili od začetka do konca tistega leta, npr. v starostno skupino šestletnikov so vključeni otroci, ki so se rodili med 72. in 84. mesecem od datuma meritev (od 6 do 6,9 let starosti od datuma meritev). Kljub temu, da meritve potekajo v mesecu aprilu in maju, smo za privzet datum meritev za vsa leta določili 15. april, zaradi česar so se rahlo spremenile povprečne vrednosti obdobja 1988-2025. Edina izjema je ostalo šolsko leto 2019/20, ko so zaradi zaprtja šol meritve izvajali maja, junija in septembra in smo datume meritev pustili nespremenjene glede na poročanje šol.

Z mersko nalogo dotikanje plošč z roko, merimo hitrost izmeničnih gibov, rezultat pa kaže na posameznikov potencial hitrega preklopa gibanja, torej na njegovo informacijsko regulacijo gibanja. Skok v daljino z mesta je standardna merska naloga za ocenjevanje eksplozivne moči in je kazalnik energijske regulacije gibanja. Poligon nazaj je merska naloga za oceno koordinacije gibanja celega telesa in kaže na posameznikovo gibalno inteligentnost. Tudi rezultati te merske naloge so kazalec sposobnosti informacijske regulacije gibanja. Dviganje trupa kaže na posameznikovo vzdržljivost v moči, torej na njegovo dinamično moč trupa. Rezultati te merske naloge so kazalniki energijske regulacije gibanja. Predklon na klopici je merska naloga za ocenjevanje gibljivosti nog, njeni rezultati pa so kazalniki informacijske regulacije gibanja. Veso v zgibi uporabljamo za oceno dinamične moči rok in ramenskega obroča, njeni rezultati pa so kazalniki energijske regulacije gibanja. Tek na 60 m je merska naloga za ocenjevanje hitrostne vzdržljivosti in kaže na posameznikovo sposobnost energijske regulacije gibanja. Tek na 600 m je edina merska naloga, katere rezultati so kazalniki transportne regulacije gibanja, torej sposobnosti transporta kisika do mišic in njegove izrabe v aerobnih procesih. Pojmujemo jo kot mero aerobne vzdržljivosti.


Tudi v letošnjem letu smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverili statistično značilnost sprememb, ki so v prikazih označene z zvezdico, če je $p < ,005$ ali z dvema zvezdicama, če je $p < ,001$.

Pri analizi sprememb različnih gibalnih sposobnosti v nadaljevanju, so rezultati predstavljeni v obliki centilnih vrednosti, izračunanih specifično glede na starost v letih in spol na celotni populaciji več kot 8,5 milijona meritev otrok in mladostnikov obdobja 1988-2025, aritmetične sredine in standardni odkloni rezultatov gibalnih merskih nalog pa so predstavljeni v Prilogi 2.

Letošnji podatki kažejo, da je stanje po lanskoletnem upadu pri fantih ostalo skoraj nespremenjeno, pri dekletih pa je prišlo do rahlega izboljšanja (Prikaz 23). Gibalna

učinkovitost fantov in deklet je tako še naprej ostala pod povprečjem obdobja 1988-2025, dekleta pa so se približala povprečju, a je njihova gibalna učinkovitost še vedno več kot 7 odstotkov pod ravno predkoronskega obdobja. Od zadnjega leta pandemije se je gibalna učinkovitost fantov izboljšala za več kot 11 odstotkov, medtem ko je bilo izboljšanje pri dekletih 8-odstotno, vendar pa je kljub manjšemu izboljšanju pri dekletih to konstantnejše.

Prikaz 23: Spremembe indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Indeks gibalne učinkovitosti

Razvoj gibalne učinkovitosti je v šolskem letu 2024/25 pri fantih popolnoma zastal in ostaja globoko pod slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025, dekleta pa so dosegla le neznatno izboljšanje. Še vedno se kaže podpovprečna gibalna učinkovitost dela šolske populacije od 10. in 11. leta dalje, ki so jo v času pandemije najbolj prizadeli epidemiološki ukrepi. Regijske razlike so izjemne in se pri dekletih približujejo tridesetim odstotkom, kar je znak velike neenakosti.

Indeks gibalne učinkovitosti je kazalnik splošne telesne zmogljivosti posameznika in je izračunan kot centilna vrednost povprečja centilnih vrednosti osmih gibalnih merskih nalog, relativno glede na starost v letih in spol. Centilne vrednosti so izračunane na podlagi podatkov vseh izmerjenih otrok in mladostnikov v obdobju 1988-2025. Trendi kažejo, da niti pri osnovnošolcih niti pri osnovnošolkah ni prišlo do večjih sprememb v splošni gibalni učinkovitosti (Prikaz 24). Pri osnovnošolcih je sicer prišlo do statistično značilnega izboljšanja gibalne učinkovitosti le pri 9-letnikih, do statistično značilnega poslabšanja pa pri 13-letnikih, medtem ko je bila pri osnovnošolkah edina statistično značilna razlika ugotovljena pri 14-letnicah, kjer je prišlo do rahlega izboljšanja za poldrugi odstotek. Očitno je, da je nizka gibalna učinkovitost najbolj izražena v tistem delu osnovnošolske populacije, ki je bil pred


štirimi leti med razglašeno epidemijo covid-19 že v osnovni šoli in mu je dolgotrajno zapiranje šol, društev in klubov ter prepoved druženja močno omejilo možnost vsakodnevne telesne dejavnosti, s tem pa tudi možnost normalnega razvoja. Tako osnovnošolci med 10. in 14. letom starosti ostajajo globoko pod slovenskim povprečjem gibalne učinkovitosti obdobja 1988-2025, pri osnovnošolkah pa pod tem povprečjem ostajajo vse starostne skupine med 11. in 14. letom starosti. Najnižjo raven gibalne učinkovitosti smo zabeležili pri 11- in 12-letnih osnovnošolcih ter pri 13-letnih osnovnošolkah, najvišjo raven pa pri 6-letnikih in 8-letnicah.

Prikaz 24: Sprememba indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V letošnjem letu se pri osnovnošolcih kaže trend nižanja gibalne učinkovitosti s starostjo v 1. in 2. triletju in kasnejša stagnacija, pri osnovnošolkah pa po stabilnem 1. triletju začne gibalna učinkovitost upadati do konca osnovnošolskega izobraževanja. Ta trend kaže na problematiko premalo kakovostnega dela v 1. in 2. triletju OŠ ter premajhnega obsega obveznih ur pouka v 3. triletju, saj bi ob dovolj kakovostnem delu gibalni moral razvoj ostati vsaj na podobni ravni ali se izboljševati, tako pa v zadnjem triletju učitelji športne vzgoje lahko zgolj še popravljajo, ohranjajo in poskušajo nadomestiti zamujeno, namesto da bi izkoriščali ves razvojni potencial otrok. Glede na to, da je indeks gibalne učinkovitosti pri osnovnošolcih v povprečju ostal nespremenjen, pri osnovnošolkah pa se je povišal zgolj za 0,4 odstotka, lahko govorimo o stagnaciji gibalnega razvoja v tej populaciji, trend gibalnega razvoja pa se pri njih ne obrača v negativno smer le zaradi tega, ker v šolski sistem vstopajo otroci, ki jih v njihovem predšolskem obdobju epidemiološki ukrepi v šolskih letih 2019/20 in 2020/21 niso prizadeli v takšni meri kot takratne osnovnošolske populacije in zato, ker prizadeti deli osnovnošolske populacije nadaljujejo šolanje v srednješolskih programih.


Prikaz 25: Sprememba indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Pri srednješolcih se je statistično značilno poslabšanje gibalne učinkovitosti pokazalo le pri 18-letnih dijakih, raven nad nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025 pa so presegli le 15-letniki in 16-letnice (Prikaz 25). Pri tem je pomembno poudariti, da je vzorec srednješolske populacije zaradi večjega deleža gimnazijske populacije pozitivno pristranski, saj se v gimnazije vpisujejo gibalno učinkovitejši osnovnošolci in osnovnošolke. Tako kot v osnovnošolski populaciji, je tudi v srednješolski populaciji bolj zaskrbljujoče stanje pri dijakih, saj so 18-letniki kljub izboljšanju ostali na 43. centilu nacionalnega povprečja obdobja 1988-2025, razen v najmlajši starostni skupini pa so dijakinje dosegale okrog dva centila višje vrednosti gibalne učinkovitosti od dijakov. Na splošno je stanje gibalne učinkovitosti v srednješolski populaciji izjemno zaskrbljujoče, saj ostajajo globoko pod povprečjem obdobja 1988-2025, rahel trend izboljšanja v mlajših starostnih skupinah pa je morda tudi odraz intervencijskega programa zMigaj, ki je v šolskem letu 2024/25 na nekaterih srednjih šolah izboljšal dostopnosti organizirane športne vadbe za ta del populacije.

Regijska primerjava indeksa gibalne učinkovitosti je pokazala, da je v šolskem letu 2024/25 pri fantih in dekletih zopet prišlo do izboljšanja le v gorenjski regiji, v primorsko-notranjski regiji se je gibalna učinkovitost fantov poslabšala, v podravski regiji pa se je izboljšala le gibalna učinkovitost deklet (Prikaz 26). V vseh ostalih regijah lahko govorimo o stagnaciji gibalnega razvoja. V pomurski regiji je indeks gibalne učinkovitosti fantov in deklet letos ostal pod 45. centilom, nad nacionalno povprečje obdobja 1988-2025 pa je uspelo ostati le fantom v koroški, posavski, gorenjski in goriški, ter dekletom v koroški, posavski, osrednjeslovenski, gorenjski in goriški regiji ter v JV Sloveniji. V pozitivno smer od nacionalnega povprečja izraziteje odstopajo gorenjska, goriška in koroška regija, v negativno pa pri fantih pomurska in podravska, pri dekletih pa pomurska in zasavska. Razlike med regijami so izjemno velike, saj rezultati najbolj gibalno učinkovitih fantov iz gorenjske regije presegajo rezultate najmanj gibalno učinkovitih iz pomurske regije za skoraj 20 odstotkov, pri dekletih pa ta razlika znaša že skoraj 29 odstotkov. Gibalni razvoj otrok in mladostnikov je eden izmed najbolj zanesljivih kazalnikov neenakosti, ki potrjuje izjemno deprivilegiranost in omejene možnosti ustreznega razvoja in zdravja, kakršne opredeljuje okolje, v katerem živijo.


Prikaz 26: Regijska primerjava indeksa gibalne učinkovitosti fantov in deklet med šolskima letoma



2023/24 in 2024/25

Dolgoročni trendi razvoja indeksa gibalne učinkovitosti (Prikaz 27) kažejo, da tako gibalna učinkovitost fantov kot deklet še vedno ostaja globoko pod predkoronsko ravno, da je pri dekletih zopet prišlo zgolj do rahlega izboljšanja, pri fantih pa do stagnacije nizke gibalne učinkovitosti.

Prikaz 27: Trendi sprememb indeksa gibalne učinkovitosti v obdobju 1991-2025



Gibalna učinkovitost fantov je tako še vedno na ravni, ki je bistveno nižja od vseh predkoronskih let z izjemo šolskega leta 2007/08, dekleta pa ostajajo približno na ravni šolskega leta 2011/12, ko je v Sloveniji drugo leto potekal program Zdrav življenjski slog, čemur so sledila leta izboljševanja gibalne učinkovitosti. Glede na zastoj gibalnega razvoja, brez prihodnjega povečevanja možnosti za telesno dejavnost otrok in mladostnikov v šolskem prostoru ter dviga kakovosti dela v 1. in 2. triletju osnovne šole ter srednji šoli, ne moremo pričakovati doseganja stanja pred pandemijo covid-19, vse generacije trenutno šolajočih se otrok in mladostnikov pa tako niso deležne enakih razvojnih možnosti kot njihovi vrstniki v predkoronskem obdobju.

V nadaljevanju predstavljamo spremembe v rezultatih posameznih gibalnih merskih nalog, ki so bile podlaga za izračun indeksa gibalne učinkovitosti.


Dotikanje plošč z roko

Hitrost izmeničnih gibov je upadla tako pri dekletih, še bolj izrazito pa pri fantih. Rezultati so sicer ostali na ravni nacionalnega povprečja 1988-2025, vendar pa je zaskrbljujoč trend upadanja hitrosti delovanja osrednjega živčnega sistema s starostjo, saj bi se njegova hitrost morala naravno povečevati. Izrazite so tudi razlike med regijami, ki dosegajo tudi več kot 13 odstotkov.

Hitrost izmeničnih gibov je pri generacijah, ki so jih v šolskem obdobju prizadeli epidemiološki ukrepi za zajezitev epidemije covid-19 večinoma ostala pod slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025 (Prikaz 28). Nad to povprečje so se sicer dvignili rezultati osnovnošolcev in osnovnošolk med 6. in 11. letom starosti, vendar pa so bili trendi večinoma negativni. Pri osnovnošolcih je tako prišlo do statistično značilnega poslabšanja pri 9-, 10-, 11- 13- in 14-letnikih, pri osnovnošolkah pa pri 8- in 13-letnicah. Edino statistično značilno izboljšanje glede na predhodno generacijo se je zgodilo pri 6-letnih osnovnošolkah. Tako pri osnovnošolcih kot pri osnovnošolkah je razviden izrazit upad rezultatov s starostjo od 8. leta dalje, kar je izjemno zaskrbljujoč trend, saj kaže na upočasnevanje delovanja centralnega živčnega sistema ravno v obdobju, ko bi morale biti kognitivne sposobnosti osnovnošolk in osnovno-

šolcev na najvišji ravni in ko se zahtevnost snovi v šoli pri vseh predmetih poveča. Pri 13-letnih osnovnošolcih je upad glede na generacijo predhodnega leta tako presegel tri odstotke, pri 14-letnikih pa se je približal istemu odstotku. Pri 13-letnih osnovnošolkah je upad presegel dva odstotka, medtem ko izboljšanje pri 6-letnicah ni doseglo dveh odstotkov.


Prikaz 28: Sprememba rezultatov merske naloge dotikanja plošč z roko fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




V povprečju so osnovnošolci zabeležili 1,5-odstotno poslabšanje glede na generacijo predhodnega šolskega leta, pri osnovnošolkah pa je upad znašal manj kot 0,2 odstotka.

V srednješolski populaciji v hitrosti izmeničnih gibov ni prišlo do napredka, saj nobena starostna skupina dijakov ali dijakinj ni dosegla statistično značilno višje raven od generacije iz šolskega leta 2023/24. Pri 17-letnih dijakinjah je prišlo celo do statistično značilnega upada hitrosti izmeničnih gibov za skoraj 3 odstotke. V srednješolski populaciji so zgolj 15-letne dijakinje presegle povprečje obdobja 1988-2025 in tudi na splošno so v povprečju dosegale za dva centila višje vrednosti od dijakov. Osemnajstletni dijaki so tako šolski sistem zopet zapustili s skoraj 10 odstotkov nižjo hitrostjo izmeničnih gibov od slovenskega povprečja obdobja 1988-2025, kar nakazuje na bistveno upočasnjeno delovanje njihovega osrednjega živčnega sistema v primerjavi z vrstniki iz tega obdobja.

Prikaz 29: Sprememba rezultatov merske naloge dotikanja plošč z roko fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 30: Regijska primerjava rezultatov merske naloge dotikanja plošč z roko fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Pri fantih je do sprememb hitrosti izmeničnih gibov prišlo kar v sedmih regijah, vendar pa so bile spremembe pozitivne le v gorenjski regiji, medtem ko so otroci in mladostniki iz podravske, koroške, savinjske, posavske, osrednjeslovenske in primorsko-notranjske regije dosegali nižjo raven kot generacije v šolskem letu 2023/24. Pri dekletih do statistično značilnega izboljšanja ni prišlo v nobeni regiji, upad pa je bil statistično značilen koroški in savinjski regiji. Najvišjo raven te sposobnosti so kljub upadu še vedno dosegali otroci in

mladostniki iz koroške regije, najnižjo pa njihovi vrstniki iz zasavske regije. Pri fantih se je največji, skoraj 5-odstotni upad glede na predhodno generacijo zgodil v koroški in posavski regiji, pri dekletih pa je bil največji, skoraj 3-odstotni upad zabeležen v koroški regiji. Razlike med regijami so tako pri fantih kot pri dekletih izrazite, saj so fantje iz koroške regije dosegali za skoraj 16 odstotkov višje rezultate od vrstnikov iz zasavske regije, dekleta iz koroške regije pa za skoraj 16 odstotkov višje od deklet iz savinjske regije.

Prikaz 31: Trendi sprememb rezultatov merske naloge dotikanje plošč z roko v obdobju



Dolgoročni trendi razvoja hitrosti izmeničnih gibov kažejo, da dekleta in fantje po koronskem obdobju doživljajo izjemno počasno izboljševanje hitrosti izmeničnih gibov, v zadnjem letu pa se je trend celo obrnil navzdol (Prikaz 31). Tako fantje kot dekleta so sicer dosegali podobno raven hitrosti izmeničnih gibov kot leta 2011, ko je bil uveden program Zdrav življenjski slog, oboji pa so tudi letos še ostali nad nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025.


Skok v daljino z mesta

Eksplzivna moč nog se po koronskem obdobju ni bistveno izboljšala, pri fantih je še rahlo upadla, pri dekletih pa zgolj rahlo izboljšala. Ob zaključku osnovne šole so rezultati fantov tako še vedno 13, pri dekletih pa skoraj 15 odstotkov pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025. Razlike med regijami so velike, saj so dekleta iz regij z najvišjimi rezultati kar za 28, fantje pa za 17 odstotkov presegali tiste iz regij z najnižjimi.

Eksplzivna moč nog je gibalna sposobnost, pri kateri v zadnjih dveh desetletjih nismo uspeli doseči pozitivnega trenda in tudi v šolskem letu 2024/25 nobena starostna skupina osnovnošol-cev ali osnovnošolk ni dosegla nacionalnega povprečja obdobja 1988-2025 (Prikaz 32). Pri osnovnošolcih so se rezultati glede predhodno generacijo poslabšali pri šestih starostnih skupinah, medtem ko je pri osnovnošolkah prišlo do statistično značilnega upada pri 6-letnicah, pri 10- in 13-letnicah pa celo do rahlega izboljšanja. Nadaljuje se izjemno zaskrbljujoč trend upadanja eksplozivne moči nog že od vstopa v šolo naprej, rahlo izboljšanje pa je razvidno šele od 11. leta naprej, ko večina otrok vstopi v puberteto in začne tudi mišična masa naraščati. Pri starosti 11 let osnovnošolci in osnovnošolke dosegajo izjemno skromne rezultate, ki so kar 16 odstotkov pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025. V povprečju smo bili, glede na šolsko leto 2023/24, pri osnovnošolcih priča upadu eksplozivne moči nog za odstotek in pol, pri osnovnošolkah pa za manj kot 0,1 odstotek. Slovenskemu povprečju

obdobja 1988-2025 so se sicer najbolj približali 6-letniki in 6-letnice, pri vseh ostalih starostnih skupinah pa je raven eksplozivne moči nog ostala na izjemno skromni ravni. Glede na to, da v prvih dveh triletnjih prihaja do upada eksplozivne moči, je mogoče sklepati, da v tem obdobju otroci niso deležni dovolj vsebin z eksplozivnimi gibanji ali pa so te neustrezno izpeljane, skok v daljino z mesta pa je tudi edina gibalna naloga, kjer dekleta dosegajo nižje centilne vrednosti od fantov.


Prikaz 32: Sprememba rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2021/23 in 2024/25



Kot opozarjamo že vrsto let, je v 1. in 2. triletju bistveno premalo spodbud za razvoj eksplozivne moči, razredni učitelji in učiteljice pa se pri poučevanju očitno izogibajo eksplozivnim gibanjem zaradi strahu pred poškodbami in zaradi lastnih prenizkih kompetenc, s tem pa onemogočajo razvoj gibalne sposobnosti, ki je ključna za uspešno usvajanje raznoterih športnih znanj na področju gimnastike, atletike, iger z žogo, smučanja in vrsto drugih športnih panog, s katerimi se otroci in mladostniki ukvarjajo. Skok v daljino z mesta je ob dviganju trupa ter teku na 60 in 600 m sicer edina merska naloga, v kateri fantje glede na nacionalno povprečje 1988-2025, v zadnjih letih dosegajo višje centilne vrednosti od deklet, kar nakazuje na to, da so dekleta deležna še manj eksplozivnih gibanj kot fantje in imajo v tem pogledu slabšo mišično funkcijo od vrstnic iz preteklih generacij.

Eksplozivno moč lahko uporabljamo kot pomemben kazalnik telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov, saj postaja bolj zanesljiv kazalnik zdravstvenih tveganj kot je aerobna vzdržljivost, ki jo medicinska stroka trenutno uporablja kot glavni kazalnik telesne zmogljivosti.


Prikaz 33: Sprememba rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V srednješolski populaciji je ta gibalna sposobnost po lanskoletnem izboljšanju pri dijakih letos doživela tudi izboljšanje pri dijakinjah (Prikaz 33). Do statistično značilno višjih rezultatov je v primerjavi s predhodno generacijo prišlo pri vseh starostnih skupinah dijakinj in dijakov z izjemo 16-letnih dijakov in 17-letnih dijakinj, kjer spremembe niso bile statistično značilne. Žal niti pri eni starostni skupini srednješolske populacije rezultati skoka v daljino z mesta niso dosegle povprečja obdobja 1988-2025, pri najstarejši starostni skupini dijakov in dijakinj pa smo zopet zabeležili raven, ki je več kot 12 oziroma skoraj 10 odstotkov pod omenjenim povprečjem. Pri dijakih se je izrazil trend upada eksplozivne moči s starostjo, medtem ko pri dijakinjah raven te gibalne sposobnosti ostaja bolj stabilna skozi celotno srednješolsko izobraževanje. Mišična učinkovitost srednješolske populacije tako ostaja ena izmed največjih težav njihovega gibalnega razvoja, kaže pa tudi na to, da učitelji v srednjih šolah ne uspejo v celoti nadoknaditi razvojnih zaostankov, ki jih otroci pridelajo že v prvih dveh triletjih osnovne šole.


Primerjava po regijah kaže, da so rezultati merske naloge skok v daljino z mesta tudi letos ostali globoko pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025 (Prikaz 34). Pod 40. centilom povprečja tega obdobja so ostali rezultati deklet iz zasavske regije, fantje in dekleta pa so le v koroški, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji presegli 45. centil obdobja 1988-2025. Pri fantih je do izboljšanja eksplozivne moči nog glede na predhodno generacijo prišlo le v gorenjski regiji, do statistično značilnega poslabšanja pa je prišlo v savinjski in primorsko-notranjski regiji. Pri dekletih smo izboljšanje zabeležili v podravski in gorenjski regiji, medtem ko so rezultati v ostalih regijah ostali na ravni predhodnega leta. Najvišjo raven eksplozivne moči smo sicer pri fantih zabeležili v koroški regiji, pri dekletih pa v gorenjski regiji, a so rezultati tudi v teh dveh regijah ostali globoko pod slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025. Najnižje ravni eksplozivne moči nog smo zabeležili v pomurski regiji pri fantih in v zasavski regiji pri dekletih. Razlike med regijami so tudi v eksplozivni moči nog bile izrazite, saj so fantje iz koroške regije dosegali za več kot 17 odstotkov višje rezultate od fantov v pomurski regiji, dekleta iz gorenjske regije pa kar za 28 odstotkov višje rezultate od deklet iz zasavske regije.

Prikaz 34: Regijska primerjava rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V šolskem letu 2024/25 je eksplozivna moč ostala na podobni ravni kot leto poprej, saj je bilo izboljšanje pri dekletih zanemarljivo majhno, pri fantih pa je prišlo celo do rahlega upada. Fantje so že četrto leto zapored dosegli višjo centilno vrednost od deklet, kar se je nazadnje zgodilo leta 2013, kaže pa, da pri dekletih v pokoronskem obdobju z vidika eksplozivne moči prihaja do počasnega, a stabilnega izboljševanja, medtem ko se pri fantih po začetnem izboljšanju krivulja obrača navzdol. Ob nadaljevanju takšnega trenda bi lahko v naslednjem šolskem letu dekleta tudi v tej merski nalogi dosegala višje centilne vrednosti od fantov. Rezultati skoka v daljino kažejo na nižjo učinkovitost delovanja mišic, zaradi katere se upočasnjujejo tudi raznoteri hormonski in fiziološki procesi v obdobju razvoja, ko se to ne bi smelo dogajati. Še posebej je zaskrbljujoče dejstvo, da v primerjavi z vsemi ostalimi gibalnimi sposobnostmi, eksplozivna moč nog po koronskih šolskih letih 2019/20 in 2020/21, ni dosegla nobenega bistvenega izboljšanja tudi po koncu epidemioloških ukrepov, kar pomeni, da problematika razvoja te gibalne sposobnosti niti v šoli niti v drugih okoljih ni bila ustrezno naslovljena.

Prikaz 35: Trendi sprememb rezultatov merske naloge skok v daljino z mesta v obdobju 1991-2025




Poligon nazaj

Izboljšanje rezultatov poligona nazaj ni doseglo ravni lanskoletnega poslabšanja, kar otežuje pridobivanje novih športnih znanj. Rezultati deklet so tako ostali okrog sedem, rezultati fantov okrog štiri odstotke pod predkoronsko ravno, regijske razlike pa so presegale 23 odstotkov.


Rezultati poligona nazaj so v šolskem letu 2024/25 pri osnovnošolcih in osnovnošolkah večinoma nakazovali na trend izboljšanja (Prikaz 36). Niti pri osnovnošolcih niti pri osnovnošolkah namreč ni prišlo do statistično značilnega poslabšanja glede na predhodno generacijo, so se pa izboljšali rezultati pri 10-, 12-, 13 in 14-letnikih ter pri 9-, 10- in 11-letnicah. Po lanskoletnem upadu smo lahko letos na splošno sledili pozitivnemu trendu, ki pa je bil vseeno manjši kot je bil lanskoletni upad. Pri osnovnošolcih so se v povprečju rezultati poligona nazaj glede na rezultate vrstnikov iz šolskega leta 2023/24 poslabšali za 0,7, pri osnovnošolkah pa za 0,8 odstotka. Žal se je tudi v tej merski nalogi po osmem letu starosti pokazal trend izrazitega upadanja v 2. triletnju ter s stagnacijo pri osnovnošolkah in osnovnošolcih v zadnjem triletnju

OŠ. Koordinacija je namreč ostala nad slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025 le pri 6- do 8-letnih osnovnošolcih ter 6- do 11-letnih osnovnošolkah, a še vedno bistveno pod predkoronsko ravno. Tako se tudi pri koordinaciji kaže, da so otroci, ki so jih epidemiološki ukrepi omejevanja gibanja prizadeli v predšolskem obdobju ali povsem na začetku osnovne šole, imeli možnost izboljševanja koordinacije, starejši pa so v dveh koronskih letih pridobili bistveno manj novih gibalnih vzorcev, se naučili bistveno manj novih športnih znanj kot njihovi vrstniki pred tem obdobjem in posledično tudi izgubili velik del zmožnosti razvoja te gibalne sposobnosti, ki je kasneje ni bilo več mogoče nadoknaditi zaradi zgolj dveh ur športa v zadnjem triletnju in manj kakovostnim delom v drugem triletnju, ko predmet poučujejo pretežno razredne učiteljice. S tem je bistveno ohromljena tudi njihova sposobnost učenja novih gibalnih znanj v nadaljevanju šolanja.

Prikaz 36: Sprememba rezultatov merske naloge poligon nazaj fantov in deklet v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 37: Sprememba rezultatov merske naloge poligon nazaj fantov in deklet v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V srednješolski populaciji je do izboljšanja prišlo pri 17- in 18-letnih dijakih ter pri 15-letnih dijakinjah (Prikaz 37), pod povprečjem obdobja 1988-2025 pa sta ostali le najstarejši starostni skupini dijakov in dijakinj. Trend upadanja koordinacije z leti starosti v letošnjem letu ni bil tako izrazit kot v preteklosti, kar je morda povezano tudi z vpeljavo intervencijskega programa zMigaj.


Po lanskem poslabšanju je v šolskem letu 2024/25 prišlo do izboljšanja koordinacije fantov v štirih, pri dekletih pa v treh regijah (Prikaz 38). Statistično značilno slabših rezultatov nismo zabeležili v nobeni regiji. Najvišjo raven koordinacije so zopet dosegli fantje in dekleta iz goriške regije, najnižje pa njihovi vrstniki in vrstnice iz pomurske regije. Pri dekletih je bila razlika med regijo z najvišjimi in regijo z najnižjimi rezultati večja od 23 odstotkov, pri fantih pa je znašala skoraj 18 odstotkov. Ob tem so rezultate nad slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025 dosegali le fantje iz štirih regij in dekleta iz sedmih regij, kar je nekoliko bolje kot v šolskem letu 2023/24.

Prikaz 38: Regijska primerjava rezultatov merske naloge poligon nazaj fantov in deklet med šolskima letoma 20212/23 in 2024/25



Dekleta so po izjemnem obdobju naraščanja koordinacije gibanja celotnega telesa, ki je v šolskem letu 2018/19 dosegla vrh, v letošnjem šolskem letu ostala skoraj sedem, fantje pa skoraj štiri odstotke pod to ravno (Prikaz 39). Tako pri fantih kot pri dekletih je v letošnjem šolskem letu prišlo do rahlega izboljšanja rezultatov poligona nazaj, ki je pri fantih presegel en odstotek, pri dekletih pa je dosegel 0,8 odstotka. Fantje, ki so v predkoronskem obdobju že dosegli slovensko povprečje obdobja 1988-2025, so trenutno 48. centilu tega povprečja, kar je nižje od vseh predkoronskih šolskih let, dekleta pa so ostale nad omenjenim povprečjem in so dosegle raven šolskega leta 2013/14. Po upadu koordinacije lahko letos sicer govorimo o pozitivnem trendu, vendar izboljšanje žal ni preseglo lanskoletnega poslabšanja, kar je slaba popotnica za učenje novih športnih znanj trenutnih generacij otrok in mladostnikov.

Prikaz 39: Trendi sprememb rezultatov merske naloge poligon nazaj v obdobju 1991-2025




Dviganje trupa

Rezultati dviganja trupa se že četrto leto izboljšujejo, a se trend umirja, rezultati pa so še vedno pod predkoronsko ravno. Stanje se pri dekletih izboljšuje počasneje kot pri fantih, pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025 pa ostajajo le rezultati dijakin in dijakov ob zaključku srednje šole. Razlike med regijami so nekoliko nižje kot v ostalih merskih nalogah, saj pri fantih in dekletih najboljša regija presega najslabšo za več kot 11 odstotkov.

V predkoronskem obdobju je dinamična moč upogibalk trupa izmed vseh gibalnih sposobnosti dosegala najvišjo raven, po lanskoletnem zastoju pa je v letošnjem šolskem letu prišlo do izboljšanja trendov razvoja te gibalne sposobnosti (Prikaz 40). Pri osnovnošolcih je do izboljšanja v primerjavi z vrstniki iz šolskega leta 2023/24 prišlo v starostnih skupinah 9-, 12- in 14-letnikov, pri osnovnošolkah pa le pri 12-letnicah. Pri vseh ostalih starostnih skupinah osnovnošolcev in osnovnošolk, so rezultati dviganja trupa ostali na enaki ravni kot pri vrstnicah in vrstnikih v predhodnem šolskem letu, razen pri 13-letnikih, ki so dosegali nižje rezultate. Tudi v letošnjem šolskem letu so v osnovnošolski populaciji vse starostne skupine, z izjemo 14-letnic, ostale nad ravni slovenskega povprečja obdobja 1988-2025. Viden je ostal tudi trend slabšanja rezultatov od devetega leta starosti do konca osnovne šole. Tako se tudi v rezultatih dviganja trupa kaže, da generacije otrok, ki so jih prizadeli epidemiološki ukrepi, manko razvoja moči upogibalk trupa prenašajo v kasnejša obdobja in ga do konca osnovne šole ne uspejo


nadoknaditi. V povprečju so osnovnošolci tako dosegali 0,4 odstotke, osnovnošolke pa 0,8 odstotkov boljše rezultate od vrstnikov oziroma vrstnic iz šolskega leta 2023/24. Najvišjo raven so sicer dosegli 9-letni osnovnošolci in 8-letne osnovnošolke, najnižjo pa 14-letni osnovnošolci in osnovnošolke.

Prikaz 40: Sprememba rezultatov merske naloge dviganje trupa v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Pri srednješolski populaciji so sicer rezultati dviganja trupa zvečine ostali nad ravno slovenskega povprečja obdobja 1988-2025, napredek pa je bil statistično značilen pri 16-in 18-letnih dijakih, medtem ko so višje rezultate od predhodne generacije dosegale vse starostne skupine dijakinj z izjemo 17-letnic, pri katerih ni bilo statistično značilnih sprememb (Prikaz 41). V povprečju je pri dijakih sicer prišlo do eno in pol odstotnega izboljšanja rezultatov glede na vrstnike iz predhodnega šolskega leta, medtem ko je bil pri dijakinjah napredek 3-odstoten. Raven dinamične moči upogibalk trupa je pri dijakih in pri dijakinjah ostala bistveno pod ravno predkoronskega obdobja, zaskrbljujoč pa ostaja tudi trend upada moči upogibalk trupa z vsakim letom šolanja pri dijakinjah in dijakih, ki kaže na prenizko kakovost dela v srednjih šolah, s katero ni mogoče ohraniti ustrezne ravni mišične funkcionalnosti ali nadomestiti manjka, ki v razvoju te gibalne sposobnosti nastane že v osnovnošolskem obdobju.

Prikaz 41: Sprememba rezultatov merske naloge dviganje trupa v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Regijska primerjava je pokazala, da je pri fantih prišlo do izboljšanja moči upogibalk trupa v pomurski, gorenjski in obalno-kraški regiji, pri dekletih pa v posavski, osrednjeslovenski in gorenjski regiji (Prikaz 42).


Prikaz 42: Regijska primerjava rezultatov merske naloge dviganje trupa fantov in deklet med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Do statistično značilnega upada ni prišlo v nobeni regiji, najvišjo raven te sposobnosti pa smo zabeležili pri fantih iz koroške ter dekletih iz posavske regije. Na drugi strani so pri fantih najbolj skromne rezultate dosegali v obalno-kraški regiji, pri dekletih pa v savinjski regiji. Koroški fantje so tako dosegali za več kot 11 odstotkov višje rezultate od vrstnikov iz obalno-kraške regije, dekleta iz posavske regije pa za več kot 11 odstotkov višje od deklet iz podravske regije. V vseh regijah so tako fantje kot dekleta presegali slovensko povprečje moči upogibalk trupa obdobja 1988-2025. V povprečju so fantje to povprečje presegali za skoraj 10 odstotkov, dekleta pa za več kot 6 odstotkov.

Kljub temu, da je v rezultatih merske naloge dviganje trupa prišlo po koronskem obdobju do najbolj izrazitega trenda izboljšanja od vseh merskih nalog, rezultati še vedno ne dosegajo ravni predkoronskega obdobja (Prikaz 43). V letošnjem šolskem letu je bil trend tako že četrto leto zapored pozitiven, a je raven dinamične moči trupa pri fantih še vedno skoraj 2, pri dekletih pa več kot 5 odstotkov pod ravno vrstnikov in vrstnic iz šolskega leta 2018/19. Nazadnje so v predkoronskem obdobju rezultati fantov presegali rezultate deklet za več kot eno centilno točko leta 1993, v zadnjih treh letih pa se ta razlika precej stabilno ohranja in kaže na počasnejše pokoronsko okrevanje deklet.

Prikaz 43: Trendi sprememb rezultatov merske naloge dviganje trupa v obdobju 1991-2025




Predklon na klopci

Rezultati predklona na klopci stagnirajo, saj je pri dekletih prišlo do rahlega upada, pri fantih pa do podobno skromnega izboljšanja. Rezultati fantov so tako v vseh regijah ostali globoko pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025, nad njim pa so ostali rezultati deklet iz šestih regij.

Gibljivost nog in spodnjega dela hrbta ni nujno pozitivno povezana z zdravim razvojem otroka in mladostnika, saj zelo pogosto dobre rezultate v gibljivosti dosegajo tudi otroci, ki imajo zaradi svoje telesne nedejavnosti nizek mišični tonus in prekomerno telesno maso. V celotni osnovnošolski populaciji se je gibljivost izboljšala le pri 10-letnih osnovnošolcih, pri vseh ostalih pa je raven gibljivosti ostala podobna predhodni generaciji (Prikaz 44). V povprečju se je gibljivost pri osnovnošolcih izboljšala za pol odstotka, medtem ko je pri osnovnošolkah prišlo do 0,7-odstotnega upada. Pri osnovnošolcih je še vedno očitno upadanje gibljivosti v prvem in drugem triletnem ter stagnacija proti koncu osnovnega šolanja, vendar pa ta sposobnost pri vseh starostnih skupinah, z izjemo 6-letnih fantov, ostaja na izrazito nižji ravni od nacionalnega povprečja obdobja 1988-2025.

Tudi pri osnovnošolkah je raven gibljivosti v vseh starostnih skupinah ostala bistveno pod predkoronskim obdobjem, običajni trend izboljševanja v zadnjem triletnem pa je letos pri njih zopet umanjkal.


Prikaz 44: Sprememba rezultatov merske naloge predklon na klopci v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Pri srednješolski populaciji je bil trend sprememb očitnejši, saj so 16- in 17-letni dijaki in dijakinje dosegali statistično značilno nižjo raven gibljivosti od vrstnikov iz šolskega leta 2023/24, do statistično značilno boljših rezultatov pa je prišlo pri 15-letnih dijakih in 18-letnih dijakinjah (Prikaz 45). Čeprav so dijakinje v vseh starostnih skupinah še vedno dosegale izrazito boljše rezultate od dijakov, je pri njih prišlo do večjega upada gibljivosti kot pri dijakih, saj je ta presegal en odstotek, medtem ko je bil pri dijakih upad le 0,2-odstoten. Nad ravno slovenskega povprečja 1988-2025 so tako ostali le rezultati 18-letnic,


globoko pod tem povprečjem pa so ostali rezultati vseh starostnih skupin dijakov, ki so v povprečju dosegali za 20 odstotkov nižje rezultate od omenjenega povprečja.

Prikaz 45: Sprememba rezultatov merske naloge predklon na klopici v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Regijska primerjava kaže, da so fantje v vseh regijah še vedno ostali globoko pod povprečjem obdobja 1988-2025, pri dekletih pa je gibljivost pod povprečjem tega obdobja ostala v šestih regijah (Prikaz 46). Do edinega statistično značilnega izboljšanja je prišlo pri fantih iz gorenjske in primorsko-notranjske regije, medtem ko je do upada prišlo pri fantih in dekletih iz koroške regije ter pri dekletih iz obalno-kraške regije. Največji, skoraj 5-odstotni upad se je zgodil fantom iz koroške regije, še vedno pa je bila njihova gibljivost za skoraj 17 odstotkov višja od gibljivosti fantov iz goriške regije, ki so dosegali najnižje ravni gibljivosti. Dekleta iz koroške in gorenjske regije, ki so dosegale najvišjo raven gibljivosti, so za več kot 11 odstotkov presegle rezultate deklet iz primorsko-notranjske regije.

Prikaz 46: Regijska primerjava rezultatov merske naloge predklon na klopici med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V koronskem obdobju je raven gibljivosti v primerjavi z vsemi ostalimi gibalnimi sposobnostmi upadla najmanj izrazito, a se v štirih letih po pandemiji stanje tudi ni bistveno izboljšalo, temveč stagnira (Prikaz 47). Dekleta so tako letos prvič po letu 2014 padla pod nacionalno povprečje obdobja 1988-2025, fantje pa ostajajo globoko pod njim. Dolgoročni trendi razvoja gibljivosti kažejo različno povezanost te sposobnosti s splošno gibalno učinkovitostjo glede na spol. Medtem ko je pri fantih veljalo, da se je gibljivost od šolskega

leta 2009/10 slabšala s hkratnim siceršnjim izboljševanjem gibalne učinkovitosti, se je v šolskem letu 2019/20 to spremenilo in se je skupaj s splošno gibalno učinkovitostjo začela slabšati tudi gibljivost, smo bili pri dekletih bili v predkoronskem obdobju priča hkratnemu izboljševanju splošne gibalne učinkovitosti in gibljivosti, nato pa tudi hkratnemu slabšanju. A v šolskem letu 2024/25 se je pri dekletih ta trend spremenil in je ob rahlem izboljšanju gibalne učinkovitosti za 0,8 odstotka prišlo tudi do hkratnega poslabšanja gibljivosti za 0,4 odstotka. Velika razlika v centilni vrednosti gibljivosti fantov in deklet, se je tudi v letošnjem šolskem letu ohranila na podobni ravni kot jo beležimo že od leta 2018 dalje.



Prikaz 47: Trendi sprememb rezultatov merske naloge predklona na klopce v obdobju 1991-2025

Tako kot v preteklem poročilu lahko tudi v letošnjem sklenemo, da gibljivost ostaja edina gibalna sposobnost, pri kateri tudi v pokoronskem obdobju ne prihaja do vidnega izboljšanja, zaradi česar je mogoče, da ta trend odraža tudi psihološke težave otrok in mladostnikov v pokoronskem obdobju, ki se kažejo v povečanem stresu in psihološki napetosti, zaradi katerih je tudi mišični tonus večji od pričakovanega. Od zadnjega koronskega šolskega leta 2020/21 je tako gibljivost deklet upadla za skoraj odstotek in pol, pri fantih pa je narasla le za nekaj več kot pol odstotka, kar je najmanj izrazit trend od vseh gibalnih sposobnosti. Ob naraščanju podkožnega maščevja in upada indeksa telesne mase bi namreč pričakovali, da bo mišični tonus otrok in mladostnikov upadel in se bo gibljivost tudi s tega vidika povečala, a se to očitno ne dogaja in je vzroke stagnacije gibljivosti tako potrebno iskati v okoljskih vidikih vsakdanjega življenja otrok in mladostnikov, ki vpliva na psihološko stanje te populacije in bi ga lahko s povečanjem možnosti za telesno dejavnost izboljšali.


Vesa v zgibi

Moč rok in ramenskega obroča se je v šolskem letu 2024/25 pri fantih spet poslabšala, pri dekletih pa rahlo izboljšala, a je raven te sposobnosti še vedno nižja kot v predkoronskem obdobju. Spodbudni pozitivni trendi so bili sicer vidni pri dijakinjah, napredek pa je bil nakazan tudi pri dijakih. Razlike med regijami so bile zelo izrazite in so tako pri dekletih kot pri fantih presegle 20 odstotkov.


Statična moč rok in ramenskega obroča je gibalna sposobnost, ki je močno povezana z maso posameznikovega telesa. Iz Prikaza 48 je pri fantih razviden vzorec upadanja, pri dekletih pa vzorec stagnacije te gibalne sposobnosti skozi celotno 1. in 2. triletnje, kar kaže na to, da je pri urah športne vzgoje v tem obdobju prisotnih premalo vsebin plezanja in gimnastike, s katerimi bi to gibalno sposobnost lahko izboljšali. Tako pri fantih kot pri dekletih v zadnjem triletnju prihaja do izboljšanja te gibalne sposobnosti kljub temu, da se zaradi vstopanja v puberteto telesna masa povečuje. Tovrstni trendi kažejo, da so otroci v tem obdobju deležni bistveno višje kakovosti posredovanja vsebin pri športni vzgoji, ki jim omogoča tudi razvoj moči rok in ramenskega obroča. Če smo v preteklem šolskem letu poročali o izboljšanju pri osnovnošolcih med šestim in devetim letom starosti ter pri osnovnošolkah med sedmim in devetim letom starosti, se v letošnjem šolskem letu

podoben trend ni ohranil. Niti pri eni starostni skupini osnovnošolcev namreč ni prišlo do izboljšanja, statistično značilno nižje rezultate od predhodne generacije pa so dosegali 7- in 13-letniki. Pri osnovnošolkah ravno tako ni prišlo do vidnejšega napredka, saj so dosegale statistično višje rezultate le 14-letnice. V moči rok in ramenskega obroča so skoraj vse starostne skupine osnovnošolske populacije, z izjemo 6-letnih fantov in deklet, ostale pod ravno slovenskega povprečja obdobja 1988-2025, glede na predhodno šolsko leto pa so osnovnošolci v povprečju dosegali za skoraj 0,7 odstotkov nižje, osnovnošolke pa 0,7 odstotkov višje rezultate.

Prikaz 48: Sprememba rezultatov merske naloge vesa v zgibi V OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Pri srednješolcih in srednješolkah smo pozitivno spremembo v moči rok in ramenskega obroča zaznali pri vseh starostih skupinah dijakinj, ki so, z izjemo 18-letnic, tudi presegle nacionalno povprečje obdobja 1988-2025, medtem ko do statistično značilnega izboljšanja ni prišlo pri nobeni starostni skupini dijakov, čeprav se je tudi pri njih nakazoval trend izboljšanja (Prikaz 49). Glede na predhodno šolsko leto so bili pri dijakinjah rezultati višji za več kot 4 odstotke, pri dijakih pa za več kot odstotek. Tako dijakinje kot dijaki so dosegali tudi bistveno višje centilne vrednosti v rezultatih vese v zgibi od osnovnošolske populacije. Mogoče je, da so pozitivni trendi v srednješolski populaciji povezani tudi z uvedbo intervencijskega programa zMigaj, ki se je začel v šolskem letu 2024/25.



Prikaz 49: Sprememba rezultatov merske naloge vesa v zgibi v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25

Statična moč rok in ramenskega obroča je v vseh regijah, z izjemo osrednjeslovenske, gorenjske in goriške regije pri dekletih ter gorenjske regije pri fantih, ostala pod slovenskim povprečjem obdobja 1988-2025 (Prikaz 50). Pri fantih iz podravske, savinjske in primorsko-notranjske regije, je ta sposobnost v letošnjem šolskem letu statistično značilno upadla, na najnižji ravni pa je ostala pri fantih iz pomurske regije, ki so dosegali za več kot 20 odstotkov nižje rezultate od fantov iz gorenjske regije. Pri slednjih so se rezultati glede na predhodno generacijo izboljšali za tri odstotke, medtem ko so se pri fantih iz primorsko-notranjske poslabšali za tri odstotke in pol.


Prikaz 50: Regijska primerjava rezultatov merske naloge vesa v zgibi med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Pri dekletih je do največjega statistično značilnega izboljšanja prišlo v zasavski regiji, kjer so se rezultati izboljšali za več kot 7 odstotkov, statistično značilno pa so se izboljšali tudi rezultati deklet iz podravske, osrednjeslovenske, gorenjske in goriške regije. Dekleta iz pomurske regije, ki so dosegala najnižjo raven statične moči rok in ramenskega obroča, so dosegala skoraj 24 odstotkov nižje rezultate od deklet iz gorenjske regije, čeprav so imela le šest in pol odstotkov višjo telesno maso, kar pomeni, da nizko raven rezultatov vese v zgibi pri njih ni mogoče povezovati le s telesno maso.

Pregled časovnih trendov rezultatov vese v zgibi kaže, da se je po izjemnem upadu statične moči rok in ramenskega obroča v obeh koronskih šolskih letih, v naslednjih dveh šolskih letih trend obrnil v pozitivno smer, ki se je pri dekletih nadaljeval tudi v naslednjih dveh letih, pri fantih pa se je v zadnjih dveh letih obrnil v negativno smer in je trenutno skoraj na ravni šolskega leta 2007/08, ko so fantje dosegali najnižjo raven v predkoronskem obdobju (Prikaz 50). Pri fantih je ta gibalna sposobnost tako bila za skoraj dva odstotka nižje kot v šolskem letu 2018/19, pri dekletih pa je bila, kljub izboljšanju, še vedno nižja za več kot dva odstotka in pol.

Prikaz 50: Trendi sprememb rezultatov merske naloge vese v zgibi v obdobju 1991-2025




Tek na 60 m

Po upadu v predhodnem šolskem letu je sprinterska hitrost v šolskem letu 2024/25 spet nekoliko narasla, a ni dosegla omenjenega upada. Tudi v tej gibalni sposobnosti se še vedno kaže počasnejše delovanje osrednjega živčnega sistema, kaže pa se tudi, da pri dekletih obstaja večja potreba po dodatnih spodbudah razvoja hitrosti kot pri fantih. Razlike med regijami pri fantih niso tako izrazite kot pri nekaterih drugih gibalnih sposobnostih, a pri dekletih vseeno presegajo 21 odstotkov.

V šolskem letu 2024/25 je, po lanskoletnem upadu, sicer prišlo do izboljšanja sprinterske hitrosti osnovnošolcev in osnovnošolk, vendar je bilo to izboljšanje manjše kot predhodni upad (Prikaz 51). Statistično značilno boljše rezultate od vrstnikov iz šolskega leta 2023/24 so dosegli le 9-letni osnovnošolci, pri osnovnošolkah pa je bilo izboljšanje ugotovljeno pri 10- in 13-letnicah, medtem ko se je pri 12-letnicah pokazal negativni trend. Razveseljivo je, da so sicer vse starostne skupine osnovnošolcev in osnovnošolk presegle slovensko povprečje obdobja 1988-2025, vendar pa zopet ni mogoče spregledati upadanja rezultatov v 1. in 2. triletju in porasta v zadnjem triletju. Najvišjo raven sprinterske hitrosti namreč osnovnošolci in osnovnošolke dosegajo povsem na začetku osnovne šole. Takšni trendi nakazujejo, da v 1. in 2. triletju osnovne šole otroci ne dobijo dovolj možnosti za razvoj maksimalne hitrosti, zaradi česar sklepamo, da razredne učiteljice in učitelji tem vsebinam ne posvečajo dovolj časa in pozornosti. V povprečju se je sprinterska hitrost osnovnošolcev v primerjavi z vrstniki iz preteklega šolskega leta sicer povečala za skoraj pol odstotka, pri osnovnošolkah pa za skoraj 0,4 odstotka. Tudi v


sprinterski hitrosti se je pokazalo, da osnovnošolci in osnovnošolke, ki so jih epidemiološki ukrepi prizadeli že v času osnovne šole, do konca osnovne šole ne uspejo nadoknaditi nastalega razvojnega manjka.

Prikaz 51: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 60 m v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Rezultati analize srednješolskih podatkov so nekoliko ugodnejši, saj kažejo, da je v sprinterski hitrosti v letošnjem šolskem letu prišlo do statistično značilnega izboljšanja, pri 16-letnih dijakinjah, z izjemo najstarejših dijakov in dijakinj pa so vse ostale starostne skupine presegale povprečje obdobja 1988-2025 kljub temu, da je bil pri 17-letnicah zaznan negativni trend (Prikaz 52). Skupno so se rezultati dijakov tako izboljšali za skoraj odstotek, pri dijakinjah pa za pol odstotka. Zaskrbljujoč je tudi trend upadanja sprinterske hitrosti proti koncu šolanja, saj predvsem dijaki pri 18. letih dosegajo rezultate, ki so bistveno pod ravno 18-letnikov iz obdobja 1988-2025.

Prikaz 52: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 60 m v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Regijska primerjava je pokazala, da so bili v šolskem letu 2024/25 zopet najhitrejši fantje in dekleta iz goriške regije. Statistično značilno so se glede na šolsko leto 2023/24 izboljšali le rezultati fantov iz koroške regije ter deklet iz podravske in koroške regije, statistično značilno pa so se poslabšali rezultati deklet iz primorsko-notranjske in obalno-kraške regije (Prikaz 53). Pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025 so ostali rezultati fantov v pomurski in primorsko-notranjski regiji ter rezultati deklet v pomurski, savinjski, zasavski in primorsko-notranjski regiji. Najbolj izrazito poslabšanje, ki je doseglo skoraj 3 odstotke, se je zgodilo ravno pri dekletih iz primorsko-notranjske regije, podobno visoko pa je bilo največje izboljšanje pri dekletih iz podravske in koroške regije.

Prikaz 53: Regijska primerjava rezultatov merske naloge teka na 60 m med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Razlike med regijami niso bile tako izrazite kot pri nekaterih drugih gibalnih sposobnostih, a vseeno so fantje in dekleta iz pomurske regije z najbolj skromno ravno dosegali za 14 oziroma 21 odstotkov nižje rezultate od najhitrejših fantov in deklet iz goriške regije.

V šolskem letu 2019/20 je prišlo do največjega upada hitrosti v zgodovini spremljave, a se je v naslednjih treh letih stanje nekoliko izboljšalo, v lanskem šolskem letu je prišlo do negativnega trenda, v letošnjem šolskem letu pa se je ta spet obrnil v pozitivno smer, čeprav ni dosegel predhodnega upada (Prikaz 54). Rezultati tako še vedno ostajajo bistveno nižje od predkoronskega obdobja, saj je pri dekletih sprinterska hitrost nižja za več kot pet odstotkov, pri fantih pa za skoraj dva in pol odstotka kot v šolskem letu 2018/19. Fantje sicer že tretje leto zapored dosegajo višjo centilno vrednost sprinterske hitrosti od deklet trendi pa kažejo, da po koronskem obdobju dekleta v sprinterski hitrosti napredujejo počasneje od fantov in da bi za doseganje predkoronske ravni potrebovale več dodatnih možnosti in spodbude.




Tek na 600 m

Rezultati teka na 600 m so se v letošnjem šolskem letu izboljšali, a ostajajo globoko pod predkoronsko ravno in pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025. Še posebej je zaskrbljujoče stanje pri dijakih in dijakinjah, saj šolski sistem zapuščajo z aerobno vzdržljivostjo, ki je več kot 16 odstotkov pod povprečjem obdobja 1988-2025. Razlike med regijami so izjemne, saj najvišji rezultati fantov presegajo najnižje za 37, pri dekletih pa kar 53 odstotkov.


V preteklem desetletju smo zelo spodbujali razvoj aerobne vzdržljivosti kot podstati vsakršnega gibalnega razvoja, kar se je odrazilo tudi na dvigu te gibalne sposobnosti, vendar pa so ravno rezultati teka na 600 m v koronskem obdobju doživeli največji upad. Po tem obdobju je bil pozitiven trend predvsem pri fantih sprva precej izrazit, a se je v lanskem letu povsem ustavil. V letošnjem šolskem letu se je spet pokazal napredek, ki je bil pri osnovnošolkah podoben kot pri osnovnošolcih in je znašal nekaj več kot odstotek (Prikaz 55), čeprav so statistično značilno boljše rezultate od predhodne generacije dosegli le 7- in 9-letniki medtem ko je bil napredek pri osnovnošolkah zaznan pri 6-, 8-, 9- in 10-letnicah. Največji napredek se je sicer pokazal pri 9-letnih osnovnošolcih, ki so imeli kar za 5 odstotkov višje rezultate od predhodne generacije vrstnikov, medtem ko je znašalo največje izboljšanje pri 9-letnih osnovnošolkah skoraj 4 odstotke. Kljub izboljšanju pa ostaja stanje aerobne vzdržljivosti precej zaskrbljujoče, so v populaciji osnovnošolk nacionalno povprečje obdobja 1988-2025 presegle

le 6-letnice, pri osnovnošolcih pa najmlajše štiri starostne skupine. Tako kot pri večini ostalih gibalnih sposobnosti, je tudi pri aerobni vzdržljivosti viden upad v prvem in drugem triletnju, ki ga kljub napredku v zadnjem triletnju ni mogoče nadomestiti. Pri osnovnošolcih so imeli 7-letniki za več kot 3 odstotke nižje rezultate v primerjavi s svojimi rezultati pri 6. letih pa tudi pri 7-letnicah je bilo nazadovanje skoraj 3-odstotno.

Prikaz 55: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 600 m v OŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Prikaz 56: Sprememba rezultatov merske naloge teka na 600 m v SŠ med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



V srednješolski populaciji je stanje aerobne vzdržljivosti še bistveno bolj problematično, saj so rezultati vseh starostnih skupin dijakov in dijakinj ostali pod ravno nacionalnega povprečja obdobja 1988-2025, še posebej problematično pa je bilo stanje v najstarejši starostni skupini, saj so rezultati 18-letnikov bili več kot 17 odstotkov, rezultati 18-letnic pa več kot 16 odstotkov pod ravno tega povprečja (Prikaz 56). Glede na predhodno generacijo, so sicer vse starostne skupine dijakov dosegale statistično značilno višje rezultate, ki so v povprečju bili višji za več kot 4 odstotke, pri dijakinjah pa je bil trend negativen, saj so 17-letnice dosegle celo nižjo raven aerobne vzdržljivosti kot njihove vrstnice iz predhodne generacije, v povprečju pa so rezultati srednješolk nazadovali za skoraj odstotek in pol.

Prikaz 57: Regijska primerjava rezultatov merske naloge teka na 600 m med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Tudi regijska analiza je zopet pokazala na izjemno zaskrbljujoče trende, saj pri fantih aerobna vzdržljivost presegla slovensko povprečje obdobja 1988-2025 le v posavski, osrednjeslovenski, gorenjski in goriški regiji, pri dekletih pa le v posavski, gorenjski in goriški regiji (Prikaz 57). Na izjemno nizki ravni, pod 40. centilom, je ostala aerobna vzdržljivost deklet v pomurski regiji. Boljše rezultate od vrstnikov iz predhodnega šolskega leta, so dosegali le fantje iz podravske, osrednjeslovenske, gorenjske in goriške regije ter dekleta iz podravske, posavske in goriške regije. V nobeni regiji fantje niso dosegali statistično nižjih

rezultatov glede na predhodno generacijo, pri dekletih pa so bili nižji rezultati zabeleženi v koroški in zasavski regiji. Najvišjo raven aerobne vzdržljivosti smo sicer zabeležili pri fantih in dekletih iz goriške regije, ki so oboji presegali nacionalno povprečje obdobja 1988-2025 in sicer fantje za skoraj 12, dekleta pa skoraj za 11 odstotkov. Razlike v ravni aerobne vzdržljivosti med regijami so bile zelo očitne, saj so bili rezultati najbolj vzdržljivih deklet iz goriške regije kar za 54 odstotkov višji od rezultatov najmanj vzdržljivih deklet iz pomurske regije, pri fantih pa je bila ta razlika ravno tako zelo izrazita in je presegala 37 odstotkov.

Prikaz 58 je povedna slika težav, ki so jih protikoronski ukrepi povzročili v razvoju slovenskih otrok, saj prikazuje izjemen upad v koronskih šolskih letih in kasnejše upočasnjevanje okrevanja, ki se je letos sicer neznatno pospešilo. Tudi rezultati teka na 600 m kažejo, da imajo dekleta večje težave z okrevanjem po pandemiji in da so se fantje kljub očitnejšemu upadu v koronskih šolskih letih, bolj približali stanju pred pandemijo in dosegli višje centilne vrednosti kot dekleta.


Prikaz 58: Trendi sprememb rezultatov merske naloge teka na 600 m v obdobju 1991-2025



POVZETEK SPREMEMB TELESNEGA IN GIBALNEGA RAZVOJA OTROK IN MLADINE

Zaradi večje preglednosti vseh sprememb v telesnem in gibalnem razvoju, ki so se zgodile med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25, objavljamo prikaz, v katerem so vidni trendi in raven posameznega kazalnika telesnega in gibalnega razvoja (Prikaza 59 in 60).

Prikaz 59: Spremembe kazalnikov telesnega razvoja med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25



Legenda: ATV — telesna višina, ATT — telesna masa, AKG — kožna guba nadlahti, ITM — indeks telesne mase

Prikaz 60: Spremembe kazalnikov gibalnega razvoja med šolskima letoma 2023/24 in 2024/25




Legenda: DPR — dotikanje plošč z roko, SDM — skok v daljino z mesta, PON — poligona nazaj, DT — dviganje trupa, PRE — predklon na klopci, VZG — vesa v zgibi, T60 — tek na 60 m, T600 — tek na 600 m

Iz Prikazov 59 in 60 je zelo vidna razlika v trendih telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladostnikov v Sloveniji v zadnjih dveh letih. Zelo očitno je, da je telesna višina upadla bolj kot telesna masa, hkrati pa je narasla količina podkožnega maščevja, kar kaže na povečevanje tveganja prekomerne prehranjenosti kljub temu, da je pri dekletih ITM upadel.

Še posebej pri fantih je to tveganje bolj izraženo, saj je kljub upadu telesne mase za 0,2 odstotka, kožna guba narasla za štirikrat bolj. Tako pri fantih kot pri dekletih je zelo očitno, da v telesni višini, masi in kožni gubi nadlahti trenutna populacija bistveno presega nacionalno povprečje obdobja 1988-2025.

Prikaz 61: Raven kazalnikov gibalnega razvoja v šolskih letih 2023/24 in 2024/25



Legenda: ATV — telesna višina, ATT — telesna masa, AKG — kožna guba nadlahti, ITM — indeks telesne mase, DPR — dotikanje plošč z roko, SDM — skok v daljino z mesta, PON — poligona nazaj, DT — dviganje trupa, PRE — predklon na klopci, VZG — vesa v zgibi, T60 — tek na 60 m, T600 — tek na 600 m, IGU — indeks gibalne učinkovitosti

Trendi sprememb gibalnih sposobnosti kažejo, da se je pri fantih negativni razvoj pokazal pri hitrosti izmeničnih gibov, eksplozivni moči nog in statični moči rok in ramenskega obroča, medtem ko je do upada pri dekletih prišlo le v gibljivosti nog in spodnjega dela hrbta. Še posebej izražen je bil upad hitrosti izmeničnih gibov pri fantih, ki je znašal kar 1,7 odstotka glede na predhodno generacijo. Kljub temu je ta gibalna sposobnost ostala nad nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025, medtem ko sta predvsem eksplozivna moč nog, pa tudi statična moč rok in ramenskega obroča ostali globoko pod tem povprečjem. Pri fantih sta gibljivost nog in spodnjega dela hrbta ter eksplozivna moč nog tisti sposobnosti, ki sta na izrazito nizki ravni, čeprav bi pričakovali, da bi bila gibljivost nog ob nizki moči nog na bistveno višji ravni zaradi zmanjšanega mišičnega tonusa. Izmed vseh gibalnih sposobnosti fantje in dekleta nacionalno povprečje obdobja 1988-2025 najbolj presegajo v dinamični moči upogibalk trupa, ki jim sledita sprinterska hitrost in hitrost izmeničnih gibov, vse ostale gibalne sposobnosti pa so pri njih pod omenjenim nacionalnim povprečjem.

Pri dekletih je spodbuden trend naraščanja vseh oblik moči, kar kaže na izboljšano živčno-mišično zmogljivost njihovega organizma, česar pa za fante ne moremo zanesljivo trditi, saj se je pri njih izboljšala zgolj dinamična gibljivost upogibalk trupa. Pri fantih se je najbolj očitno izboljšala aerobna vzdržljivost, pa tudi koordinacija, vendar pa sta obe ostali pod nacionalnim povprečjem obdobja 1988-2025.

Splošno gledano, fantje ostajajo z vidika telesnega in gibalnega razvoja bolj tvegana populacija od deklet, čeprav oboji še vedno nosijo breme epidemioloških ukrepov, ki so za več mesecev zaustavili njihov običajen ritem življenja in telesne dejavnosti.

Letošnja analiza je ponovno in očitno pokazala, da sta obdobji 1. in 2. triletja osnovne šole zelo kritični za telesni in gibalni razvoj otrok in da gibalne sposobnosti od 1. razreda do 3. triletja upadajo, kar se ne bi smelo dogajati. Zaradi tega bi MVI nujno morale proučiti kakovost izvajanja pouka športne vzgoje v tem obdobju ter poskrbeti za ustrezne rešitve, ki bi nujno morale iti v smeri dviga tako kakovosti kot obsega športne vzgoje v tem obdobju. Hkrati je analiza pokazala tudi, da v 3. triletju prihaja do delnega izboljšanja gibalnega razvoja, a zaradi premajhnega obsega ur športne vzgoje, ki je celo nižje od obsega v gimnazijah, na voljo ni dovolj časa, da bi v treh letih razvoj uspeli spraviti na raven, s katero otroci vstopajo v osnovno šolo. Zaradi tega bi bilo nujno potrebno tudi v 3. triletju povečati obseg ur športne vzgoje.

Negativne posledice za nadaljnji razvoj otrok so neizbežne, ključno za popravo narejene škode pa bo, kako se bo MVI odzvalo na zaskrbljujoče podatke o stanju otrok. V šolskem letu 2023/24 so nekatere osnovne šole bile deležne možnosti financiranja oddelkov z dodatno športno ponudbo, kar je bil korak v pravo smer, kot je zelo verjeten koran v pravo smer intervencijski program zMigaj, ki je bil v srednje šole vpeljan v letošnjem šolskem letu, MVI pa bi radi spodbudili tudi k razmisleku, da bi dodatna športna ponudba morala postati standard in ne zgolj nadstandard tako v osnovnih kot v srednjih v šolah. Z dodatnimi ukrepi tako v osnovnih in srednjih šolah zamujamo že za štiri leta, nekatere generacije so izšle iz tega sistema z nepopravljivimi posledicami epidemioloških ukrepov na njihov telesni in gibalni razvoj, to pa je breme prihodnosti, ki ga bo država in družba zaradi prepočasnega odziva nosila še več desetletij.

Priloga 1: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov telesnega razvoja

Tabela P1: Kazalniki telesnega razvoja – Slovenija

Spol	Star.	Leto	Telesna višina (mm)			Telesna masa (dag)			Kožna guba nadlahti (mm)			Indeks telesne mase (kg/m ²)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	6	2024	1243	5936	52	248	5932	46	10,0	5904	4	16,0	5923	2,3
		2025	1239	5628	55	246	5633	44	9,9	5591	4	16,0	5622	2,1
	7	2024	1289	9653	56	276	9655	57	10,8	9575	5	16,5	9627	2,6
		2025	1290	9625	57	278	9629	60	11,0	9591	5	16,6	9608	2,7
	8	2024	1348	9985	60	316	9975	72	11,9	9917	6	17,3	9955	3,0
		2025	1346	9676	59	315	9676	70	11,9	9632	6	17,3	9654	3,0
	9	2024	1405	10166	64	358	10176	86	13,0	10131	6	18,0	10142	3,4
		2025	1403	9927	64	358	9931	88	13,1	9886	6	18,0	9912	3,4
	10	2024	1459	10184	67	402	10171	102	14,1	10124	7	18,7	10143	3,7
		2025	1459	10115	68	402	10112	102	14,3	10077	7	18,8	10089	3,7
	11	2024	1515	10572	73	449	10576	117	14,7	10530	7	19,4	10556	4,0
		2025	1515	10139	73	450	10152	117	14,9	10116	7	19,4	10127	4,0
	12	2024	1584	10626	84	508	10616	133	14,7	10567	7	20,1	10593	4,1
		2025	1581	10448	82	505	10453	132	14,7	10433	7	20,0	10428	4,2
	13	2024	1661	10718	87	575	10711	142	13,6	10648	7	20,7	10696	4,2
		2025	1660	10393	88	574	10393	143	13,8	10369	7	20,7	10369	4,2
	14	2024	1736	14812	80	649	14787	144	12,3	14741	7	21,4	14759	4,1
		2025	1737	14887	80	646	14902	145	12,4	14825	7	21,3	14844	4,2
	15	2024	1776	2478	69	695	2479	135	11,5	2412	6	22,0	2468	3,8
		2025	1776	2595	70	692	2593	139	11,4	2529	6	21,9	2582	3,9
	16	2024	1790	3492	68	723	3498	147	11,4	3405	6	22,5	3476	4,5
		2025	1795	4146	67	719	4123	141	11,4	4054	6	22,3	4096	4,0
	17	2024	1806	3042	68	757	3030	136	11,5	2989	6	23,2	3022	4,0
		2025	1803	3635	69	743	3627	143	11,2	3549	6	22,9	3602	4,1
	18	2024	1809	3588	68	776	3569	143	11,7	3511	6	23,7	3557	4,0
		2025	1811	4357	68	770	4341	148	11,4	4252	6	23,5	4308	4,3
Dekleta	6	2024	1229	6160	54	242	6162	46	11,6	6130	4	15,9	6150	2,2
		2025	1227	5828	56	241	5816	45	11,5	5781	4	15,9	5810	2,2
	7	2024	1278	9360	58	271	9364	58	12,5	9307	5	16,5	9339	2,7
		2025	1277	9175	57	271	9180	57	12,5	9116	5	16,5	9161	2,6
	8	2024	1336	9553	59	310	9569	70	13,5	9522	6	17,2	9539	3,0
		2025	1334	9363	61	310	9364	71	13,7	9318	6	17,5	9346	3,1
	9	2024	1396	9640	66	351	9641	86	14,5	9623	6	17,9	9611	3,3
		2025	1395	9536	65	351	9539	84	14,6	9494	6,08	17,9	9519	3,3
	10	2024	1459	9715	72	399	9700	100	15,0	9659	6,30	18,6	9678	3,6
		2025	1458	9549	72	398	9558	101	15,0	9522	6,29	18,6	9536	3,6
	11	2024	1527	9946	76	453	9930	112	14,9	9881	6,33	19,3	9909	3,8
		2025	1525	9669	75	452	9674	113	15,0	9645	6,32	19,3	9655	3,8
	12	2024	1587	10112	71	509	10099	118	15,1	10049	6,50	20,1	10081	3,9
		2025	1586	9770	71	507	9746	117	15,1	9731	6,28	20,0	9738	3,9
	13	2024	1628	10277	64	552	10258	115	15,5	10201	6,30	20,7	10236	3,9
		2025	1626	9799	65	550	9774	114	15,7	9732	6,34	20,7	9756	3,8
	14	2024	1651	13510	62	582	13443	115	16,0	13379	6,24	21,3	13415	3,8
		2025	1651	13512	63	580	13494	113	16,0	13391	6,29	21,4	13452	3,9
	15	2024	1661	2852	62	599	2834	111	16,2	2775	6,25	21,7	2806	3,7
		2025	1664	3096	77	593	3098	105	16,0	3013	5,85	22,2	3075	3,8
	16	2024	1663	4078	61	606	4046	110	16,2	3979	6,25	21,9	4029	3,8
		2025	1668	4655	69	606	4633	111	16,0	4542	5,97	22,8	4606	3,9
	17	2024	1670	3534	62	617	3497	113	16,2	3412	6,19	22,1	3486	3,8
		2025	1669	4213	62	608	4177	109	16,1	4083	6,12	21,8	4159	3,7
	18	2024	1671	3701	62	625	3628	118	16,5	3595	6,55	22,4	3610	4,0
		2025	1673	4695	61	619	4680	115	16,2	4485	6,40	22,1	4642	3,9

Tabela P2: Kazalniki telesnega razvoja – po regijah

Spol	Regija	Leto	Telesna višina (mm)			Telesna masa (dag)			Kožna guba nadlahti (mm)			Indeks telesne mase (kg/m²)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	pomurska	2024	1545	5256	198	502	5259	208	13,2	5243	7,0	20,1	5250	4,7
		2025	1515	4734	188	475	4740	199	13,6	4723	7,2	19,8	4724	4,7
	podravska	2024	1530	14803	190	480	14780	197	12,9	14744	6,8	19,6	14744	4,4
		2025	1541	15751	194	490	15740	202	13,1	15628	6,7	19,8	15701	4,5
	koroška	2024	1513	3125	184	461	3126	187	13,3	3119	6,6	19,3	3120	4,3
		2025	1509	3083	183	458	3085	187	13,5	3067	6,7	19,3	3081	4,3
	savinjska	2024	1548	14203	195	498	14195	207	13,0	14084	6,7	19,8	14166	4,6
		2025	1561	14711	200	509	14695	208	12,9	14633	6,7	20,0	14640	4,5
	zasavska	2024	1555	2001	198	510	1994	215	13,8	1980	7,6	20,1	1992	4,6
		2025	1551	2089	193	504	2087	207	13,6	2068	7,1	20,1	2084	4,5
	posavska	2024	1513	3300	190	467	3299	194	13,7	3281	6,8	19,5	3294	4,4
		2025	1515	3335	188	468	3333	194	14,0	3329	7,0	19,6	3326	4,5
	JV Slovenija	2024	1524	7799	191	473	7796	194	13,0	7658	6,6	19,5	7763	4,2
		2025	1548	8097	202	494	8084	205	13,2	8055	6,8	19,7	8053	4,4
	osrednjeslovenska	2024	1545	30987	195	481	30968	194	12,4	30902	6,3	19,3	30884	4,1
		2025	1549	30461	196	483	30521	194	12,5	30353	6,4	19,3	30397	4,1
	gorenjska	2024	1506	9900	180	446	9899	173	12,8	9794	6,9	18,9	9880	3,9
		2025	1517	9846	188	455	9845	178	12,4	9614	6,5	19,0	9825	3,8
	primorsko-notranjska	2024	1551	2954	196	499	2951	205	13,0	2933	6,8	19,8	2948	4,4
		2025	1552	3042	198	499	3037	208	12,9	3026	6,9	19,8	3034	4,5
	goriška	2024	1513	5440	181	453	5431	178	12,3	5417	6,2	19,0	5413	4,0
		2025	1517	5292	182	452	5289	173	12,1	5287	6,1	18,9	5276	3,9
	obalno-kraška	2024	1520	5062	186	460	5055	181	12,3	5053	6,2	19,1	5041	4,0
		2025	1530	5130	191	467	5109	184	12,1	5121	6,1	19,2	5100	4,0
Dekleta	pomurska	2024	1502	4984	162	462	4974	171	15,5	4970	6,6	19,8	4965	4,5
		2025	1495	4788	161	457	4785	171	15,6	4769	6,5	19,8	4774	4,6
	podravska	2024	1502	14657	160	456	14639	163	14,9	14573	6,3	19,6	14600	4,2
		2025	1505	15004	162	456	14990	161	14,9	14830	6,0	19,7	14962	4,6
	koroška	2024	1488	3174	160	438	3169	158	14,8	3172	5,9	19,1	3159	4,0
		2025	1491	3214	160	443	3215	161	15,0	3190	6,2	19,3	3207	4,1
	savinjska	2024	1514	14382	161	466	14349	167	14,9	14266	6,5	19,7	14326	4,2
		2025	1518	14740	162	470	14708	166	15,0	14664	6,5	19,8	14680	4,2
	zasavska	2024	1490	1535	163	448	1530	165	15,7	1516	6,5	19,5	1527	4,1
		2025	1498	1814	163	460	1804	168	15,7	1791	6,5	19,8	1803	4,3
	posavska	2024	1504	3433	163	458	3418	168	15,3	3422	6,3	19,6	3411	4,3
		2025	1503	3382	160	458	3373	167	15,4	3374	6,5	19,6	3362	4,4
	JV Slovenija	2024	1508	8185	165	460	8136	163	15,4	8070	6,2	19,6	8108	4,0
		2025	1513	8168	166	464	8150	163	15,7	8130	6,5	19,6	8119	4,0
	osrednjeslovenska	2024	1503	29202	162	443	29114	155	14,3	29037	5,9	19,0	28999	3,8
		2025	1505	28912	162	445	28862	154	14,5	28684	5,8	19,0	28775	3,8
	gorenjska	2024	1488	9590	162	433	9569	154	14,7	9425	6,4	18,9	9550	3,8
		2025	1497	9576	165	442	9604	154	14,4	9247	6,0	19,0	9552	3,7
	primorsko-notranjska	2024	1504	2558	158	454	2558	160	15,1	2548	6,3	19,4	2555	4,1
		2025	1505	2629	160	453	2628	158	14,9	2618	6,1	19,3	2625	4,0
	goriška	2024	1483	5153	158	431	5141	153	14,2	5141	5,8	19,0	5129	3,8
		2025	1491	5135	159	435	5135	153	13,9	5105	5,6	18,9	5127	3,7
	obalno-kraška	2024	1502	5195	161	451	5187	158	14,3	5161	5,7	19,4	5173	3,9
		2025	1512	5498	167	460	5479	159	14,4	5451	6,0	20,7	5469	4,1

Priloga 2: Aritmetične sredine in standardni odkloni kazalnikov gibalnega razvoja

Tabela P3: Kazalniki gibalnega razvoja (DPR, SDM, PON, DT) — Slovenija

Spol	Star.	Leto	Dotikanje plošč z roko (pon)			Skok v daljino z mesta (cm)			Poligon nazaj (1/10s)			Dviganje trupa (pon/min)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	6	2024	22,9	5918	3,7	120,0	5939	19,6	208,3	5866	62,0	26,5	5903	7,5
		2025	22,8	5605	3,6	119,1	5607	17,0	208,1	5578	63,5	26,5	5591	7,6
	7	2024	25,3	9610	4,0	127,5	9620	19,0	187,8	9525	60,0	30,1	9588	8,1
		2025	25,2	9573	4,0	127,0	9590	19,1	187,0	9523	60,4	30,3	9560	8,0
	8	2024	28,3	9931	4,2	137,8	9929	19,9	166,8	9850	52,7	34,5	9907	8,2
		2025	28,2	9633	4,1	137,4	9617	19,9	166,2	9575	53,0	34,5	9626	8,3
	9	2024	31,0	10138	4,2	145,8	10115	20,8	156,4	10022	51,4	37,4	10084	8,6
		2025	30,9	9888	4,3	145,7	9875	20,8	155,7	9788	51,1	37,7	9849	8,7
	10	2024	33,5	10130	4,3	152,9	10103	21,9	150,7	10045	51,2	40,0	10090	9,2
		2025	33,3	10064	4,3	152,4	10052	22,4	149,1	9989	49,7	39,9	10014	9,3
	11	2024	35,9	10515	4,4	160,2	10483	23,8	144,8	10388	53,1	41,8	10464	9,8
		2025	35,8	10073	4,4	159,7	10029	23,4	144,2	9939	49,4	42,0	10020	9,7
	12	2024	38,1	10535	4,6	169,1	10469	25,7	137,2	10354	47,0	44,0	10458	10,1
		2025	38,2	10391	4,6	169,1	10303	25,7	136,3	10178	46,8	44,2	10313	10,2
	13	2024	40,7	10602	4,9	182,5	10524	27,9	125,5	10390	40,6	46,9	10503	10,6
		2025	40,4	10280	4,9	181,4	10187	28,2	126,9	10068	44,2	46,5	10187	10,4
	14	2024	43,5	14585	5,5	198,2	14439	30,1	114,9	14157	40,7	48,9	14366	10,7
		2025	43,3	14693	5,6	197,9	14475	29,7	113,5	14248	35,8	49,3	14496	10,9
	15	2024	45,5	2454	5,3	209,5	2431	29,3	102,0	2397	26,4	50,9	2427	9,9
		2025	45,5	2552	5,4	210,9	2519	28,8	102,3	2465	38,8	50,6	2511	10,2
	16	2024	46,5	3458	5,7	215,3	3412	29,7	100,3	3338	37,6	51,0	3402	10,2
		2025	46,3	4061	5,8	215,0	4027	30,2	98,9	3887	29,3	51,6	4003	10,6
	17	2024	47,5	2997	6,0	218,9	2936	30,9	98,7	2844	33,7	51,4	2917	10,6
		2025	47,3	3558	5,9	220,1	3513	30,4	95,7	3440	29,6	51,6	3497	10,5
	18	2024	48,1	3521	6,0	218,9	3447	31,1	98,6	3312	35,8	49,9	3363	10,7
		2025	47,9	4285	6,5	221,0	4180	31,5	96,8	4033	28,5	50,7	4140	11,1
Dekleta	6	2024	22,8	6132	3,6	111,1	6141	16,3	227,2	6070	65,5	25,7	6111	7,2
		2025	23,0	5791	3,6	110,4	5807	16,6	228,2	5770	68,4	25,7	5775	7,2
	7	2024	25,4	9308	4,0	118,9	9317	17,5	200,6	9232	60,2	29,1	9307	7,6
		2025	25,5	9138	4,0	118,9	9134	17,9	200,4	9069	61,7	29,3	9112	7,7
	8	2024	28,8	9535	4,2	128,6	9515	18,3	177,0	9431	53,2	32,9	9483	7,8
		2025	28,6	9310	4,1	128,2	9295	19,0	177,8	9269	54,3	32,8	9296	7,8
	9	2024	31,4	9591	4,2	136,9	9592	19,6	165,4	9505	53,5	35,5	9551	8,0
		2025	31,5	9498	4,2	136,6	9457	19,8	163,4	9408	48,5	35,7	9446	8,3
	10	2024	34,1	9644	4,2	144,7	9586	21,4	156,0	9506	47,7	37,7	9602	8,4
		2025	34,0	9499	4,2	145,2	9429	21,3	154,8	9364	48,3	37,9	9437	8,6
	11	2024	36,5	9897	4,4	153,2	9841	22,9	148,7	9718	47,1	39,4	9854	8,7
		2025	36,5	9635	4,4	153,4	9534	22,8	146,8	9476	44,0	39,8	9554	8,8
	12	2024	38,8	10027	4,6	161,0	9875	24,2	140,0	9790	42,7	41,5	9895	9,2
		2025	38,7	9673	4,6	161,0	9516	24,7	140,0	9409	42,5	41,7	9590	9,3
	13	2024	40,8	10137	4,8	165,4	9915	25,1	133,4	9806	37,8	42,8	9950	9,5
		2025	40,6	9652	4,9	165,8	9418	25,7	133,1	9264	38,3	43,0	9519	9,6
	14	2024	42,4	13260	5,1	168,0	12807	26,0	129,2	12533	38,7	43,6	12841	10,1
		2025	42,5	13318	5,2	167,7	12859	26,4	128,5	12604	37,5	43,7	12955	10,2
	15	2024	43,5	2833	5,1	168,4	2729	25,7	124,0	2686	40,2	43,9	2750	9,6
		2025	43,7	3060	5,1	169,8	2936	26,3	121,2	2861	31,8	44,8	2965	9,9
	16	2024	44,3	4007	5,2	169,0	3850	25,3	120,3	3714	33,8	44,2	3852	10,0
		2025	44,2	4593	5,2	170,4	4434	26,2	121,1	4274	35,4	44,9	4437	9,9
	17	2024	45,0	3446	5,5	170,3	3331	26,1	118,6	3221	33,1	44,9	3325	10,2
		2025	44,8	4144	5,3	170,5	3943	25,6	119,1	3818	31,9	45,0	3989	10,2
	18	2024	45,1	3629	5,4	168,2	3496	26,3	120,6	3301	35,0	43,9	3474	10,2
		2025	45,1	4623	5,4	170,4	4375	25,8	120,0	4249	33,7	44,3	4402	10,5

Tabela P4: Kazalniki gibalnega razvoja deklet (PRE, VZG, T60, T600) – Slovenija

Spol	Star.	Leto	Predklon na klopici (cm)			Vesa v zgibi (s)			Tek na 60 m (1/10s)			Tek na 600 m (s)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	6	2024	41,4	5932	6,0	21,4	5898	18,2	130,2	5751	13,7	200,6	5726	33,5
		2025	41,4	5611	6,0	21,1	5588	17,5	130,5	5480	17,1	199,4	5428	32,6
	7	2024	41,3	9635	6,2	25,4	9544	21,2	124,1	9294	14,0	191,5	9224	35,5
		2025	41,5	9591	6,2	24,8	9529	22,6	124,3	9296	15,6	190,1	9227	34,5
	8	2024	41,3	9941	6,4	30,1	9868	24,5	118,0	9547	13,3	180,0	9470	33,2
		2025	41,4	9636	6,5	29,9	9594	24,4	117,7	9321	13,5	180,0	9245	33,8
	9	2024	40,8	10140	6,9	32,4	10050	26,5	113,7	9722	13,8	175,2	9626	34,3
		2025	40,9	9879	6,7	32,5	9819	26,7	113,2	9513	13,4	172,8	9430	33,5
	10	2024	40,3	10123	7,0	33,0	10058	27,4	110,4	9672	13,7	170,5	9591	35,9
		2025	40,5	10058	7,1	32,6	9982	28,0	110,3	9665	13,8	169,8	9549	33,9
	11	2024	39,9	10531	7,2	32,6	10431	27,9	107,5	10084	13,0	166,8	9979	34,5
		2025	39,9	10072	7,3	32,0	9956	27,5	107,4	9728	13,6	166,5	9608	34,1
	12	2024	39,7	10527	7,7	33,2	10383	27,2	104,1	10067	14,3	162,6	9930	35,3
		2025	39,8	10350	7,6	33,7	10258	27,7	103,9	9924	13,1	162,4	9781	35,4
	13	2024	40,4	10573	8,0	38,6	10460	27,9	98,5	9994	12,7	154,6	9860	34,4
		2025	40,3	10255	8,2	37,7	10165	27,7	98,9	9724	14,6	154,6	9552	35,2
	14	2024	42,2	14550	8,8	45,4	14370	28,3	93,0	13417	13,4	147,2	13205	34,7
		2025	42,1	14662	8,9	45,4	14433	28,1	92,8	13653	12,0	146,3	13393	32,4
	15	2024	43,4	2446	8,8	48,1	2395	26,2	89,0	2217	10,9	141,6	2193	32,1
		2025	43,9	2552	8,9	48,4	2506	27,3	89,2	2296	10,4	140,8	2266	31,4
	16	2024	44,9	3455	9,1	48,4	3384	25,8	87,9	3075	10,5	142,2	3007	31,7
		2025	44,6	4080	9,0	49,6	4000	28,3	87,8	3568	10,9	140,0	3510	30,6
	17	2024	46,0	3002	8,8	48,5	2921	25,8	87,1	2644	10,9	142,8	2619	32,5
		2025	45,7	3559	8,9	49,3	3485	24,8	86,8	3142	9,8	140,6	3068	30,2
	18	2024	45,7	3461	9,3	46,7	3332	25,9	87,9	2969	12,8	146,5	2893	33,9
		2025	45,9	4236	9,0	47,0	4112	25,4	87,5	3579	12,0	144,0	3484	31,5
Dekleta	6	2024	44,1	6141	5,8	19,4	6111	16,8	135,0	5899	14,1	215,7	5867	32,7
		2025	44,2	5800	5,7	19,7	5770	17,0	135,2	5632	15,6	214,6	5588	32,4
	7	2024	44,9	9327	6,0	22,7	9271	19,7	128,5	9012	14,9	205,4	8928	33,4
		2025	44,9	9141	6,2	22,9	9084	19,4	128,4	8846	15,6	204,6	8755	32,8
	8	2024	45,5	9525	6,4	26,2	9464	22,1	122,0	9120	12,6	194,6	9033	32,3
		2025	45,4	9326	6,5	26,2	9273	23,1	121,8	8957	12,8	193,8	8859	32,6
	9	2024	45,6	9609	6,9	28,0	9541	23,7	117,3	9184	12,8	187,8	9086	32,0
		2025	45,6	9486	6,8	28,3	9414	24,3	117,2	9068	11,9	186,1	8949	31,8
	10	2024	46,0	9669	7,1	29,4	9582	24,9	113,5	9134	11,9	181,4	9025	32,2
		2025	45,9	9512	7,2	29,5	9416	25,0	113,2	9095	12,1	180,4	8977	32,0
	11	2024	46,7	9880	7,6	30,2	9793	25,3	109,3	9417	11,5	175,7	9241	32,2
		2025	46,5	9608	7,6	30,1	9510	25,2	109,3	9218	12,7	175,2	9038	31,6
	12	2024	48,0	9973	7,9	31,6	9829	25,1	105,5	9405	11,2	171,6	9195	32,1
		2025	47,9	9650	7,9	31,8	9531	25,2	105,8	9127	11,9	172,4	8962	32,7
	13	2024	49,4	10104	8,0	32,8	9909	24,4	103,7	9299	12,2	171,3	9038	33,2
		2025	49,2	9631	8,1	33,5	9417	25,0	103,4	8911	12,3	171,5	8687	33,3
	14	2024	50,5	13205	8,3	32,8	12779	24,2	103,0	11671	12,0	175,2	11310	36,0
		2025	50,4	13230	8,3	33,8	12817	24,6	103,1	11710	12,9	174,6	11348	35,1
	15	2024	51,6	2795	8,0	33,1	2714	23,2	102,3	2396	11,2	176,1	2353	34,5
		2025	51,7	3056	8,0	34,7	2933	31,3	102,2	2675	11,3	175,6	2637	34,4
	16	2024	52,4	3960	7,7	32,7	3803	23,7	103,1	3348	11,8	176,9	3239	34,4
		2025	51,9	4594	8,1	35,1	4369	26,9	102,5	3861	11,6	177,2	3782	34,4
	17	2024	53,1	3461	7,8	32,6	3301	23,1	103,1	2826	11,9	178,2	2802	34,0
		2025	52,6	4124	7,9	34,5	3909	23,7	103,5	3427	11,8	180,6	3271	35,2
	18	2024	52,4	3618	8,0	31,6	3400	23,2	104,7	2882	13,2	185,9	2838	36,7
		2025	52,8	4595	7,8	33,0	4373	27,3	104,3	3530	12,3	185,9	3409	36,0

Tabela P8: Kazalniki gibalnega razvoja po starosti in spolu (DPR, SDM, PON, DT) – po regijah

Spol	Regija	Leto	Dotikanje plošč z roko (pon)			Skok v daljino z mesta (cm)			Poligon nazaj (1/10 s)			Dviganje trupa (pon/min)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	pomurska	2024	36,5	5217	9,1	165,2	5171	40,1	149,8	5140	64,9	41,7	5162	12,3
		2025	35,4	4714	8,6	160,0	4693	37,3	153,3	4652	65,2	41,3	4674	12,7
	podravska	2024	35,7	14667	8,8	163,4	14608	38,3	149,4	14391	59,1	40,8	14563	12,2
		2025	35,9	15619	8,8	164,8	15466	39,5	148,5	15278	61,6	41,2	15442	12,3
	koroška	2024	35,8	3105	8,6	163,4	3089	35,5	148,1	3060	56,8	41,4	3088	12,1
		2025	35,2	3057	8,8	163,1	3047	35,1	147,3	3016	53,3	41,5	3040	12,0
	savinjska	2024	36,4	14062	8,8	167,0	14074	39,6	146,0	13879	59,4	41,6	14003	11,9
		2025	36,8	14570	9,0	168,8	14478	40,0	141,4	14332	57,0	42,2	14472	12,1
	zasavska	2024	36,3	1969	8,8	166,8	1946	40,0	140,6	1897	57,5	42,0	1952	12,1
		2025	36,2	2067	8,9	166,9	2053	40,2	139,7	2034	55,1	42,3	2047	12,7
	posavska	2024	35,5	3271	8,9	163,7	3255	38,0	144,5	3218	54,0	41,3	3248	12,0
		2025	35,2	3307	8,7	163,2	3279	37,9	144,1	3241	51,9	41,4	3267	12,0
	JV Slovenija	2024	35,6	7760	8,8	163,2	7742	38,5	142,6	7611	55,8	40,8	7677	12,0
		2025	36,6	8007	9,1	167,5	7936	40,4	137,4	7829	52,7	41,8	7925	12,3
	osrednjeslovenska	2024	36,2	30743	8,8	168,0	30516	39,3	139,2	30052	53,8	41,9	30350	11,9
		2025	36,2	30169	8,9	168,3	30008	39,9	138,2	29566	52,4	42,2	29966	12,0
	gorenjska	2024	34,9	9826	8,2	164,0	9779	36,3	141,8	9717	51,8	40,9	9797	11,5
		2025	35,5	9764	8,5	166,7	9731	38,4	138,9	9647	51,8	41,6	9715	12,0
	primorsko-notranjska	2024	36,4	2926	8,9	169,4	2881	39,5	143,6	2865	58,8	41,9	2845	11,9
		2025	36,2	3008	8,8	168,6	2985	40,1	145,2	2943	61,5	42,0	2983	11,6
	goriška	2024	34,8	5409	8,3	165,1	5386	36,9	142,0	5323	55,6	40,6	5385	11,8
		2025	35,1	5295	8,5	165,4	5254	37,8	139,9	5206	53,5	40,8	5245	11,9
	obalno-kraška	2024	34,9	5024	8,6	162,7	4978	35,8	156,1	4933	62,4	39,4	4981	12,2
		2025	35,4	5079	8,6	165,1	5044	37,8	152,3	4967	62,1	40,3	5031	12,3
Dekleta	pomurska	2024	36,1	4959	8,4	147,2	4901	30,4	162,0	4867	62,6	38,0	4891	11,0
		2025	35,9	4749	8,2	145,8	4674	30,2	162,4	4641	62,2	38,0	4698	11,3
	podravska	2024	35,7	14502	8,2	146,9	14255	29,2	159,4	14092	57,9	37,8	14299	10,7
		2025	35,8	14862	8,2	147,9	14560	30,1	159,2	14395	59,5	37,9	14617	10,7
	koroška	2024	35,8	3155	8,2	149,1	3121	28,9	160,2	3092	62,2	38,2	3132	10,8
		2025	35,7	3198	8,2	149,4	3161	28,8	158,3	3147	57,0	38,2	3176	10,4
	savinjska	2024	36,1	14187	8,2	149,0	14044	29,4	159,2	13781	58,7	38,0	13944	10,3
		2025	36,3	14616	8,2	149,6	14367	29,9	156,5	14077	55,9	38,3	14365	10,6
	zasavska	2024	34,5	1498	7,7	142,6	1477	29,5	160,5	1430	55,7	36,8	1472	10,6
		2025	35,3	1777	8,3	143,7	1718	30,2	158,3	1690	54,1	37,6	1696	11,2
	posavska	2024	36,5	3405	8,2	150,9	3357	30,4	147,8	3307	54,5	39,1	3361	10,5
		2025	36,5	3364	8,3	150,9	3295	30,4	148,5	3273	55,2	39,6	3295	10,9
	JV Slovenija	2024	36,3	8128	8,6	148,3	8011	30,8	153,1	7881	56,4	38,4	8027	11,0
		2025	36,7	8124	8,5	149,4	7940	31,5	150,6	7829	53,7	38,7	7989	11,1
	osrednjeslovenska	2024	35,6	28939	8,1	148,6	28489	29,4	151,0	27999	53,4	38,4	28463	10,4
		2025	35,8	28634	8,2	149,0	28165	30,0	150,2	27776	53,0	38,8	28254	10,6
	gorenjska	2024	35,5	9491	8,1	150,8	9357	29,6	150,1	9247	52,1	38,5	9386	10,4
		2025	36,2	9508	8,3	152,9	9342	30,2	146,8	9278	51,8	39,3	9427	10,7
	primorsko-notranjska	2024	35,8	2557	8,1	149,3	2489	29,8	155,6	2473	54,4	38,6	2500	10,3
		2025	36,0	2613	8,1	149,5	2560	29,4	157,0	2540	62,8	38,6	2574	10,6
	goriška	2024	35,1	5135	7,8	150,0	5073	29,4	150,3	5021	52,6	38,5	5092	10,5
		2025	35,4	5102	8,0	151,2	5045	29,9	146,6	5016	50,9	39,0	5055	10,7
	obalno-kraška	2024	35,5	5116	8,0	150,4	5040	28,8	159,9	4948	57,4	37,8	5065	10,6
		2025	36,2	5387	8,1	151,6	5310	29,1	156,7	5173	56,7	38,5	5331	10,7

Tabela P9: Kazalniki gibalnega razvoja (PRE, VZG, T60, T600) — po regijah

Spol	Regija	Leto	Predklon na klopici (cm)			Vesa v zgibi (s)			Tek na 60 m (1/10s)			Tek na 600 m (s)		
			M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD	M	N	SD
Fantje	pomurska	2024	41,4	5210	7,7	31,3	5173	26,2	107,6	5027	19,3	174,9	4991	42,3
		2025	41,3	4717	7,5	30,4	4685	26,3	109,2	4603	19,4	177,1	4533	42,7
	podravska	2024	41,4	14664	7,7	33,2	14555	26,3	107,2	13943	18,3	170,2	13662	39,5
		2025	41,3	15589	7,8	33,1	15427	26,5	106,8	14617	19,2	167,8	14332	38,9
	koroška	2024	42,6	3104	7,3	34,3	3081	27,8	108,0	2975	17,3	170,3	2945	39,0
		2025	41,9	3054	7,4	33,6	3036	27,5	107,7	2959	17,0	169,4	2921	38,4
	savinjska	2024	41,4	14097	7,8	34,8	13941	27,2	106,5	13452	18,4	167,2	13233	39,8
		2025	41,6	14541	8,0	34,8	14407	26,6	105,3	13977	18,4	165,4	13735	38,2
	zasavska	2024	42,3	1954	7,7	32,5	1934	26,5	105,2	1820	17,7	167,4	1802	38,8
		2025	42,2	2057	7,6	33,0	2029	27,0	105,4	1943	18,2	166,9	1917	38,9
	posavska	2024	41,6	3250	7,4	35,0	3202	27,5	108,3	3184	16,9	164,3	3137	34,9
		2025	41,8	3285	7,2	35,4	3254	28,5	109,2	3154	23,3	163,7	3138	36,3
	JV Slovenija	2024	41,2	7758	7,5	34,7	7601	27,6	107,4	7393	18,9	166,6	7350	39,7
		2025	41,7	7995	7,8	36,0	7899	27,6	105,5	7714	18,2	163,3	7593	36,2
	osrednjeslovenska	2024	41,4	30725	7,9	37,1	30275	27,1	106,3	28610	18,2	164,1	28177	36,4
		2025	41,5	30194	8,0	37,0	29815	27,8	106,0	28054	17,6	163,3	27622	36,2
	gorenjska	2024	41,4	9821	7,5	37,5	9732	28,4	107,2	9395	16,9	165,1	9307	37,6
		2025	41,8	9761	7,6	39,3	9674	28,9	106,4	9344	17,9	162,3	9252	36,4
	primorsko-notranjska	2024	40,7	2903	7,7	36,0	2865	27,2	107,1	2711	19,2	168,6	2659	38,9
		2025	41,2	3018	7,6	34,8	2964	26,7	107,2	2774	20,3	170,1	2726	39,5
	goriška	2024	40,2	5403	7,5	37,6	5354	27,9	106,6	5039	17,0	161,6	5005	34,3
		2025	40,3	5279	7,6	37,6	5227	29,2	105,6	5098	16,9	159,6	5011	34,9
	obalno-kraška	2024	40,9	5013	7,7	32,9	4972	26,7	108,0	4557	18,2	167,8	4706	38,3
		2025	41,0	5051	7,9	33,5	5010	26,2	107,3	4652	18,9	167,0	4761	36,9
Dekleta	pomurska	2024	47,5	4951	7,7	24,6	4890	22,2	114,9	4735	18,7	197,0	4661	39,5
		2025	47,5	4742	7,6	24,8	4702	22,2	115,0	4541	16,9	198,4	4485	40,1
	podravska	2024	47,5	14511	7,7	27,0	14257	22,4	113,3	13398	15,7	189,2	13060	36,4
		2025	47,5	14795	7,8	27,9	14549	25,2	112,9	13580	16,2	187,2	13149	35,4
	koroška	2024	48,1	3159	7,6	28,0	3124	22,9	112,9	2985	15,8	186,3	2964	37,3
		2025	47,8	3197	7,6	28,0	3159	23,3	112,4	3002	15,7	186,9	2953	36,1
	savinjska	2024	47,6	14177	7,9	27,9	13854	23,5	112,7	13216	15,9	184,6	12851	35,4
		2025	47,6	14601	7,9	28,1	14321	23,5	112,3	13660	15,7	185,0	13339	35,5
	zasavska	2024	47,4	1485	7,4	24,0	1457	21,8	115,1	1294	16,9	189,1	1307	36,2
		2025	47,5	1754	7,6	27,5	1699	31,9	114,4	1561	17,3	191,4	1553	35,6
	posavska	2024	47,9	3378	7,8	30,2	3339	23,6	112,6	3200	16,6	181,3	3155	34,3
		2025	47,7	3358	7,8	31,9	3296	26,9	113,5	3151	23,6	178,6	3111	33,9
	JV Slovenija	2024	47,4	8104	7,9	28,8	7934	24,0	112,4	7598	17,4	182,5	7417	35,4
		2025	47,6	8100	7,8	29,0	7918	23,9	112,1	7564	16,3	182,0	7495	34,8
	osrednjeslovenska	2024	48,1	28854	8,0	30,7	28331	24,0	112,8	26249	15,7	182,9	25746	35,1
		2025	48,2	28625	8,1	31,2	27940	24,1	112,7	25880	15,8	182,6	25363	35,0
	gorenjska	2024	47,9	9483	7,4	32,9	9369	25,0	111,5	8908	15,5	178,9	8760	35,7
		2025	48,2	9496	7,7	34,4	9366	25,6	110,6	8984	15,8	177,4	8801	33,8
	primorsko-notranjska	2024	46,8	2524	7,6	29,1	2505	22,7	113,0	2381	15,9	185,6	2336	35,2
		2025	46,9	2608	7,7	28,9	2564	23,2	113,4	2429	17,1	185,5	2319	35,0
	goriška	2024	47,4	5136	7,7	31,4	5055	24,2	111,5	4696	15,4	177,5	4633	31,6
		2025	47,4	5087	7,8	32,9	5034	24,8	110,5	4896	15,9	175,1	4756	32,2
	obalno-kraška	2024	48,0	5116	8,0	28,4	5011	23,6	112,3	4613	15,8	182,1	4737	34,4
		2025	48,0	5390	8,3	28,9	5268	24,7	112,0	4809	15,8	183,0	4938	34,7