

ดูแลทารกแรกเกิด อย่างไร หากแม่ เป็นผู้ที่สงสัยติด เชื้อหรือติดเชื้อ COVID-19

1

ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง จะต้องมีการแยกตัวออกจากทารกอื่น และต้องสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

2

ยังไม่มีหลักฐานการติดต่อผ่านทางรก หรือผ่านทางน้ำนมแม่

3

บุคลากรทางแพทย์จะอธิบายถึงความเสี่ยง ความจำเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่-ลูก สำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้แม่เป็นผู้ตัดสินใจเอง

4

กรณีแม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

5

กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่อาการไม่มาก สามารถกอดลูกและให้นมจากเต้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการตัดสินใจของแม่และครอบครัว

6

กรณีแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 มีอาการรุนแรง หากยังสามารถบีบน้ำนมได้ ให้ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูก หากไม่สามารถบีบน้ำนมเองได้ อาจพิจารณาใช้นมผงแทน

