


การจัดการความรู้ภาควิชา การพยาบาลสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เรื่อง "UPDATE ระบบบริการฝากครรภ์"

คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และการจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง"UPDATE ระบบบริการฝากครรภ์"โดยมี อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์ อาจารย์ประจำของภาควิชาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30-13.30น.ห้อง 801/1 ชั้น 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการให้บริการฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลศิริราช



เปิดให้บริการคลินิกดังนี้

- High risk clinic : Tuesday, Thursday, Friday
- Thalassemia clinic: Monday-Friday
- Pink star clinic(Teenage pregnancy) Tuesday, Wednesday
- DM clinic: Monday-Friday

ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีผลOGTT ผิดปกติและวินิจฉัยว่าเป็นGDM ดังนี้

เดิม DX. ภายใน 3 – 7 วัน	ใหม่ DX. ภายใน 1 วัน
เข้าโครงการ Ambulatory care (พระศรีฯ 10/1)	เข้าโครงการ Strictly Diet Control (ที่ ANC) ในวันที่ทราบผลเลือดและนัดทุก 1 สัปดาห์

ส่วน กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่มีผล 50 gms 1 hr. $\geq$ 200 mgs/dl ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดูแลดังนี้

เดิม DX. ภายใน 3 – 10 วัน	ใหม่ DX. ภายใน 1 วัน
นัด 1 สัปดาห์ ตรวจ OGTT	Diagnosis เป็น GDM
ผล OGTT ผิดปกติ 2 ค่า Diagnosis เป็น GDM	เข้าโครงการ Strictly Diet Control (ที่ ANC) ในวันที่ทราบผลเลือด
เข้าโครงการ Ambulatory care (พระศรีฯ 10/1)	นัดทุก 1 สัปดาห์

การให้วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์

- หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (ไม่ว่าจะเป็น DTP/dT/TT) ให้ฉีดวัคซีน 3 เข็ม เข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ นัดฉีดเข็มที่ 2 ห่างจาก เข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี
- หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม (ไม่ว่าจะเป็น DTP/dT/TT) ให้ฉีดอีก 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจาก เข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้น ให้กระตุ้นทุก 10 ปี
- หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม (ไม่ว่าจะเป็น DTP/dT/TT) ให้ฉีดอีก 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี
- หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อน (ไม่ว่าจะเป็น DTP/dT/TT) อย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายนานกว่า 10 ปี ให้ฉีดอีก 1 เข็ม จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี
- ในกรณีที่ ไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต ให้ฉีด dT 3 เข็ม โดยให้เข็มแรก เมื่อมาฝากครรภ์ เข็มที่ 2 ห่างจาก เข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน

ถ้าภายหลังฉีดแล้วประมาณ 4-12 ชั่วโมง เกิดปฏิกิริยา ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด และโดยรอบมีขนาดใหญ่ มากกว่าปกติ โดยอาการบวมอาจลามไปถึงข้อศอก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแสดงว่าเคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ ไข่ไก่มาแล้ว และมีระดับภูมิคุ้มกันสูง ร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า Arthus reaction ให้หยุดฉีดวัคซีน dT/T อย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากการอักเสบที่เกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย (cellulitis) เนื่องจากการฉีดที่ไม่สะอาด และมีการปนเปื้อน ซึ่งมักเจ็บมากเวลาจับต้อง อาจมีไข้ร่วมด้วย ถ้าเป็นปฏิกิริยา Arthus reaction จะหายได้เองภายในเวลา 2-3 วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 วัน

อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์ ผู้ถอดบทเรียน

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. รศ. ศิริวรรณ สันทัด
2. รศ. ยุวดี วัฒนานนท์
3. รศ . นันทนา ธนาโนวรรณ
4. ผศ. ทศนีย์วรรณ พงกษาเมธานันท์
5. ผศ . นิตยา สีนสุกใส
6. ผศ. กันยรักษ์ เญยเจริญ
7. ผศ. ฉวีวรรณ อยู่สำราญ
8. ผศ . วาสนา จิติมา
9. ผศ.จรรยา เจริญสุข
10. ผศ . ปิยะนันท์ ลิ้มเรืองรอง
11. อ . อัจฉรา มาศมัลย์
12. อ. พรทิพย์ คณานับ
13. อ.ศุภาวดี วายุเหือด
14. อ.วรรณภา พาหุพัฒนกร
15. อ.ฤดี ปุงบางกะดี
16. อ.รุ่งทิพย์ กาศักดิ์
17. อ.พทุธิราภรณ์ หังสวณัส
18. อ.กุลธิดา หัตถกิจพานิชกุล
19. อ.รุ่งนภา รัชชอบ
20. อ.อรวรรณ พินิจเลิศสกุล
21. อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์
22. อ.จีรนดา อ่อนเจริญ
23. อ.นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธิ