

Universidade de São Paulo

Instituto de Física de São Carlos

Lista 3

Pedro Calligaris Delbem 5255417

Professor: Attilio Cucchieri

Abril de 2025

Sumário

1	The Numerov Algorithm	2
1.1	Exercício 1	2
1.1.1	Resolução Analítica	3
2	The Matching Method	7
2.1	Exercício 2	7

1 The Numerov Algorithm

1.1 Exercício 1

Tarefa: Reolver a equação de Poisson para $\hat{\phi}(r)$ definido por $\frac{\hat{\phi}(r)}{r} := \phi(r)$ onde $\phi(r)$ é o potencial eletrostático e a densidade de carga é $\rho(r) = \frac{e^{-r}}{8\pi}$, considerando simetria esférica.

Deve-se resolver das seguintes maneiras:

- Pelo algoritmo de Numerov
 - Escolhendo $\hat{\phi}(0)$ e $\hat{\phi}(\delta r)$, para $r \approx 0$
 - Escolhendo $\hat{\phi}(0)$ e $\hat{\phi}(\delta r)$, r muito grande (o equivalente numérico a $r \rightarrow \infty$)
- Analiticamente

Primeiro deve-se manipular a equação de Poisson de modo a obter uma equação para $\hat{\phi}(r)$

A equação de Poisson é:

$$\nabla^2 \phi(r) = -4\pi \rho(r)$$

Sabemos que ∇^2 em coordenadas esféricas é:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

Pela simetria radial reduzimos para:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right)$$

Substituimos $\frac{\hat{\phi}(r)}{r} := \phi(r)$:

$$\nabla^2 \phi(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\hat{\phi}(r)}{r} \right) \right)$$

Aplicando as derivadas:

$$\nabla^2 \phi(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \hat{\phi}(r)$$

Substituindo na equação de Poisson:

$$\frac{1}{r} \frac{d^2 \hat{\phi}(r)}{dr^2} = -4\pi\rho(r) = -\frac{e^{-r}}{2}$$

Assim, obtemos:

$$\frac{d^2 \hat{\phi}(r)}{dr^2} = -\frac{re^{-r}}{2}$$

As escolhas para $\hat{\phi}(r)$ para $r \approx 0$ e $r \rightarrow \infty$ são arbitrárias, e portanto toma-se $\hat{\phi}(0) = -1$ e $\hat{\phi}(\infty) = 0$, baseando-se nos fatos - primeiro de que a segunda derivada é negativa e segundo de que a densidade de carga tende a zero quando r tende ao infinito. Já para o primeiro passo do algoritmo de Numerov crescente, temos que expandir $\hat{\phi}(r)$ em torno de $r = 0$:

$$\hat{\phi}(r) = \hat{\phi}(0) + \hat{\phi}'(0)r + O(r^2)$$

Mas como $\hat{\phi}(0) = -1$, e para $r \approx 0$, $\hat{\phi}'(0) = -4\pi\rho(0)\delta r = -\frac{\delta r}{2}$, temos que:

$$\hat{\phi}(r) = -1 - \frac{r}{2} + O(r^2)$$

Assim, para o primeiro passo do algoritmo de Numerov, temos que:

$$\hat{\phi}(\delta r) = -1 - \frac{\delta r}{2}$$

E para o algoritmo decrescente, temos que expandir em torno de r muito grande ($=: R$) o que pela mesma lógica nos dará:

$$\hat{\phi}(R - \delta r) = 0$$

Uma vez que $\hat{\phi}'(R - \delta r) = -4\pi\rho(R - \delta r)\delta r \approx 0$.

1.1.1 Resolução Analítica

Integrando a equação, com relação ao r duas vezes, obtemos:

$$\hat{\phi}(r) = e^{-r} \left(1 + \frac{r}{2} \right) + C_1 r + C_2$$

As escolhas para $\hat{\phi}(r)$ para $r \approx 0$ e $r \rightarrow \infty$ são arbitrárias, mas devem ser escolhidas em consonância com as escolhas para as soluções numéricas. Assim, toma-se $\hat{\phi}(0) = -1$ e $\hat{\phi}(\infty) = 0$ e obtemos:

$$C_1 = 0 \quad \text{e} \quad C_2 = 0$$

E deste modo a solução analítica é:

$$\hat{\phi}(r) = e^{-r} \left(1 + \frac{r}{2} \right)$$

Resultados:

Plotando os resultados obtidos pelos algoritmos de Numerov crescente, decrescente e pela solução analítica, obtemos os seguintes resultados - para vários valores de δr :




Figura 1: Resultados para $\delta r = 0.5$




Figura 2: Resultados para $\delta r = 0.1$




Figura 3: Resultados para $\delta r = 0.01$




Figura 4: Resultados para $\delta r = 0.001$




Figura 5: Resultados para $\delta r = 0.0001$




Figura 6: Resultados para $\delta r = 0.00001$

Analisando os gráficos podemos ver que o método de Numerov crescente converge mais rapidamente, ou seja, para valores maiores de δr o algoritmo crescente se aproxima mais rapidamente da solução analítica. O mesmo não pode ser dito do algoritmo decrescente, que parece convergir apenas para valores muito pequenos de δr .

2 The Matching Method

Considerar-se-a o potencial de Lennard-Jones, dado por:

$$V(r) = 4E_0 \left[\left(\frac{a}{r} \right)^{12} - \left(\frac{a}{r} \right)^6 \right]$$

que claramente satisfaz $V(r) \rightarrow 0$ quando $r \rightarrow \infty$ e $V(r) \rightarrow +\infty$ quando $r \rightarrow 0$. Então, para estado ligado ($E < 0$) a solução da equação de Schrödinger com este potencial deve ser nula em $r = 0$ e $r \rightarrow \infty$. Assim, podemos resolvê-la pelo método de Numerov e pelo Matching Method.

2.1 Exercício 2

Tarefa: Encontrar analiticamente o ponto, r_0 , de mínimo do potencial.

Para simplificar a equação, podemos definir $x = \frac{a}{r}$, assim temos que:

$$V(x) = 4E_0 [x^{-12} - x^{-6}]$$

Para encontrar o ponto de mínimo do potencial, devemos derivar a equação do potencial e igualar a zero:

$$\frac{dV(x)}{dx} = 0$$

Derivando a equação do potencial, obtemos:

$$\frac{dV(x)}{dx} = 4E_0 [-12x^{-13} + 6x^{-7}]$$

Igualando a zero, obtemos:

$$0 = -12x^{-13} + 6x^{-7}$$

Assim, temos que:

$$2x^{-6} = 1$$

Por fim, isolando x, obtemos:

$$x_0 = 2^{1/6}$$

Devemos verificar se este ponto é realmente um mínimo, para isso devemos derivar a equação do potencial novamente e verificar se o resultado é positivo:

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = 4E_0 [156x^{-14} - 42x^{-8}]$$

Calculando a segunda derivada no ponto x_0 , obtemos:

$$\frac{d^2V(x_0)}{dx^2} = 4E_0 [156(2^{1/6})^{-14} - 42(2^{1/6})^{-8}]$$

Assim, temos que:

$$\frac{d^2V(x_0)}{dx^2} = 4E_0 [156(2^{-14/6}) - 42(2^{-8/6})]$$

Que é aproximadamente:

$$\frac{d^2V(x_0)}{dx^2} \approx 57.14E_0$$

Como E_0 é positivo, temos que:

$$\frac{d^2V(x_0)}{dx^2} > 0$$

Portanto, o ponto x_0 é realmente um mínimo do potencial.