

TP5 — El flujo de Orange Data Mining, con sus resultados

El flujo está en TP5_Sinergia_Multisensor\09_Orange\TP5_flujo_sinergia_multisensor.ows (Orange 3.39 o 3.40; variables preseleccionadas, rutas relativas — el .ows debe quedarse en su carpeta). Carga el dataset multisensor del paso 1 (TP5_dataset_<A0I>.csv), une los dos recintos con **Concatenate** (recinto como clase) y analiza. La figura está en capturas\Orange_TP5_sinergia.png.

De las huellas del dataset, tienen biomasa L4A **495 en el bosque y 1.129 en la estepa** — sobre ellas trabajan los widgets.

- **Correlations** (contra agbd_Mg_ha, Spearman, los dos recintos juntos): el ranking cuenta la historia del curso en una tabla. Arriba, lejos, las variables de estructura del propio GEDI (rh95 +0,83, fhd_normal +0,69, pai y cover +0,64) — el «parentesco» que obliga al modelo de control del paso 2. Después, **la banda L** (NISAR HH +0,49, PALSAR-2 HH +0,48, PALSAR-2 HV +0,47, NISAR HV +0,46, SAOCOM HV +0,46), apenas por encima de **los índices ópticos** (NDMI +0,45, NBR +0,45, NDVI +0,41) y de **la banda C** (VV +0,42, VH +0,39). Ningún sensor individual pasa de ~0,5: por eso se fusiona.
- **Scatter Plot** (NDVI contra agbd_Mg_ha): la saturación del TP3 vista desde la biomasa — a NDVI $\approx$ 0,8–0,9 el bosque forma una **pared vertical**: el mismo índice para 20 y para 200 Mg/ha.
- **Scatter Plot** (g0_L_PALSAR2_HV contra agbd_Mg_ha): la banda L sigue distinguiendo dentro del bosque donde el óptico ya saturó, con la dispersión del moteado a la vista (TP4, § 2.1).
- **Feature Statistics**: la ficha del dataset completo — 31 columnas por huella: identidad y partición, estructura GEDI, biomasa con su error, los cuatro índices ópticos y los ocho canales de γ^0 .

Estas mismas relaciones, cuantificadas como modelos con validación, son la tabla de los cinco modelos del paso 2 (véase el DESARROLLO.md, § 2.1): la tabla de Correlations es su antesala visual.