



El recinto que llamamos «bosque» no es bosque

BOSQUE_NW_02 · 225 km² · composición según el SNMBN (2017)



Fuente: SNMBN (2017). Barra de escala: 5 km.

La trampa de la composición

En bruto, las huellas tomadas sin hojas daban mucha menos biomasa. Parecía concluyente.

Pero las 224 huellas sin hojas recibieron todas el mismo modelo de la NASA, y las aceptadas son una mezcla de tres.

Es comparar los promedios de dos brigadas que inventariaron el mismo bosque: si una levantó parcelas de lenga y la otra de ñire, la diferencia no mide los métodos, sino qué parte del bosque recorrió cada una.

A igual modelo (DBT_SA), en Mg/ha

Cobertura	Con hojas	Sin hojas
Lenga	91,33	88,82
Ñire	2,66	3,95
Ñire bajo	0,06	0,65

La hoja caída no deprime la biomasa. La diferencia aparente era, íntegramente, un efecto de composición.

Y la NASA había corrido su modelo igual sobre las 224: sólo decidió no certificarlas.

Qué cambió al aceptar las huellas sin hojas

Recinto BOSQUE_NW_02. No se introdujo ninguna fórmula propia: se usó el valor que la NASA ya había calculado.

Huellas con biomasa	Huellas sobre lenga	Biomasa media (Mg/ha)	Incertidumbre (Mg/ha)
271	33	45,56	$\pm 3,33$
↓	↓	↓	↓
495	126	44,32	$\pm 2,20$

Lo relevante no es que el valor baje un 2,7 %, sino que apenas se mueva mientras la muestra casi se duplica.

En la lenga, cuadruplicar las mediciones desplazó el promedio de 91,33 a 94,64 Mg/ha: un 3,6 %. Esa es la mejor prueba de que las 33 originales ya eran representativas.