

Dos satélites, dos bosques distintos

Ñire y lenga en BOSQUE_NW_02, medidos sobre las mismas 657 huellas de GEDI

GEDI mide

láser: cronometra el eco

Altura del ñire **5,17 m**

Altura de la lenga **16,68 m**

La lenga es más alta **3,23 veces**

El mapa nacional predice

modelo: inventario + Sentinel-1 VH + longitud

Altura del ñire **14,75 m**

Altura de la lenga **15,40 m**

La lenga es más alta **1,04 veces**

¿Por qué? El predictor principal del mapa es la banda C, que en el TP4 usted midió: medio decibel de recorrido útil en toda la gradiente de altura. Lo que VH no distingue, el modelo tampoco.

El nombre del archivo no es el contenido

Tres capas que se llaman «verdor» y «temperatura», y no lo son

Primera pista: el rango

LST de verano: de 0,10 a 3,00.

No hay unidad de temperatura en que eso tenga sentido: en centígrados el bosque estaría siempre bajo tres grados; en kelvin, a 270 bajo cero.

Segunda pista: el signo

Correlación del «verdor espacial» con nuestros índices, en 690 huellas:

NDVI -0,276 · NBR -0,278

NDMI -0,257 · EVI -0,220

Si midiera verdor, el signo sería positivo y fuerte. **Negativo y moderado es lo propio de una medida de heterogeneidad: el paisaje es más disparejo donde la vegetación es rara.**

El error de expectativa fue nuestro. Son índices de heterogeneidad por textura de imagen (Silveira et al., 2021), diseñados para conservación de biodiversidad, no para estimar biomasa. Que no correlacionen con la estructura es el resultado esperado. Lo que faltaba en la carpeta era la documentación, no el rigor del producto.