

Лекции по дискретной математике

me and boyz

3 октября 2021 г.

Содержание

- 1 Дискретные функции и их представление. Индуктивное определение формулы. Полные системы. Критерий полноты. 1

- 1 Дискретные функции и их представление. Индуктивное определение формулы. Полные системы. Критерий полноты.

Определение. Дискретной функцией называется любая функция, отображающая конечное множество A в конечное множество B .

Область определения дискретной функции часто представляется в виде декартового произведения множеств относительно небольшой мощности.

Если $f : A \rightarrow B$ - дискретная функция и $A = A_1 \times \dots \times A_n$, то f обозначают следующим образом $f(x_1; \dots; x_n)$ и называют дискретной функцией от n переменных x_1, \dots, x_n . При этом x_i принимает всевозможные значения из A_i . Если $A_1 = \dots = A_n = B$ и $B = \{0, 1\}$, то f называется булевой функцией.

Определение. Обозначим далее $\Omega = \{0, 1\}$, тогда булевой функцией от n переменных называется любое отображение $f : \Omega^n \rightarrow \Omega$.

0-местными булевыми функциями будем называть элементы $0, 1 \in \Omega$.

Замечание. Существуют функции k - значной логики.

Обозначать булеву функцию будем $f(x_1; \dots; x_n)$ или $f(\vec{x})$, если количество переменных известно из контекста.

Определение. Если $f(x_1; \dots; x_n)$ - булева функция и $\vec{a} = (a_1; \dots; a_n) \in \Omega^n$, то образ \vec{a} при отображении f называют значением функции f на наборе \vec{a} . Обозначение: $f(\vec{a})$.

Определение. Если рассматривать 0 и 1 как числа $\in \mathbb{N}_0$, то для набора $\vec{a} = (a_1; \dots; a_n)$ обозначим $||\vec{a}|| = a_1 + \dots + a_n$ - вес вектора \vec{a} .

$\tilde{a} = \sum_{i=1}^n a_i 2^{n-i}$ - лексикографический порядок.

Пример.

$$\vec{a} = (1; 1; 0; 1) \Rightarrow ||\vec{a}|| = 1 + 1 + 0 + 1 = 3.$$

Естественным образом задания является табличный, при этом координата i -вектора f^\downarrow соответствует значению $f(\vec{a})$, где $\vec{a} = i$.

Пример.

x_0	x_1	f^\downarrow
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Утверждение. $|F_2(n)| = 2^{2^n}$.

Определение. Весом булевой функции f называют величину $\|f\| = |\{\vec{a} \in \Omega^n \mid f(\vec{a}) = 1\}|$.

Определение. Функция от $n-1$ переменной, определяемая равенством $\varphi(a_{i_n}; \dots; a_{i_1}) = f'(a_1; \dots; a_{i-1}; b; a_{i+1}; \dots; a_n)$, называется функцией полученной из f' фиксацией i -ой переменной значением b .

Обозначением $\varphi = f_i^b(x_1; \dots; x_n)$, аналогично фиксация k переменных значениями b_1, \dots, b_k : $\varphi = f_{i_1; \dots; i_n}^{b_1; \dots; b_k}(x_1; \dots; x_n)$.

Общее название таких функций φ - подфункции f .

Если $f(a_1; \dots; a_{i-1}; 0; a_{i+1}; \dots; a_n) = f(a_1; \dots; a_{i-1}; 1; a_{i+1}; \dots; a_n)$, то переменная x_i называется несущественной переменной функции f , в противном случае - существенной.

Определение. Пусть x_i - несущественная (фиктивная) переменная функции f , g получена из f фиксацией x_i любой константой, тогда говорят, что g получена удалением из f несущественной переменной x_i , а f получена из g добавлением фиктивной переменной x_i .

Пусть задано множество функций $\mathbb{K} = \{f_i : i \in I\}$ и множество символов переменных $X = \{x_1; \dots; x_n\}$.

Определение.

1. Любой символ переменной есть формула над классом \mathbb{K} .
2. Если f_j - символ m - местной функции из \mathbb{K} , а A_1, \dots, A_m - формулы над \mathbb{K} , то $f_j(A_1; \dots; A_m)$ - формула над \mathbb{K} .
3. Других формул нет.

Множество формул над \mathbb{K} обозначается $\Phi(\mathbb{K})$. При $m = 0$ формула есть символ над \mathbb{K} , т.е. константа.

Определение. Число символов функций из \mathbb{K} , встречающихся в формуле A назовем рангом формулы A . Обозначение: $r(A)$.

Определение.

1. Подформула формулы x_i - только она сама.
2. Подформулы $f_j(A_1; \dots; A_n)$ - на сама и все подформулы формулы $A_1; \dots; A_n$.

Определение. Пусть A - произвольная формула, в ее записи присутствует только переменные x_{i_1}, \dots, x_{i_k} . Набор x_{j_1}, \dots, x_{j_m} называется допустимым, если $\{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}\} \subseteq \{x_{j_1}, \dots, x_{j_m}\}$.

Каждой формуле при фиксированном допустимом наборе $(x_1; \dots; x_n)$ сопоставляется по следующему правилу:

1. Если A есть x_i , то ей сопоставляется функция f , значения которой определяются равенством $f(a_1; \dots; a_n) = a_i, (a_1; \dots; a_n) \in \Omega^n$.
2. Если A есть $f_j(A_1; \dots; A_m)$ и формулам A_1, \dots, A_m сопоставлены функции $\varphi_1(x_1; \dots; x_n); \dots; \varphi_m(x_1; \dots; x_n)$, то формуле A сопоставляется функция f , значения которой определяются равенством $f(a_1; \dots; a_n) = f_j(b_1; \dots; b_n)$, где $b_\zeta = \varphi_\zeta(a_1; \dots; a_n), \zeta \in \overline{1, n}$.

Определение. Формулы A и B равносильны, если они представляют одну и ту же функцию на любом допустимом наборе. Обозначение: $A \equiv B$.

Определение. Пусть A - произвольная формула над классом $\mathbb{K} = (\&, \vee, /)$. Двойственной к A называется формула полученная из A заменой $\& \leftrightarrow \vee$. Обозначение: A^* .

Теорема. $A^*(x_1; \dots; x_n) = A(\neg x_1; \dots; \neg x_n)$.

Следствие. $A \equiv B \Leftrightarrow A^* \equiv B^*$.

Определение. Замыканием системы \mathbb{K} булевых функций называют множество всех булевых функций представимых формулами над \mathbb{K} . Обозначение: $[\mathbb{K}]$.

Утверждение.

1. $\mathbb{K} \subseteq [\mathbb{K}]$
2. $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \Rightarrow [\mathbb{K}_1] \subseteq [\mathbb{K}_2]$
3. $[[\mathbb{K}]] = [\mathbb{K}]$

Определение. Система \mathbb{K} называется полной, если (замыкание) $[\mathbb{K}] = F_2$.