

Prueba low

Tesista: David Gustavo Merinos Sosa
Directora de tesis: María Dolores Lara Cuevas

Teorema 1. *Para $n > 4$, $\text{at}(K_n) > 2$.*

Demostración. Supongamos $\text{at}(K_n) = 2$ con $n > 4$. Esto implica que existen dos thrackles T_1, T_2 tales que $|T_1 \cup T_2| \geq \binom{n}{2}$. En el mejor caso T_1 y T_2 son thrackles máximos y solo comparten una arista a pares. Entonces $|T_1 \cup T_2| \leq 2n - 1$, luego para $n > 4$ tenemos que $\binom{n}{2} > 6$.

$$\begin{aligned} 2n - 1 &\geq 6 \\ 2n &\geq 7 \\ n &\geq 3,5 < 4 \quad \text{?} \end{aligned}$$

De esta contradicción decimos que para K_n con $n > 4$ su antithickness es mayor a 2. \square

1. Encontrar el anti-thickness geométrico de K_n

Sea K_n^i el dibujo de K_n equivalente al tipo de orden i para n puntos. Supongamos que $\text{at}(K_n^i) = \lambda_i$. Y que para este tipo de orden existen M thrackles máximos. Sea Λ_j con $j = 1 \dots \binom{M}{\lambda}$ una conjunto de tamaño λ de thrackles máximos. Definimos $m_i = |\bigcup \Lambda_j|$

Si sucede que $m_i > \binom{n}{2}$, podemos decir que el tipo de orden i tiene anti-thickness a lo sumo λ . El anti-thickness del tipo de orden i es el λ más pequeño para el cual se cumple la condición anterior.

Si repetimos este análisis para cada dibujo de K_n , es decir, para cada tipo de orden, podemos decir que el anti-thickness geométrico de K_n es el λ más pequeño resultante de todos los tipos de orden.

2. Saber si $\text{at}(K_n) > k$ para $n > 6$

Supongamos $\text{at}(K_n) = k$ con $n > 6$. Esto implica que existen k thrackles T_1, T_2, \dots, T_k tales que $|T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_k| \geq \binom{n}{2}$. En general, $|T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_k| \leq$

$kn - m$ donde m es el total de aristas repetidas entre thrackles. Luego para $n > 6$, $\binom{n}{2} > 15$ tenemos que $\binom{n}{2} > 6$. Esto nos da la siguiente desigualdad:

$$kn - m \geq 15$$

Lo que implica que $\text{at}(K_n) = k$ cuando $m \leq kn - 15$ para $n > 6$.

Por ejemplo, digamos que $k = 3, n = 7$ la anterior condición nos dice que el anti-thickness de K_7 será 3 si $m \leq 6$. Basta con examinar cada pareja de thrackles cuya intersección es de tamaño 1, y compararla con cada uno de los otros thrackles de su complemento, contar las aristas repetidas y observar que en todos los casos se repiten mas de 6 aristas, es decir $m > 6$. Por lo que podemos decir que $\text{at}^g(K_7) > 3$. Y luego, como $\text{cat}(K_7) = 4$, $\text{at}^g(K_7) = 4$.

3. Estadísticas de repeticiones

n	OT	Dec. size	\min_rep	\max_rep
6	0	3	3	3
7	0	4	7	7
8	0	5	10	12
8	12	5	12	12
8	54	5	12	12
9	12	6	15	18
9	52	6	17	17
9	54	6	16	18
9	80	6	14	14
9	696	6	18	18
9	1080	6	16	16
9	1287	6	15	17