

Thesis Title

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN

David Gustavo Merinos Sosa

Day Month Year

Abstract

Resumen

Dedicación

Agradecimientos

Índice general

1. Introducción	13
2. Antecedentes	15
2.1. Gráfica	15
2.2. Gráfica geométrica	15
2.3. Thrackles	15
2.4. Tipo de Orden	15
2.5. Anti-thickness y anti-thickness geométrico	15
3. Estado del arte	17
4. Resultados	21
4.1. Descomposiciones por thrackles máximos.	21
4.2. El anti-thickness geométrico de K_n con $n \in [3, 9]$ es igual al anti-thickness convexo	22
5. Conclusiones y trabajo futuro	27

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Gráfica

2.2. Gráfica geométrica

2.3. Thrackles

2.4. Tipo de Orden

2.5. Anti-thickness y anti-thickness geométrico

Capítulo 3

Estado del arte

Antes de hablar del anti-thickness y los resultados, es sensato hablar de otro concepto llamado **thickness** pues su definición está estrechamente relacionada con el anti-thickness. En el artículo de Eppstein y otros [2] se recupera la definición de thickness teórico y thickness geométrico, además proporciona cotas para éste último. Podemos definir el thickness de una gráfica en términos del índice crómico de una gráfica y mantenerlo coherente con la definición de Eppstein: $\theta(G)$: Mínimo k tal que existe una partición de las aristas de G , de tamaño k en gráficas planares.

Por otro lado el thickness geométrico $\bar{\theta}(G)$: Mínimo k tal que existe un dibujo geométrico G de G cuyas aristas pueden ser particionadas en k gráficas planas. Eppstein prueba que:

$$\bar{\theta}(G) \in \left[\left\lceil n/5.646 + 0.342 \right\rceil, \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil \right]$$

y encuentra el valor exacto para K_n con $n \leq 12$ y $n \in \{15, 16\}$. También estudia el anti-thickness geométrico para gráficas completas bipartitas y demuestra:

$$\left\lceil \frac{ab}{2a + 2b - 4} \right\rceil \leq \theta(K_{a,b}) \leq \bar{\theta}(K_{a,b}) \leq \left\lceil \frac{\min(a,b)}{2} \right\rceil$$

Es natural pensar que si una gráfica puede ser descompuesta en sub-gráficas donde no existe ningún cruce entre dos aristas, es quizás posible descomponer la gráfica en sub-gráficas donde siempre ocurran cruces entre dos aristas, es decir en thrackles; este concepto es conocido como el anti-thickness de una gráfica y analogo al caso del thickness también existe el anti-thickness geométrico.

Antes de examinar los resultados del anti-thickness, resulta interesante verificar el trabajo de Araujo y Urrutia [1]; aquí se define la gráfica de disyunción $D(S)$ de un conjunto S de puntos en el plano, donde considerando todos los segmentos de recta entre pares de vértices de S como los vértices de $D(S)$, existe una arista entre dos vértices si los dos segmentos de recta correspondientes se cruzan o comparten un vértice.

Si asignamos un color a cada vértice de $D(S)$ de tal manera que dos vértices adyacentes no compartan color y además minimizamos el número de colores usados, obtenemos el número cromático de $\chi(D(S))$. Es fácil ver que una clase cromática de $D(S)$ es un conjunto independiente y además un thrackle. Si ahora consideramos todos los posibles encajes de S en el plano y para cada uno encontramos $\chi(D(S))$, tendremos una lista de enteros que representa el tamaño mínimo de la descomposición en thrackles de una gráfica completa cuyos vértices están dados por S en el plano. Si de esta lista consideramos ahora el valor mínimo encontraremos el anti-thickness para la gráfica completa geométrica de n vértices. Sin embargo, en este trabajo se considera el máximo valor de dicha lista; definiendo entonces :

$$d(n) = \text{máx}\{\chi(D(S)) : S \subset \mathbf{R}^2 \text{ en posición general}, |S| = n\}$$

De manera concreta, el trabajo presenta cotas para $d(n)$, y $d_c(n)$ que se define de manera similar pero con S en posición convexa.

La diferencia entre $d(n)$ y el anti-thickness reside en que el último buscamos el mínimo de la lista de números cromáticos de $D(S)$, para ver más claramente la relación entre $d(n)$ y el anti-thickness podemos definir el anti-thickness geométrico de la gráfica completa de n vértices $at(n)$ como sigue :

$$at(n) = \text{mín}\{\chi(D(S)) : S \subset \mathbf{R}^2 \text{ en posición general}, |S| = n\}$$

Por otro lado, debido a que cuando K_n es encajado en el plano en posición convexa los dibujos posibles no presentan diferencias combinatorias, se tiene que el anti-thickness geométrico convexo de la gráfica completa de n vértices ($cat(n)$) :

$$d_c(n) = cat(n)$$

Como se mencionó anteriormente el anti-thickness está relacionado con la descomposición de una gráfica en sub-gráficas donde siempre ocurren cruces, podemos ver el anti-thickness como el lado opuesto del thickness. Dujmovic y Wood [3] presentan resultados del anti-thickness para familias específicas

de gráficas, por ejemplo árboles, 2-tracks, books, gráficas outerplanar, k-queues, entre otros haciendo observaciones de resultados anteriores. Además se prueba la relación entre thickness y anti-thickness, concretamente prueban que para toda gráfica con anti-thickness k y thickness t :

$$k \leq t \leq \left\lceil \frac{3k}{2} \right\rceil$$

Acerca del anti-thickness (teórico) de gráficas completas, en [3] se prueba que es al menos $\frac{n}{3}$ y a lo más $\lceil \frac{n-1}{2} \rceil$. Sin embargo ellos conjeturan que el anti-thickness de una gráfica completa es exactamente $\lceil \frac{n-1}{2} \rceil$.

El principal resultado para posición convexa lo presenta Wood y Fabila [5]. Aquí se prueba que cuando los puntos están en posición convexa dos thrackles máximos comparten al menos una arista y por lo tanto la unión de k thrackles máximos tiene a lo más $kn - \binom{k}{2}$ aristas. Luego, como una gráfica completa de n vértices tiene $\binom{n}{2}$ aristas la resolución de la desigualdad

$$\binom{n}{2} \leq kn - \binom{k}{2}$$

otorga el resultado de la cota inferior para el anti-thickness geométrico convexo que es

$$n - \left\lfloor \sqrt{2n + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right\rfloor$$

La cota superior se obtiene dando una coloración propia de los vértices de la gráfica de disyunción $D(S)$. La coloración es lograda consiguiendo trazar caminos en una estructura conocida como polyomino en la que los vértices de $D(S)$ son las filas y las columnas de dicha estructura. En este trabajo cada camino representa un conjunto independiente de vértices en $D(S)$ y por lo tanto un thrackle. Concluyen dando el número máximo de caminos posibles en el polyomino, dicho número coincide con el de la cota inferior y luego se tiene que el anti-thickness geométrico convexo ($cat(n)$) es:

$$n - \left\lfloor \sqrt{2n + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Es importante notar que el anti-thickness geométrico convexo es acotado examinando el número mínimo y máximo de aristas aportadas por una colección de thrackles máximos, dicho de otra manera se basa en descomponer

la gráfica completa convexa en thrackles máximos. Esta idea fue retomada en este trabajo para intentar ajustar las cotas del anti-thickness en posición general.

Con respecto a puntos que no están estrictamente en posición convexa Leños y Lomelí [4] examinan el número cromático de la gráfica de disyunción de una familia de puntos conocida como la doble cadena convexa; al igual que la posición convexa la doble cadena solamente tiene un dibujo en el plano. El resultado al que se llega en este artículo es que el anti-thickness de la doble cadena convexa con k puntos en la cadena convexa superior y $l \geq k$ puntos en la cadena convexa inferior es:

$$k + l - \left\lfloor \sqrt{2l + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Como es mencionado en [3], encontrar el anti-thickness de gráficas completas en posición general es un problema abierto y la mejor cota superior conocida es $n - \left\lfloor \sqrt{2n + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right\rfloor$ la cual se sigue del caso convexo y la mejor cota inferior conocida es solamente $\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ que se sigue del hecho de que una gráfica de n vértices con anti-thickness geométrico k tiene a lo más kn aristas.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Descomposiciones por thrackles máximos.

Inspirado en el método usado por [5] para posición convexa decidimos buscar para $n \leq 10$ descomposiciones de K_n en la que los thrackles sean todos máximos y se alcance el anti-thickness establecido por el tipo de orden en posición convexa. Para esto buscamos para cada tipo de orden de cada $n \leq 10$ todos los thrackles máximos y evaluamos cada combinación de tamaño k_n con k_n el anti-thickness convexo para conjuntos de tamaño n . Encontramos que sí existen tipos de orden que no corresponden al de posición convexa que también alcanzan el anti-thickness convexo. Los resultados se muestran en la tabla 4.1.

Para los casos de $n \in [3, 7]$ no existen tipos de orden que puedan ser descompuestos de esta manera. Los resultados fueron obtenidos con un algoritmo que primero evalúa cuáles son los tipos de orden que podrían tener una descomposición por thrackles máximos; se seleccionan aquellos que tengan suficientes thrackles máximos para cubrir todas las aristas de la gráfica completa, en otras palabras que la unión de los thrackles máximos en determinado tipo de orden cubran las $\binom{n}{2}$ aristas.

El algoritmo fue ejecutado en el cluster, para $n = 8$ el resultado es obtenido en menos de un segundo mientras que para $n = 9$ y $n = 10$ se necesitaron al rededor de 1 día y 6 días respectivamente. Las descomposiciones encontradas pueden verse con más detalle en el apéndice XXXXX.

También se calculó, para las descomposiciones obtenidas mediante este método, el número de cruce de cada uno de los thrackles de la descomposición.

n	Tipo de Orden	k_n
8	12	5
8	54	5
9	12	6
9	52	6
9	54	6
9	80	6
9	696	6
9	1080	6
9	1287	6
10	81	6
10	1328	6
10	2243	6

Tabla 4.1: Tipos de orden para los que existe al menos una descomposición en thrackles máximos de tamaño igual al anti-thickness del tipo de orden convexo.

Se observa que en la mayoría de los casos la mitad de los thrackles de las descomposiciones tienen el número de cruce mínimo para n vértices y la otra mitad es más cercano al mayor número de cruce para n vértices.

4.2. El anti-thickness geométrico de K_n con $n \in [3, 9]$ es igual al anti-thickness convexo

Dado que la cota superior está dada por el anti-thickness convexo decidimos tratar de ajustar la cota inferior ya que creemos que el anti-thickness geométrico es igual al anti-thickness convexo. Un enfoque para ajustar la cota inferior es obtener el anti-thickness de cada dibujo de K_n , esto es, obtener el anti-thickness de cada tipo de orden para K_n y seleccionar el menor de todos. Sin embargo, el algoritmo exhaustivo para encontrar el anti-thickness tarda al rededor de 7 horas para un solo tipo de orden cuando $n = 8$, si para $n = 8$ hay 3315 tipos de orden requeriríamos cerca de 960 días para acabar dicha tarea.

Por esta razón decidimos analizar la estructura de las posibles descom-

4.2. EL ANTI-THICKNESS GEOMÉTRICO DE K_N CON $N \in [3, 9]$ ES IGUAL AL ANTI-THICKNESS

posiciones; como K_n tiene $\binom{n}{2}$ aristas y los thrackles de la descomposición deben cubrir las todas podemos buscar particiones de enteros de la forma $a_1 + a_2 + \dots + a_k = \binom{n}{2}$.

A manera de ejemplo, mostraremos como se ajusta la cota inferior del anti-thickness geométrico para K_5 . En K_5 existen 10 aristas. Las siguientes son particiones del entero 10:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1	5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1	3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1
3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1	2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1
6 + 1 + 1 + 1 + 1	5 + 2 + 1 + 1 + 1
4 + 3 + 1 + 1 + 1	4 + 2 + 2 + 1 + 1
3 + 3 + 2 + 1 + 1	3 + 2 + 2 + 2 + 1
2 + 2 + 2 + 2 + 2	7 + 1 + 1 + 1
6 + 2 + 1 + 1	5 + 3 + 1 + 1
5 + 2 + 2 + 1	4 + 4 + 1 + 1
4 + 3 + 2 + 1	4 + 2 + 2 + 2
3 + 3 + 3 + 1	3 + 3 + 2 + 2
8 + 1 + 1	7 + 2 + 1
6 + 3 + 1	6 + 2 + 2
5 + 4 + 1	5 + 3 + 2
4 + 4 + 2	4 + 3 + 3
9 + 1	8 + 2
7 + 3	6 + 4
5 + 5	

Ahora bien, algunas de estas particiones pueden ser usadas como guía para encontrar una descomposición en thrackles para K_5 . Si tomamos, por ejemplo, la partición $5 + 4 + 1$ estaríamos buscando una descomposición por 3 thrackles: uno de tamaño 5, uno de tamaño 4 y otro de tamaño 1. Es importante notar que como las particiones de un entero k suman exactamente k , los thrackles de la descomposición tienen que ser disjuntos en aristas cuando los tamaños corresponden a los enteros de la partición de k . La partición $5 + 4 + 1$ podría ser posible de encontrar, sin embargo, podemos deshacernos de ciertas particiones que estamos seguros jamás encontraremos como son aquellas particiones que tienen un entero mayor a 5 puesto que para un

conjunto de 5 vértices el thrackle geométrico más grande tiene 5 aristas, esto también se cumple para todo n . Desaparecerían entonces particiones como $7 + 2 + 1$ o $9 + 1$ por mencionar algunas.

Nuestro conjunto de particiones posibles se ve ahora de la siguiente manera:

$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
$3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
$4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
$2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1$	$5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
$4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1$	$3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1$
$3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1$	$2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1$
$5 + 2 + 1 + 1 + 1$	$4 + 3 + 1 + 1 + 1$
$4 + 2 + 2 + 1 + 1$	$3 + 3 + 2 + 1 + 1$
$3 + 2 + 2 + 2 + 1$	$2 + 2 + 2 + 2 + 2$
$5 + 3 + 1 + 1$	$5 + 2 + 2 + 1$
$4 + 3 + 2 + 1$	$4 + 4 + 1 + 1$
$3 + 3 + 3 + 1$	$4 + 2 + 2 + 2$
$5 + 4 + 1$	$3 + 3 + 2 + 2$
$4 + 4 + 2$	$5 + 3 + 2$
$5 + 5$	$4 + 3 + 3$

Sin embargo, como buscamos ajustar la cota inferior del anti-thickness no nos interesa encontrar descomposiciones cuyo tamaño sea mayor a la cota superior del anti-thickness dada por $n - \lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor$, en el caso de $n = 5$, evitaremos buscar descomposiciones con un tamaño mayor a 3. Dejando así las siguientes particiones disponibles:

$$\begin{array}{l} 5 + 4 + 1 \quad 4 + 4 + 2 \\ 4 + 3 + 3 \quad 5 + 3 + 2 \\ 5 + 5 \end{array}$$

Finalmente, vamos a remover las particiones cuyo tamaño sea igual al anti-thickness convexo de K_5 , esto porque sabemos que en efecto la posición convexa otorga descomposiciones de ese tamaño. Esto nos deja con una única partición posible :

$$5 + 5$$

Esto significa que debemos averiguar si existe una descomposición de K_5 por dos thrackles de tamaño 5, en este caso dos thrackles máximos. No obstante,

4.2. EL ANTI-THICKNESS GEOMÉTRICO DE K_N CON $N \in [3, 9]$ ES IGUAL AL ANTI-THICKNESS

al buscar las thrackles máximos para todos los tipos de orden de K_5 encontramos que no existen dos thrackles máximos que sean disjuntos en aristas, por esto no es posible dar una descomposición de K_5 en dos thrackles máximos. Y luego, el anti-thickness de K_5 es mayor a 2. Como la cota superior del anti-thickness de K_5 es 3 podemos decir que el anti-thickness geométrico de K_5 es exactamente 3.

De esta manera podemos acotar el anti-thickness geométrico de K_n : examinar particiones del entero $\binom{n}{2}$ con las siguientes condiciones:

- La longitud de la partición es menor que el anti-thickness convexo de K_n .
- Solo existe una ocurrencia del entero n en la partición.

Siguiendo las condiciones anteriores buscamos las particiones válidas para K_n con $n \in [3, 9]$. Encontramos que para $n \in [3, 7]$ no existen particiones que cumplan las condiciones, por lo que podemos decir que el anti-thickness geométrico de K_n para $n \in [3, 7]$ es igual al anti-thickness convexo.

Para K_8 encontramos las siguientes particiones válidas:

$$8 + 7 + 7 + 6 \quad 7 + 7 + 7 + 7$$

No fue posible encontrar una descomposición en thrackles usando alguna de estas particiones, por lo que podemos decir que K_8 tiene anti-thickness geométrico mayor a 4 y luego el anti-thickness geométrico de K_8 es exactamente 5.

Por otro lado para ajustar la cota inferior del anti-thickness de K_9 , tenemos las siguientes particiones válidas:

$$\begin{array}{ll} 9 + 8 + 8 + 8 + 3 & 9 + 8 + 8 + 7 + 4 \\ 9 + 8 + 8 + 6 + 5 & 9 + 8 + 7 + 7 + 5 \\ 9 + 8 + 7 + 6 + 6 & 9 + 7 + 7 + 7 + 6 \\ 8 + 8 + 8 + 8 + 4 & 8 + 8 + 8 + 7 + 5 \\ 8 + 8 + 8 + 6 + 6 & 8 + 8 + 7 + 7 + 6 \\ 8 + 7 + 7 + 7 + 7 & \end{array}$$

Para cada una de las particiones se diseñó un algoritmo que evalúa todos los thrackles de tamaño 9, 8, 7 y 6. Los resultados fueron los siguientes:

- $9 + 8 + 8 + 8 + 3$ - Probado con $9+8+8$.

- $9 + 8 + 8 + 7 + 4$ - Probado con $9+8+8$.
- $9 + 8 + 8 + 6 + 5$ - Probado con $9+8+8$. 150000ms
- $9 + 8 + 7 + 7 + 5$ - Probado con $9+8+7+6+6$
- $9 + 8 + 7 + 6 + 6$ - Probado con $9+8+7+6+6$. 981709 ms.
- $9 + 7 + 7 + 7 + 6$ - Probado con $9+7+7+7+6$. 2.11354e+06 ms.
- $8 + 8 + 8 + 8 + 4$ - Probado con $8+8+8+8$. 300888 ms.
- $8 + 8 + 8 + 7 + 5$ - Probado con $8+8+8+6+6$.
- $8 + 8 + 8 + 6 + 6$ - Probado con $8+8+8+6+6$. 569735 ms.
- $8 + 8 + 7 + 7 + 6$ - Probado con $8+8+7+7+6$. 6.39485e+06 - 1 Hora, 46 minutos.
- $8 + 7 + 7 + 7 + 7$ - Probado con $8+7+7+7+7$. 1.23716e+08 - 34 Horas, 21 minutos.

En la mayoría de los casos no fue necesario examinar toda la partición, por ejemplo para la partición $9 + 8 + 8 + 8 + 3$, encontramos que no hay 3 thrackles, para ningún tipo de orden diferente del convexo, donde uno sea de tamaño 9 y los otros dos de tamaño 8 que sean disjuntos en aristas y por esta razón no es necesario seguir examinando la partición a fondo.

Como para ninguna partición fue posible encontrar una descomposición en thrackles podemos decir que el anti-thickness geométrico de K_9 es mayor a 5. Y como la cota superior del anti-thickness geométrico es 6 decimos que el anti-thickness de K_9 es exactamente 6.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Bibliografía

- [1] Gabriela Araujo, Adrian Dumitrescu, Ferran Hurtado, Marc Noy, and Jorge Urrutia. On the chromatic number of some geometric type kneser graphs. *Comput. Geom.*, 32(1):59–69, 2005.
- [2] Michael B Dillencourt, David Eppstein, and Daniel S Hirschberg. Geometric thickness of complete graphs. In *Graph Algorithms And Applications 2*, pages 39–51. World Scientific, 2004.
- [3] Vida Dujmovic and David R. Wood. Thickness and antithickness of graphs. *CoRR*, abs/1708.04773, 2017.
- [4] Ruy Fabila-Monroy, Carlos Hidalgo-Toscano, Jesús Leños, and Mario Lomelí-Haro. The chromatic number of the disjointness graph of the double chain. *arXiv preprint arXiv:1711.05425*, 2017.
- [5] Ruy Fabila-Monroy, Jakob Jonsson, Pavel Valtr, and David R Wood. The exact chromatic number of the convex segment disjointness graph. *arXiv preprint arXiv:1804.01057*, 2018.