labor dr. hamwi

Wachreinergasse 8, 4021 Linz
Tel.: 0732 / 66 28 98
E-Mail: vwz@lablinz.eu

www.labor-hamwi.at
QM System ISO 9001

Alle Kassen · Hausbesuche · Keine Voranmeldung

Endbefund

[redacted]

Geburtsdatum: [redacted]
Geschlecht:

Patienten-ID:
Auftragsnummer:
Kasse / SV-Nr.:
Auftragseingang:
Abschluss: 28.08.2024 12:34

Arzt: **Dr.med. Selma AYDIN**

Analyt	Resultat	Einheit	Normalwert	Grafik
BLUTBILD				
RBC - Erythrocyten	4.59	T/l	(3.80 - 5.20)	✓
HGB - Hämoglobin	12.1	g/dl	(12.0 - 16.0)	✓
HCT - Hämatokrit	36.7	%	(35.0 - 47.0)	✓
MCV	80.0	fl	(80.0 - 101.0)	✓
MCH - HbE	**26.4**	pg	(27.0 - 35.0)	↙
MCHC- HGB/HCT	33.0	g/dl	(29.0 - 36.0)	✓
Morphologie:	Geringe Anisocytose und Hypochromie			
GLUCOSE-STOFFWECHSEL				
Glucose/Serum nüchtern	75	mg/dl	(60 - 100)	✓
ENZYME IM SERUM (LEBER)				
Gamma-GT	10	U/l	(0 - 38)	✓
LIPID-STOFFWECHSEL				
Cholesterin - gesamt	159	mg/dl	(100 - 200)	✓
Im Idealfall, bei koronar Gesunden ohne Risikofaktoren mit negativer Familienanamnese, kann man einen Gesamt-Cholesterinwert von 240 tolerieren. Bei koronargesunden Patienten mit Diabetes, Hochdruck, niedrigem HDL oder einer entsprechenden genetischen Disposition gilt für Cholesterin der Maximalwert von 200.				
HDL-Cholesterin	64	mg/dl	(> 55)	✓
Quotient Cholesterin/HDL	2.5		(0.0 - 4.0)	✓
CAVE: Änderung des Referenzbereiches ab 13.10.2026.				
Triglyceride	50	mg/dl	(25 - 180)	✓

Analyt	Resultat	Einheit	Normalwert	Grafik
LDL-Cholesterin berechnet	85	mg/dl		

Ab 01.09.2025 verwenden wir zur Berechnung statt der Friedewald-Formel eine verbesserte Sampson-Formel (https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaf073).

Zielwerte laut Empfehlung der ÖGLMKC für LDL-Cholesterin in mg/dl:
Wenn kardiovaskuläres Risiko...
...niedrig: <116
...mäßig erhöht: <100
...hoch: <70
...sehr hoch: <55

EISENSTOFFWECHSEL

Eisen/S	17.5	µmol/l	(10.7 - 28.6)	✓
EBK-Transferrin	**74.5**	µmol/l	(46.0 - 72.0)	↗
Ferritin	15	ng/ml	(15 - 150)	✓

NIERENFUNKTIONSPARAMETER

BUN/S - Harnstoff-N/S	**6.0**	mg/dl	(7.0 - 23.0)	↙
Creatinin/S	0.47	mg/dl	(0.47 - 0.95)	✓
errechnete GFR (CKD-EPI)	141.3	ml/min/1.73m²		

Referenzbereich: >89.9
CAVE: per 1.2.2020 Umstellung Berechnungsformel und Referenzbereich nach CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Levey A S et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009;150(9): 604-612.
Grad 1 GFR >=90: normale oder erhöhte GFR
Grad 2 GFR 60-89.9: Nierenschädigung mit geringgradiger Einschränkung der GFR
Grad 3 GFR 30-59.9: Nierenschädigung mit mittelschwerer Einschränkung der GFR
Grad 4 GFR 15-29.9: Nierenschädigung mit schwerer Einschränkung der GFR
Grad 5 GFR <15: Nierenversagen
Zusatzinformation: Die Berechnung ist für Patienten ab dem 18. Lebensjahr durchführbar, da die angeführte Studie Patienten ab diesem Alter untersucht hat. Da der Wert der GFR nach CKD-EPI u.a. vom Alter und Geschlecht des Patienten abhängt, aber kein definitiver Referenzbereich für ein spezifisches Lebensalter definiert wurde, sind klinische Symptome, Lebensalter und Geschlecht bei der Zuteilung des Grades insbes. bei Grad 1 und 2 zu berücksichtigen.
Bei schwarzer Hautfarbe ist das Resultat mit 1.159 zu multiplizieren.

UNTERSUCHUNGEN IM HARN

HARNSTATUS (Streifentest)

Glucose/U	negativ	mg/dl	(0 - 29)	
Blut/U	negativ			
Protein/U	negativ	mg/dl	(0 - 14)	
Urobilinogen/U	0.2	mg/dl	(0.0 - 1.9)	✓
Nitrit/U	negativ			
Leucocyten/U	< 25	/µl	(< 25)	

HARNSEDIMENT (mikroskopisch)

Beurteilung:	o.B.

(Die angegebenen Normbereiche sind alters- und geschlechtsspezifisch.)

(Univ.Doz.Dr. A. Hamwi)