labor dr. hamwi

Wachreinergasse 8, 4021 Linz
Tel.: 0732 / 66 28 98
E-Mail: vwz@lablinz.eu

www.labor-hamwi.at
QM System ISO 9001

Alle Kassen · Hausbesuche · Keine Voranmeldung

Endbefund

[redacted]

Geburtsdatum: [redacted]
Geschlecht:

Patienten-ID:
Auftragsnummer:
Kasse / SV-Nr.:
Auftragseingang:
Abschluss: 03.11.2022 11:44

Arzt: **Dr.med. Selma AYDIN**

Analyt	Resultat	Einheit	Normalwert	Grafik
BLUTBILD				
RBC - Erythrocyten	4.55	T/l	(3.80 - 5.20)	✓
HGB - Hämoglobin	12.2	g/dl	(12.0 - 16.0)	✓
HCT - Hämatokrit	37.1	%	(35.0 - 47.0)	✓
MCV	81.5	fl	(80.0 - 101.0)	✓
MCH - HbE	**26.8**	pg	(27.0 - 35.0)	↙
MCHC- HGB/HCT	32.9	g/dl	(29.0 - 36.0)	✓
Morphologie:	Geringe Anisocytose und Hypochromie			
GLUCOSE-STOFFWECHSEL				
Glucose/Serum nüchtern	94	mg/dl	(60 - 100)	✓
ENZYME IM SERUM (LEBER)				
Gamma-GT	13	U/l	(0 - 38)	✓
LIPID-STOFFWECHSEL				
Cholesterin - gesamt	179	mg/dl	(100 - 200)	✓

Im Idealfall, bei koronar Gesunden ohne Risikofaktoren mit negativer Familienanamnese, kann man einen Gesamt-Cholesterinwert von 240 tolerieren. Bei koronargesunden Patienten mit Diabetes, Hochdruck, niedrigem HDL oder einer entsprechenden genetischen Disposition gilt für Cholesterin der Maximalwert von 200.

HDL-Cholesterin	60	mg/dl	(> 55)	✓
Quotient Cholesterin/HDL	3.0		(0.0 - 4.0)	✓

CAVE: Änderung des Referenzbereiches ab 13.10.2026.

Triglyceride	74	mg/dl	(25 - 180)	✓
LDL-Cholesterin	104	mg/dl		

Zielwerte für LDL-Cholesterin:
wenn KHK Risiko gering: Zielwert <160 mg/dl
wenn KHK Risiko mäßig: Zielwert <130 mg/dl
wenn KHK Risiko hoch: Zielwert <100 mg/dl
wenn KHK Risiko sehr hoch: Zielwert < 70 mg/dl

Analyt	Resultat	Einheit	Normalwert	Grafik
NIERENFUNKTIONSPARAMETER				
BUN/S - Harnstoff-N/S	**6.0**	mg/dl	(7.0 - 23.0)	↙
Creatinin/S	0.54	mg/dl	(0.47 - 0.95)	✓
errechnete GFR (CKD-EPI)	136.8	ml/min/1.73m²	(> 89.9)	✓

CAVE: per 1.2.2020 Umstellung Berechnungsformel und Referenzbereich nach CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Levey A S et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009;150(9): 604-612.
Grad 1 GFR >=90: normale oder erhöhte GFR
Grad 2 GFR 60-89.9: Nierenschädigung mit geringgradiger Einschränkung der GFR
Grad 3 GFR 30-59.9: Nierenschädigung mit mittelschwerer Einschränkung der GFR
Grad 4 GFR 15-29.9: Nierenschädigung mit schwerer Einschränkung der GFR
Grad 5 GFR <15: Nierenversagen
Zusatzinformation: Die Berechnung ist für Patienten ab dem 18. Lebensjahr durchführbar, da die angeführte Studie Patienten ab diesem Alter untersucht hat. Da der Wert der GFR nach CKD-EPI u.a. vom Alter und Geschlecht des Patienten abhängt, aber kein definitiver Referenzbereich für ein spezifisches Lebensalter definiert wurde, sind klinische Symptome, Lebensalter und Geschlecht bei der Zuteilung des Grades insbes. bei Grad 1 und 2 zu berücksichtigen.
Bei schwarzer Hautfarbe ist das Resultat mit 1.159 zu multiplizieren.

SCHILDDRÜSE-DIAGNOSTIK				
TSH basal	2.04	µU/ml	(0.47 - 3.50)	✓
UNTERSUCHUNGEN IM HARN				
HARNSTATUS (Streifentest)				
Glucose/U	negativ	mg/dl	(0 - 29)	
Blut/U	**positiv** + + +			↑
Protein/U	negativ	mg/dl	(0 - 14)	
Urobilinogen/U	0.2	mg/dl	(0.0 - 1.9)	✓
Nitrit/U	negativ			
Leucocyten/U	**25**	/µl	(< 25)	↗

HARNSEDIMENT (mikroskopisch)

Beurteilung:
spärlich Bakterien (Kokken)
mäßig Bakterien (Stäbchen)
ganz vereinzelt Erythrozyten
spärlich Leukozyten
spärlich Plattenepithelien

(Die angegebenen Normbereiche sind alters- und geschlechtsspezifisch.)

(Univ.Doz.Dr. A. Hamwi)