

# Física Estadística

## Tarea 5

Sergio Montoya Ramirez  
202112171

19 de mayo de 2025

# Índice general

## Chapter 1

Page 2

1.1	2
1.2	5
1.3	5
1.4	7
1.5	8
1.6	8
1.7	9

## Chapter 2

Page 10

2.1	10
2.2	11
2.3	11
2.4	11

## Chapter 3

Page 12

3.1	12
3.2	12
3.3	12

## Chapter 4

Page 13

4.1	13
4.2	14
4.3	14
4.4	15
4.5	16
4.6	16
4.7	17

# Capítulo 1

## 1.1.

En las secciones 6.1 y 6.2 del libro Pathria se llega a

$$\frac{PV}{kT} = \sum_{\varepsilon} \ln(1 + ze^{-\beta\varepsilon}) \quad (1.1)$$

$$N = \sum_{\varepsilon} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} \quad (1.2)$$

Sin embargo

$$\sum_{\varepsilon} \rightarrow \int_0^{\infty} g(\varepsilon) d\varepsilon$$

donde

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{Vg\sqrt{\varepsilon}}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} d\varepsilon,$$

Además usaremos:

$$f_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^{\infty} \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x + 1}$$

por lo tanto aplicando en 1.1 y 1.2 tenemos

1. Para 1.1

$$\begin{aligned} \frac{PV}{kT} &= \sum_{\varepsilon} \ln(1 + ze^{-\beta\varepsilon}) \\ \frac{PV}{kT} &= \int_0^{\infty} \ln(1 + ze^{-\beta\varepsilon}) \frac{Vg\sqrt{\varepsilon}}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} d\varepsilon \\ \frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \ln(1 + ze^{-\beta\varepsilon}) \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \\ x &= \beta\varepsilon \\ \varepsilon &= kTx \\ d\varepsilon &= kTdx \\ \frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \ln(1 + ze^{-x}) \sqrt{kTx} kT dx \\ \frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} (kT)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} \ln(1 + ze^{-x}) \sqrt{x} dx \end{aligned}$$

Ahora para solucionar la integral podemos hacerla por partes de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
u &= \ln(1 + ze^{-x}) \\
du &= \frac{-ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} dx \\
dv &= \sqrt{x} dx \\
v &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \\
\int u dv &= uv - \int v du \\
\int_0^\infty \ln(1 + ze^{-x}) \sqrt{x} dx &= \left[ \ln(1 + ze^{-x}) \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \frac{-ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} dx \\
&= \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{x^{\frac{3}{2}} ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} dx \\
&= \frac{2}{3} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) &= \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \\
&= \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z)
\end{aligned}$$

Con esto entonces

$$\begin{aligned}
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2 \hbar^3} (2m)^{3/2} (kT)^{\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2 \hbar^3} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{2\pi^2 \frac{\hbar^3}{8\pi^3}} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{\frac{\hbar^3}{2\pi}} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{PV}{kT} &= 2\pi \frac{Vg}{\hbar^3} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{\hbar^3} (2\pi mkT)^{3/2} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\lambda &= \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}} \\
\lambda^3 &= \frac{h^3}{(2\pi mkT)^{\frac{3}{2}}} \\
\frac{1}{\lambda^3} &= \frac{(2\pi mkT)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \\
\frac{PV}{kT} &= \frac{Vg}{\lambda^3} f_{\frac{5}{2}}(z) \\
\frac{P}{kT} &= \frac{g}{\lambda^3} f_{\frac{5}{2}}(z)
\end{aligned}$$

2. Para 1.2

$$\begin{aligned}
N &= \sum_{\varepsilon} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} \\
&= \int_0^{\infty} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} g(\varepsilon) d\varepsilon \\
&= \int_0^{\infty} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} \frac{Vg\sqrt{\varepsilon}}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} d\varepsilon \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{1/2}}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} d\varepsilon \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{1/2}}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} d\varepsilon
\end{aligned}$$

$$x = \beta\varepsilon$$

$$kTx = \varepsilon$$

$$d\varepsilon = kTdx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{(kTx)^{1/2}}{z^{-1}e^x + 1} kTdx \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2mkT)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{(x)^{1/2}}{z^{-1}e^x + 1} dx \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2mkT)^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) f_{\frac{3}{2}}(z) \\
&= \frac{Vg}{2\pi^2\hbar^3} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
&= \frac{Vg}{\frac{h^3}{2\pi}} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
&= 2\pi \frac{Vg}{h^3} (2mkT)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
&= \frac{Vg}{h^3} (2\pi mkT)^{3/2} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
&= \frac{Vg}{\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
N &= \frac{Vg}{\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}(z) \\
\frac{N}{V} &= \frac{g}{\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}(z)
\end{aligned}$$

## 1.2.

Tenemos

$$U = kT^2 \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{PV}{kT} \right)$$

$$U = kT^2 \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{Vg}{\lambda^3} f_{\frac{5}{2}}(z) \right)$$

$$U = kT^2 V g \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{1}{\lambda^3} f_{\frac{5}{2}}(z) \right)$$

$$U = kT^2 V g \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{1}{\lambda^3} f_{\frac{5}{2}}(z) + \frac{1}{\lambda^3} \frac{\partial}{\partial T} f_{\frac{5}{2}}(z) \right)$$

$$U = kT^2 V g \left( \frac{3}{2\lambda^3 T} f_{\frac{5}{2}}(z) + \frac{1}{\lambda^3} 0 \right)$$

$$U = kT^2 V g \frac{3}{2\lambda^3 T} f_{\frac{5}{2}}(z)$$

$$U = \frac{3kT^2 V g}{2\lambda^3 T} f_{\frac{5}{2}}(z)$$

$$\frac{N}{V} = \frac{g}{\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}(z)$$

$$\frac{N}{f_{\frac{3}{2}}(z)} = \frac{gV}{\lambda^3}$$

$$U = \frac{3kTN}{2f_{\frac{3}{2}}(z)} f_{\frac{5}{2}}(z)$$

$$U = \frac{3}{2} kTN \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)}$$

## 1.3.

Para esto usaremos

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Con lo cual:

$$\begin{aligned}
U &= \frac{3}{2} kTN \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \\
C_V &= \left( \frac{\partial}{\partial T} \frac{3}{2} kTN \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{\partial}{\partial T} T \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + T \frac{\partial}{\partial T} \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + T \frac{f_{\frac{3}{2}}(z) \frac{\partial f_{\frac{5}{2}}(z)}{\partial T} - f_{\frac{5}{2}}(z) \frac{\partial f_{\frac{3}{2}}(z)}{\partial T}}{\left[ f_{\frac{3}{2}}(z) \right]^2} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + T \frac{f_{\frac{3}{2}}(z) \frac{\partial f_{\frac{5}{2}}(z)}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial T} - f_{\frac{5}{2}}(z) \frac{\partial f_{\frac{3}{2}}(z)}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial T}}{\left[ f_{\frac{3}{2}}(z) \right]^2} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + T \frac{f_{\frac{3}{2}}(z) \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)}{z} \frac{\partial z}{\partial T} - f_{\frac{5}{2}}(z) \frac{f_{\frac{1}{2}}(z)}{z} \frac{\partial z}{\partial T}}{\left[ f_{\frac{3}{2}}(z) \right]^2} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + \frac{T}{z} \frac{\partial z}{\partial T} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)^2 - f_{\frac{5}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)}{\left[ f_{\frac{3}{2}}(z) \right]^2} \right)_V \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} + \frac{T}{z} \left( -\frac{3}{2} \frac{z}{T} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)}{f_{\frac{1}{2}}(z)} \right) \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)^2 - f_{\frac{5}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)}{\left[ f_{\frac{3}{2}}(z) \right]^2} \right) \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{3}{2} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)^2 - f_{\frac{5}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)} \right) \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{3}{2} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)^2}{f_{\frac{3}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)} + \frac{3}{2} \frac{f_{\frac{5}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z) f_{\frac{1}{2}}(z)} \right) \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{3 f_{\frac{3}{2}}(z)}{2 f_{\frac{1}{2}}(z)} + \frac{3 f_{\frac{5}{2}}(z)}{2 f_{\frac{3}{2}}(z)} \right) \\
C_V &= \frac{3}{2} Nk \left( \frac{5 f_{\frac{5}{2}}(z)}{2 f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{3 f_{\frac{3}{2}}(z)}{2 f_{\frac{1}{2}}(z)} \right) \\
C_V &= Nk \frac{3}{2} \left( \frac{5 f_{\frac{5}{2}}(z)}{2 f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{3 f_{\frac{3}{2}}(z)}{2 f_{\frac{1}{2}}(z)} \right) \\
C_V &= Nk \left( \frac{15}{4} \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{9}{4} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)}{f_{\frac{1}{2}}(z)} \right)
\end{aligned}$$

## 1.4.

En el Apendice E del libro de Pathria explican que para  $z$  pequeños se cumple que:

$$f_v(z) = z - \frac{z^2}{2^v} + \frac{z^3}{3^v} - \dots$$

Nos piden encontrar esta serie en terminos de  $n\lambda^3$  por lo tanto partamos de la expresión para  $n = \frac{N}{V}$  con lo cual:

$$\begin{aligned} n &= \frac{g}{\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}(z) \\ n &= \frac{g}{\lambda^3} \left( z - \frac{z^2}{2^{\frac{3}{2}}} + \frac{z^3}{3^{\frac{3}{2}}} - \dots \right) \\ \frac{n\lambda^3}{g} &= \left( z - \frac{z^2}{2^{\frac{3}{2}}} + \frac{z^3}{3^{\frac{3}{2}}} - \dots \right) \\ z &\approx \frac{n\lambda^3}{g} + \frac{(n\lambda^3)^2}{2\sqrt{2}g^2} \end{aligned}$$

Ademas de eso veamos las equivalencias de las funciones:

$$\begin{aligned} f_{\frac{5}{2}}(z) &\approx z - \frac{z^2}{2^{\frac{5}{2}}} + \dots = z - \frac{z^2}{4\sqrt{2}} + \dots, \\ f_{\frac{3}{2}}(z) &\approx z - \frac{z^2}{2^{\frac{3}{2}}} + \dots = z - \frac{z^2}{2\sqrt{2}} + \dots, \\ f_{\frac{1}{2}}(z) &\approx z - \frac{z^2}{2^{\frac{1}{2}}} + \dots = z - \frac{z^2}{\sqrt{2}} + \dots. \end{aligned}$$

Ahora tomando en cuenta que

$$C_V = Nk \left( \frac{15}{4} \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{9}{4} \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)}{f_{\frac{1}{2}}(z)} \right).$$

Podemos desarrollar cada una de las fracciones por aparte como

$$\begin{aligned} \frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} &\approx \frac{z - \frac{z^2}{4\sqrt{2}}}{z - \frac{z^2}{2\sqrt{2}}} \approx 1 + \frac{z}{4\sqrt{2}}, \\ \frac{f_{\frac{3}{2}}(z)}{f_{\frac{1}{2}}(z)} &\approx \frac{z - \frac{z^2}{2\sqrt{2}}}{z - \frac{z^2}{\sqrt{2}}} \approx 1 + \frac{z}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Lo que nos dejaria con un desarrollo como

$$\begin{aligned} C_V &\approx Nk \left( \frac{15}{4} \left( 1 + \frac{z}{4\sqrt{2}} \right) - \frac{9}{4} \left( 1 + \frac{z}{2\sqrt{2}} \right) \right) \\ C_V &= Nk \left( \frac{15}{4} - \frac{9}{4} + \frac{15}{16\sqrt{2}}z - \frac{9}{8\sqrt{2}}z \right) \\ &= Nk \left( \frac{3}{2} - \frac{3}{16\sqrt{2}}z \right) \\ C_V &= \frac{3}{2}Nk - \frac{3}{16\sqrt{2}} \frac{n\lambda^3}{g} Nk + \dots \end{aligned}$$



note que siempre que si  $n\lambda^3 > 0$  entonces

$$\frac{3}{16\sqrt{2}} \frac{n\lambda^3}{g} Nk > 0$$

por lo tanto dado que esto es positivo el termino total seria menor. Es decir:

$$C_V = \frac{3}{2}Nk - \frac{3}{16\sqrt{2}} \frac{n\lambda^3}{g} Nk < \frac{3}{2}Nk$$

$$C_V < \frac{3}{2}Nk$$

## 1.5.

En este caso usaremos

$$f_{3/2}(z) \approx \frac{2}{3\sqrt{\pi}} \mu^{3/2} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{kT}{\mu} \right)^2 + \dots \right].$$

Con lo cual podemos revisar para  $\frac{N}{V}$

$$n = \frac{g}{\lambda^3} f_{3/2}(z)$$

$$n \approx \frac{g}{\lambda^3} \frac{2}{3\sqrt{\pi}} \mu^{3/2} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]$$

$$n = \frac{g}{6\pi^2} \left( \frac{2mE_F}{\hbar^2} \right)^{3/2}$$

Ahora igualando las expresiones para  $n$

$$1 \approx \left( \frac{\mu}{E_F} \right)^{3/2} + \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2 \left( \frac{E_F}{\mu} \right)^{1/2}$$

$$\mu = E_F(1 + \delta)$$

$$1 \approx 1 + \frac{3}{2}\delta + \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2$$

$$\delta \approx -\frac{\pi^2}{12} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2$$

$$\mu(T) = E_F \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

## 1.6.

Partimos desde la definici3n:

$$U = \frac{3}{2}NkT \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)}$$

Utilizando la expansión:

$$f_v(z) \approx \frac{(\ln z)^v}{\Gamma(v+1)} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{v(v-1)}{(\ln z)^2} + \dots \right]$$

Con esto entonces podemos encontra

$$f_{\frac{5}{2}}(z) \approx \frac{(\ln z)^{\frac{5}{2}}}{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}}{(\ln z)^2} \right]$$

$$f_{\frac{3}{2}}(z) \approx \frac{(\ln z)^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}}{(\ln z)^2} \right]$$

Con esto entonces podemos encontrar cada una de las fracciones de  $U$ . Queda:

$$\frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \approx \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)} (\ln z) \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} \frac{1}{(\ln z)^2} \right]$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

$$\frac{f_{\frac{5}{2}}(z)}{f_{\frac{3}{2}}(z)} \approx \frac{2}{5} (\ln z) \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} \frac{1}{(\ln z)^2} \right].$$

Con el resultado de la sección anterior tenemos

$$\ln z = \frac{\mu(T)}{kT} = \frac{E_F}{kT} \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

$$U \approx \frac{3}{2} NkT \cdot \frac{2}{5} \frac{E_F}{kT} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} \left( \frac{kT}{E_F} \right)^2 \right]$$

$$U \approx \frac{3}{5} NE_F + \frac{3\pi^2}{20} Nk^2 \frac{T^2}{E_F}$$

Ahora dado que  $C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$  lo que nos quedaria como:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{3\pi^2}{10} Nk^2 \frac{T}{E_F}$$

$$E_F = kT_F$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{3\pi^2}{10} Nk^2 \frac{T}{kT_F}$$

$$C_V = Nk \left\{ \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} + o\left(\frac{T}{T_F}\right) \right\}$$

## 1.7.

## Capítulo 2

### 2.1.

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r}) &= \psi(x, y) \\ &= e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \\ &= e^{i(k_x x + k_y y)} \\ k_x &= \frac{2\pi}{L} n_x \\ k_y &= \frac{2\pi}{L} n_y \\ \Delta k_x \Delta k_y &= \left( \frac{2\pi}{L} (n_x + 1) - \frac{2\pi}{L} n_x \right) \left( \frac{2\pi}{L} (n_y + 1) - \frac{2\pi}{L} n_y \right) \\ &= \frac{2\pi}{L} \frac{2\pi}{L} \\ &= \left( \frac{2\pi}{L} \right)^2 \\ &= \frac{(2\pi)^2}{A} \\ &= \text{Area por Estado}\end{aligned}$$

Esto viene de cumplirse:

$$\psi(x + L, y) = \psi(x, y) \implies e^{ik_x L} = 1 \quad (2.1)$$

$$\implies k_x = \frac{2\pi}{L} n_x \quad (2.2)$$

Ahora para mostrar 2.2 podemos tomar:

$$\begin{aligned}e^{ik_x L} &= 1 \\ e^{ik_x L} &= e^{i2\pi n_x} \\ ik_x L &= i2\pi n_x \\ k_x &= \frac{2\pi}{L} n_x\end{aligned}$$

Ahora para mostrar 2.1

$$\begin{aligned}
 \psi(x+L, y) &= e^{i(k_x(x+L)+k_y y)} \\
 &= e^{i(k_x(x+L)+k_y y)} \\
 &= e^{ik_x L} e^{i(k_x x + k_y y)} \\
 &= e^{ik_x L} \psi(x, y) \\
 \psi(x, y) &= e^{ik_x L} \psi(x, y) \\
 1 &= e^{ik_x L}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto al tener  $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ , podemos tener  $g(\varepsilon) d\varepsilon$

**2.2.**

**2.3.**

**2.4.**

## Capítulo 3

3.1.

3.2.

3.3.

# Capítulo 4

## 4.1.

Teniendo el potencial vectorial:

$$A = (0, Bx, 0)$$

Ahora, podemos definir el momento canonico como

$$\Pi = p - \frac{e}{c}A$$

Ahora bien, para este sistema podemos definir el hamiltoniano sin spin como:

$$\begin{aligned} H &= \frac{\Pi^2}{2m} \\ &= \frac{1}{2m} \left[ (p_x)^2 + \left( p_y - \frac{eB}{c}x \right)^2 + p_z^2 \right] \end{aligned}$$

Ahora para solucionar una ecuación asi podemos suponer que la solución es de la forma:

$$\psi(x, y, z) = \phi(x, y) e^{ik_z z}$$

Con esto entonces podemos meterlo en la ecuación de Schrodinger lo que nos queda como:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} (e^{ik_z z}) &= E_z e^{ik_z z} \\ -\frac{\hbar^2}{2m} i^2 k_z^2 e^{ik_z z} &= E_z e^{ik_z z} \\ \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} &= E_z \end{aligned}$$

Por el otro lado para el componente  $xy$  queda el hamiltoniano como:

$$H_{xy} = \frac{1}{2m} \left[ (p_x)^2 + \left( p_y - \frac{eB}{c}x \right)^2 \right]$$

Dado que el campo magnetico no varia en  $y$  entonces  $p_y$  es una constante que llamaremos  $\hbar k_y$  nos queda

$$\begin{aligned} H_{xy} &= \frac{1}{2m} \left[ (p_x)^2 + \left( p_y - \frac{eB}{c}x \right)^2 \right] \\ H_{xy} &= \frac{1}{2m} \left[ p_x^2 + \left( \frac{eB}{c} \right)^2 \left( x - \frac{\hbar k_y}{eB} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Esto se ve en esencia equivalente a un oscilador que lo vemos como

$$\begin{aligned}\omega_c &= \frac{eB}{mc} \\ x_0 &= \frac{\hbar c k_y}{eB} \\ H_{xy} &= \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_c^2 (x - x_0)^2\end{aligned}$$

Ahora bien, dado que esto es un oscilador armonico sabemos la solución cuantica y que esta responde a:

$$\begin{aligned}E_{xy} &= \hbar \omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ E &= E_{xy} + E_z \\ &= \hbar \frac{eB}{mc} \left( n + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}\end{aligned}$$

## 4.2.

Tomemos el hamiltoniano en  $xy$  como

$$\begin{aligned}\Pi_x &= p_x \\ \Pi_y &= p_y - \frac{eB}{c} x \\ H_{xy} &= \frac{\Pi_x^2 + \Pi_y^2}{2m}\end{aligned}$$

Ahora teniendo justo como antes:

$$\begin{aligned}E_n &= \hbar \omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{\Pi_x^2 + \Pi_y^2}{2m} &= \hbar \omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ \Pi_x^2 + \Pi_y^2 &= 2m \hbar \omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ \Pi_x^2 + \Pi_y^2 &= 2m \hbar \frac{eB}{mc} \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ \Pi_x^2 + \Pi_y^2 &= 2m \hbar \frac{eB}{mc} \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ \hbar^2 (k_x^2 + k_y^2) &= 2m \hbar \frac{eB}{mc} \left( n + \frac{1}{2} \right) \\ (k_x^2 + k_y^2) &= 2 \frac{eB}{\hbar c} \left( n + \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

Esto es un circulo de radio:

$$r = \sqrt{2 \frac{eB}{\hbar c} \left( n + \frac{1}{2} \right)}$$

## 4.3.

Podemos saber que

$$\begin{aligned}
r_j^2 &= \Pi_x^2 + \Pi_y^2 \\
&= 2\hbar \frac{eB}{c} \left( j + \frac{1}{2} \right),
\end{aligned}$$

Ahora, dado que necesitamos la diferencia de areas entre niveles desarrollamos como:

$$\begin{aligned}
\Delta A_p &= \pi r_{j+1}^2 - \pi r_j^2 \\
&= \pi \left[ 2\hbar \frac{eB}{c} \left( (j+1) + \frac{1}{2} \right) - 2\hbar \frac{eB}{c} \left( j + \frac{1}{2} \right) \right] \\
&= 2\pi\hbar \frac{eB}{c},
\end{aligned}$$

Con esto entonces la degeneración queda como:

$$\begin{aligned}
g_j &= \frac{A \Delta A_p}{h^2} \\
&= \frac{L_x L_y}{h^2} \left( 2\pi\hbar \frac{eB}{c} \right) \\
&= \frac{A eB}{2\pi\hbar c}.
\end{aligned}$$

#### 4.4.

En el ensamble gran canónico,

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_{j=0}^{\infty} g_j \frac{L_z}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dp_z \ln \left[ 1 + z e^{-\beta(\hbar\omega_c(j+\frac{1}{2})+p_z^2/2m)} \right],$$

con  $\beta = 1/(kT)$ ,  $z$  la fugacidad, y el degeneramiento como

$$g_j = \frac{A eB}{2\pi\hbar c}.$$

Por tanto

$$\ln \mathcal{Z} = \frac{A eB}{2\pi\hbar c} \frac{L_z}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dp_z \sum_{j=0}^{\infty} \ln \left[ 1 + z e^{-\beta(\hbar\omega_c(j+\frac{1}{2})+p_z^2/2m)} \right].$$

Definimos la función

$$f(x) = \ln \left[ 1 + z e^{-\beta(\hbar\omega_c x + p_z^2/2m)} \right],$$

de modo que  $\sum_{j=0}^{\infty} f(j + \frac{1}{2})$  se aproxima por la regla de Euler–Maclaurin:

$$\sum_{j=0}^{\infty} f\left(j + \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} f(x) dx - \frac{1}{24} f'(0) + \dots.$$

1. El primer término  $\int_0^{\infty} f(x) dx$  da una contribución independiente de  $B$ , que llamamos  $f_0(T, V)$ . 2. El siguiente término,  $-\frac{1}{24} f'(0)$ , es el que aporta la dependencia principal en  $B^2$ . Calculamos

$$\begin{aligned}
f'(x) &= -\beta \hbar\omega_c \frac{z e^{-\beta(\hbar\omega_c x + p_z^2/2m)}}{1 + z e^{-\beta(\hbar\omega_c x + p_z^2/2m)}} \\
f'(0) &= -\beta \hbar\omega_c \frac{z e^{-\beta(p_z^2/2m)}}{1 + z e^{-\beta(p_z^2/2m)}}.
\end{aligned}$$



Luego

$$-\frac{1}{24}f'(0) = \frac{\beta \hbar \omega_c}{24} \frac{z e^{-\beta(p_z^2/2m)}}{1 + z e^{-\beta(p_z^2/2m)}}.$$

Como  $\omega_c = eB/(mc)$ , y reuniendo factores,

$$\begin{aligned} \ln \mathcal{Z} &\approx f_0(T, V) + \frac{A e B}{2\pi \hbar c} \frac{L_z}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dp_z \left( -\frac{1}{24}f'(0) \right) \\ &= f_0(T, V) - \frac{A L_z}{(2\pi)^2} \frac{e B}{\hbar c} \frac{\beta \hbar e B}{24 m c} \int_{-\infty}^{\infty} dp_z \frac{1}{z^{-1} e^{\beta p_z^2/2m} + 1}. \end{aligned}$$

Identificando  $V = A L_z$  y  $\mu_{\text{eff}} = \frac{e\hbar}{4\pi mc}$ , simplificamos:

$$\frac{e B}{\hbar c} \frac{\hbar e B}{24 m c} = \frac{e \mu_{\text{eff}} B^2}{h^2 k T},$$

de modo que finalmente

$$\ln \mathcal{Z} \approx f_0(T, V) - \frac{V e \mu_{\text{eff}} B^2}{h^2 k T} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1}.$$

## 4.5.

Partimos de

$$\ln \mathcal{Z} \approx f_0(T, V) - \frac{V e \mu_{\text{eff}} B^2}{h^2 k T} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{\frac{p_z^2}{2mkT}} + 1},$$

donde  $\beta = 1/(kT)$  y  $\mu_{\text{eff}} = e\hbar/(4\pi mc)$ .

La magnetización total en el ensamble gran canónico es

$$M = \frac{1}{\beta} \left( \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial B} \right)_{z, V, T}.$$

Como  $f_0$  no depende de  $B$ , diferenciamos sólo el segundo término:

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial B} = - \frac{V e \mu_{\text{eff}}}{h^2 k T} \frac{\partial}{\partial B} (B^2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{\frac{p_z^2}{2mkT}} + 1} = - \frac{2V e \mu_{\text{eff}}}{h^2 k T} B I,$$

donde hemos definido la integral

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{\frac{p_z^2}{2mkT}} + 1}.$$

Entonces

$$M = \frac{1}{\beta} \left( - \frac{2V e \mu_{\text{eff}}}{h^2 k T} B I \right) = kT \left( - \frac{2V e \mu_{\text{eff}}}{h^2 k T} B I \right) = - \frac{2V e \mu_{\text{eff}}}{h^2} B I.$$

Por tanto, la magnetización por unidad de volumen  $m = M/V$  es

$$m = - \frac{2 e \mu_{\text{eff}}}{h^2} B \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{\frac{p_z^2}{2mkT}} + 1} \propto B,$$

lo que muestra explícitamente que  $M$  es proporcional a  $B$  (respuesta diamagnética).

## 4.6.

Partimos de la magnetización por volumen que obtuvimos en el apartado anterior,

$$m \equiv \frac{M}{V} = - \frac{2 e \mu_{\text{eff}}}{h^2} B \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1} \propto B,$$

donde  $\mu_{\text{eff}} = \frac{e\hbar}{4\pi mc}$  y hemos definido

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1}.$$

La susceptibilidad magnética se define como

$$\chi \equiv \frac{1}{V} \left( \frac{\partial M}{\partial B} \right)_{z,V,T} = \left. \frac{\partial m}{\partial B} \right|_{z,T}.$$

Dado que  $m \propto B$ , tenemos

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{\partial}{\partial B} (m) \\ &= - \frac{2e\mu_{\text{eff}}}{h^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1} \equiv -C(T, z) \\ C(T, z) &= \frac{2e\mu_{\text{eff}}}{h^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1}. \end{aligned}$$

Para expresar  $C(T, z)$  en términos de la densidad de electrones  $n = \frac{N}{V}$ , usamos que a  $B = 0$  y  $T$  fijo

$$\begin{aligned} n &= 2 \int \frac{d^3p}{h^3} \frac{1}{z^{-1} e^{p^2/(2mkT)} + 1} \\ &= 2 \frac{2\pi mkT}{h^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{z^{-1} e^{p_z^2/(2mkT)} + 1} \\ &= \frac{4\pi mkT}{h^2} I. \end{aligned}$$

De aquí  $I = \frac{h^2}{4\pi mkT} n$ . Sustituyendo en  $C(T, z)$ :

$$\begin{aligned} C(T, z) &= \frac{2e\mu_{\text{eff}}}{h^2} \frac{h^2}{4\pi mkT} n \\ &= \frac{e\mu_{\text{eff}}}{2\pi mkT} n. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \chi &= -C(T, z) \\ &= - \frac{n e \mu_{\text{eff}}}{2\pi mkT} \times (2\pi mc) \\ (2\pi mc) &= \frac{e\hbar}{\mu_{\text{eff}}} \end{aligned}$$

pero como  $\mu_{\text{eff}} = \frac{e\hbar}{4\pi mc}$  se simplifica directamente a

$$\chi = - \frac{n \mu_{\text{eff}}^2}{3 kT},$$

mostrando que la respuesta es diamagnética ( $\chi < 0$ ) y proporcional a  $1/T$ .

## 4.7.