

Mecanica Cuantica

Tarea 5

Sergio Montoya
David Pachon

08 de Abril de 2025

Contents

Chapter 1	Page 2
Chapter 2	Page 3
2.1	3
2.2	3
2.3	4
Chapter 3	Page 5
Chapter 4	Page 6
4.1	6
4.2	9
4.3	10
4.4	10
4.5	11
4.6	12

Chapter 1

Chapter 2

2.1

Para mostrar que esta normalizado sumamos cada coeficiente y mostramos que esto equivale a 1

$$\begin{aligned} |c_0|^2 + |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 &= 1 \\ \left| \frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 + \left| \frac{2i}{4} \right|^2 + \left| -\frac{i}{4} \right|^2 + \left| \frac{3}{4} e^{i\frac{\pi}{3}} \right|^2 &= 1 \\ \frac{2}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \left| \frac{3}{4} \right|^2 |e^{i\frac{\pi}{3}}|^2 &= 1 \\ \frac{2}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{9}{16} \left| \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right|^2 &= 1 \\ \frac{2}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{9}{16} \left(\sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{9}{16} (1)^2 &= 1 \\ \frac{2}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{9}{16} &= 1 \\ \frac{2+4+1+9}{16} &= 1 \\ 1 &= 1 \end{aligned}$$

2.2

Para encontrar la energia podemos usar la ecuación 4.2.27 de las notas de clase en donde sabemos que los estados se pueden encontrar como:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

Por lo tanto las energías son:

$$\begin{aligned}
 E_n &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \\
 E_0 &= \left(0 + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \\
 &= \frac{1}{2} \hbar\omega \\
 E_1 &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \\
 &= \left(\frac{3}{2}\right) \hbar\omega \\
 E_2 &= \left(2 + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \\
 &= \left(\frac{5}{2}\right) \hbar\omega \\
 E_3 &= \left(3 + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \\
 &= \left(\frac{7}{2}\right) \hbar\omega
 \end{aligned}$$

Ahora bien, las probabilidades son:

$$\begin{aligned}
 P_n &= |\langle n | \psi \rangle|^2 \\
 &= |c_n|^2
 \end{aligned}$$

Esto ya lo calculamos en la sección anterior por lo que sabemos que serían:

$$\begin{aligned}
 P_0 &= \frac{2}{16} \\
 P_1 &= \frac{4}{16} \\
 P_2 &= \frac{1}{16} \\
 P_3 &= \frac{9}{16}
 \end{aligned}$$

2.3

Para calcular

$$\langle E \rangle = \sum_{n=0}^3 P_n E_n$$

Tomando los resultados de la sección anterior tenemos:

$$\begin{aligned}
 \langle E \rangle &= P_0 E_0 + P_1 E_1 + P_2 E_2 + P_3 E_3 \\
 &= \frac{2}{16} \left(\frac{1}{2} \hbar\omega\right) + \frac{4}{16} \left(\frac{3}{2} \hbar\omega\right) + \frac{1}{16} \left(\frac{5}{2} \hbar\omega\right) + \frac{9}{16} \left(\frac{7}{2} \hbar\omega\right) \\
 &= \left(\frac{2}{32} \hbar\omega\right) + \left(\frac{12}{32} \hbar\omega\right) + \left(\frac{5}{32} \hbar\omega\right) + \left(\frac{63}{32} \hbar\omega\right) \\
 &= \left(\frac{2 + 12 + 5 + 63}{32} \hbar\omega\right) \\
 &= \left(\frac{82}{32} \hbar\omega\right) \\
 &= \left(\frac{41}{16} \hbar\omega\right)
 \end{aligned}$$

Chapter 3

Chapter 4

4.1

Para solucionar esto partimos desde:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_- + a_+); \quad p = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (a_+ - a_-)$$

Ahora bien, tomemos que:

$$\begin{aligned}\langle \alpha | a_- | \alpha \rangle &= \langle \alpha | \alpha | \alpha \rangle \\ &= \alpha \langle \alpha | \alpha \rangle \\ &= \alpha \\ \langle \alpha | a_+ | \alpha \rangle &= \langle \alpha | \alpha^* | \alpha \rangle \\ &= \alpha^* \langle \alpha | \alpha \rangle \\ &= \alpha^*\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_- + a_+) \\ \langle x \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle \alpha | (a_- + a_+) | \alpha \rangle \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\alpha + \alpha^*) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} 2\Re(\alpha) \\ &= \sqrt{\frac{4\hbar}{2m\omega}} \Re(\alpha) \\ &= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \Re(\alpha)\end{aligned}$$

Para $\langle p \rangle$

$$\begin{aligned}
 p &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(a_+ - a_-) \\
 \langle p \rangle &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\langle \alpha | (a_+ - a_-) | \alpha \rangle \\
 &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\alpha^* - \alpha) \\
 &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(-2i\Im(\alpha)) \\
 &= \sqrt{\frac{4m\omega\hbar}{2}}\Im(\alpha) \\
 &= \sqrt{2m\omega\hbar}\Im(\alpha)
 \end{aligned}$$

Ahora con los casos de $\langle x^2 \rangle$ y $\langle p^2 \rangle$

Primero miremos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \frac{\hbar}{2m\omega}(a_- + a_+)^2 \\
 &= \frac{\hbar}{2m\omega}(a_-^2 + a_+^2 + a_-a_+ + a_+a_-) \\
 p^2 &= -\frac{m\omega\hbar}{2}(a_+ - a_-)^2 \\
 &= -\frac{m\omega\hbar}{2}(a_+^2 + a_-^2 - a_+a_- - a_-a_+)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto vamos a necesitar:

$$\begin{aligned}
 \langle \alpha | a_-^2 | \alpha \rangle &= \alpha \langle \alpha | a_- | \alpha \rangle \\
 &= \alpha^2 \\
 \langle \alpha | a_+^2 | \alpha \rangle &= \alpha^* \langle \alpha | a_- | \alpha \rangle \\
 &= (\alpha^*)^2 \\
 \langle \alpha | a_+a_- | \alpha \rangle &= \alpha \langle \alpha | a_+ | \alpha \rangle \\
 &= \alpha \alpha^* \langle \alpha | \alpha \rangle \\
 &= |\alpha|^2 \\
 \langle \alpha | a_-a_+ | \alpha \rangle &= \langle \alpha | a_+a_- + 1 | \alpha \rangle \\
 &= \alpha \langle \alpha | a_+ | \alpha \rangle + \langle \alpha | 1 | \alpha \rangle \\
 &= \alpha \alpha^* \langle \alpha | \alpha \rangle + 1 \langle \alpha | \alpha \rangle \\
 &= |\alpha|^2 + 1
 \end{aligned}$$

Ya con esto podemos pasar a calcular

1. $\langle x^2 \rangle$

$$\begin{aligned}
x^2 &= \frac{\hbar}{2m\omega} (a_-^2 + a_+^2 + a_-a_+ + a_+a_-) \\
\langle x^2 \rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \alpha | (a_-^2 + a_+^2 + a_-a_+ + a_+a_-) | \alpha \rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} (\langle \alpha | a_-^2 | \alpha \rangle + \langle \alpha | a_+^2 | \alpha \rangle + \langle \alpha | a_-a_+ | \alpha \rangle + \langle \alpha | a_+a_- | \alpha \rangle) \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + |\alpha|^2 + |\alpha|^2 + 1) \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2 + 1) \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} (2\Re(\alpha)^2 - 2\Im(\alpha)^2 + 2\Re(\alpha)^2 + 2\Im(\alpha)^2 + 1) \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} (4\Re(\alpha)^2 + 1) \\
&= \frac{2\hbar}{m\omega} \Re(\alpha)^2 + \frac{\hbar}{2m\omega}
\end{aligned}$$

2. $\langle p^2 \rangle$

$$\begin{aligned}
p^2 &= -\frac{m\omega\hbar}{2} (a_+^2 + a_-^2 - a_+a_- - a_-a_+) \\
\langle p^2 \rangle &= -\frac{m\omega\hbar}{2} \langle \alpha | a_+^2 + a_-^2 - a_+a_- - a_-a_+ | \alpha \rangle \\
&= -\frac{m\omega\hbar}{2} (\langle \alpha | a_+^2 | \alpha \rangle + \langle \alpha | a_-^2 | \alpha \rangle - \langle \alpha | a_+a_- | \alpha \rangle - \langle \alpha | a_-a_+ | \alpha \rangle) \\
&= -\frac{m\omega\hbar}{2} (\alpha^2 + (\alpha^*)^2 - |\alpha|^2 - (|\alpha|^2 + 1)) \\
&= -\frac{m\omega\hbar}{2} (2\Re(\alpha)^2 - 2\Im(\alpha)^2 - |\alpha|^2 - |\alpha|^2 - 1) \\
&= -\frac{m\omega\hbar}{2} (2\Re(\alpha)^2 - 2\Im(\alpha)^2 - 2\Re(\alpha)^2 - 2\Im(\alpha)^2 - 1) \\
&= -\frac{m\omega\hbar}{2} (-4\Im(\alpha)^2 - 1) \\
&= \frac{m\omega\hbar}{2} (4\Im(\alpha)^2 + 1) \\
&= \frac{m\omega\hbar}{2} 4\Im(\alpha)^2 + \frac{m\omega\hbar}{2} \\
&= 2m\omega\hbar\Im(\alpha)^2 + \frac{m\omega\hbar}{2}
\end{aligned}$$

Por lo tanto los resultados son:

1. $\langle x \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \Re(\alpha)$

2. $\langle p \rangle = \sqrt{2m\omega\hbar} \Im(\alpha)$

3. $\langle x^2 \rangle = \frac{2\hbar}{m\omega} \Re(\alpha)^2 + \frac{\hbar}{2m\omega}$

4. $\langle p^2 \rangle = 2m\omega\hbar\Im(\alpha)^2 + \frac{m\omega\hbar}{2}$

4.2

En este caso tenemos:

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Por lo tanto veamos cuanto es $\langle x \rangle^2$

$$\begin{aligned}\langle x \rangle^2 &= \left(\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \Re(\alpha) \right)^2 \\ \langle x \rangle^2 &= \frac{2\hbar}{m\omega} \Re(\alpha)^2\end{aligned}$$

Con esto entonces

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega} \Re(\alpha)^2 + \frac{\hbar}{2m\omega} - \frac{2\hbar}{m\omega} \Re(\alpha)^2} \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\end{aligned}$$

Por el otro lado

$$\sigma_p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

con

$$\begin{aligned}\langle p \rangle^2 &= \left(\sqrt{2m\omega\hbar} \Im(\alpha) \right)^2 \\ &= \left(\sqrt{2m\omega\hbar} \Im(\alpha) \right)^2 \\ &= 2m\omega\hbar \Im(\alpha)^2\end{aligned}$$

De nuevo calculemos

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} \\ &= \sqrt{2m\omega\hbar \Im(\alpha)^2 + \frac{m\omega\hbar}{2} - 2m\omega\hbar \Im(\alpha)^2} \\ &= \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\end{aligned}$$

Ahora al final:

$$\begin{aligned}\sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \\ \sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar^2 m\omega}{2 \cdot 2m\omega}} \\ \sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar^2}{4}} \\ \sigma_x \sigma_p &= \frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

4.3

Aplicamos a_- de la siguiente manera

$$\begin{aligned} a_- |\alpha\rangle &= \alpha \sum_n c_n |n\rangle \\ &= \sum_n c_n \sqrt{n} |n-1\rangle \end{aligned}$$

Dado que son esencialmente los mismos podemos hacer

$$\begin{aligned} \alpha \sum_n c_n |n\rangle &= \sum_n c_n \sqrt{n} |n-1\rangle \\ \sum_n \alpha c_n |n\rangle &= \sum_n c_n \sqrt{n} |n-1\rangle \\ \sum_n \alpha c_n |n\rangle &= \sum_n c_{n+1} \sqrt{n-1} |n\rangle \\ \alpha c_n &= c_{n+1} \sqrt{n-1} \\ \frac{\alpha}{\sqrt{n-1}} c_n &= c_{n+1} \end{aligned}$$

Dada esta definición recursiva podemos reducirla hasta

$$\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0 = c_n$$

4.4

Tenemos:

$$\begin{aligned} \langle \alpha | \alpha \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \right|^2 &= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \right|^2 &= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(|\alpha|^2)^n}{n!} \end{aligned}$$

Esta es una serie exponencial conocida:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} &= |c_0|^2 e^{|\alpha|^2} \\ |c_0|^2 e^{|\alpha|^2} &= 1 \\ |c_0|^2 &= e^{-|\alpha|^2} \\ c_0 &= e^{-|\alpha|^2/2} \end{aligned}$$

4.5

En los punto anterior definimos que:

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n |n\rangle = \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0 |n\rangle = \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-|\alpha|^2/2} |n\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

Con esto entonces, podemos pasar a $|\alpha(t)\rangle$ de la manera en la que nos dicen esto queda como

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$$

Ahora apliquemos a_-

$$\begin{aligned} a_- |\alpha(t)\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} \sqrt{n} |n-1\rangle \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n+1} \frac{\alpha^{n+1}}{\sqrt{n+1!}} \sqrt{n+1} e^{-iE_{n+1} t/\hbar} |n\rangle \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \alpha e^{-iE_{n+1} t/\hbar} |n\rangle \\ E_n &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \\ \implies E_{n+1} &= \hbar\omega \left(n + \frac{3}{2}\right) \\ \implies e^{-iE_{n+1} t/\hbar} &= e^{-i\omega t} e^{-iE_n t/\hbar} \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \alpha \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-i\omega t} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \alpha e^{-i\omega t} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \\ \alpha e^{-i\omega t} &= \alpha(t) \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= \alpha(t) e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \\ a_- |\alpha(t)\rangle &= \alpha(t) |\alpha(t)\rangle \end{aligned}$$

Esto en esencia quiere decir que este operador oscila de manera coherente con un oscilador clasico de periodo ω . Cosa que para ser honestos tiene sentido pues estamos minimizando la incertidumbre.

4.6

Verifiquemos cada caso:

$$\begin{aligned}
 a_- |0\rangle &= 0 \cdot |0\rangle \\
 \alpha &= 0 \\
 |\alpha\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \\
 |\alpha = 0\rangle &= e^{-|0|^2/2} \sum_n \frac{0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \\
 |\alpha = 0\rangle &= \sum_n 0 |n\rangle \\
 |\alpha = 0\rangle &= |0\rangle
 \end{aligned}$$

Por ultimo

$$\begin{aligned}
 1. \langle x \rangle &= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \Re(0) = 0 \\
 2. \langle p \rangle &= \sqrt{2m\omega\hbar} \Im(0) = 0 \\
 3. \langle x^2 \rangle &= \frac{2\hbar}{m\omega} \Re(0)^2 + \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar}{2m\omega} \\
 4. \langle p^2 \rangle &= 2m\omega\hbar \Im(0)^2 + \frac{m\omega\hbar}{2} = \frac{m\omega\hbar}{2}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 \sigma_x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\
 &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega} - 0} \\
 &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \\
 \sigma_p &= \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} \\
 &= \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2} - 0} \\
 &= \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \\
 \sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \\
 \sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar^2}{4}} \\
 \sigma_x \sigma_p &= \frac{\hbar}{2}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto si es un estado coherente con $\alpha = 0$