

Exercice 5 TD 3

Guillaume Gatt, Pierre Goutagny

October 15, 2020

2) On pose $n = (\dim(E))$

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E .

On pose les endomorphismes $e_{i,j}$ de la manière suivant :

$$\forall (i, j, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^3, e_{i,j}(e_k) = \begin{cases} e_j & \text{si } i = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrons que $(e_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $\text{Hom}(E)$.

On a $|(e_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}| = n^2 = \dim(\text{Hom}(E))$.

Montrons que cette famille est libre :

On pose $k \% n$ le reste de la division euclidienne de k par n .

On pose $k // n$ le quotient de la division euclidienne de k par n .

On pose $u_k = e_{(k \% n) + 1, (k // n) + 1}$.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_{n^2}$ tel que $\sum_{k=1}^{n^2} \lambda_k u_k = 0$

On donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\sum_{k=1}^{n^2} \lambda_k u_k(e_i) = 0$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_{kn+i} e_{(k+i) \% (n+1)} = 0$$

or la famille $(e_{(k+i) \% (n+1)})_{0 \leq k \leq n-1} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$

On a donc comme $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est libre :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \lambda_{kn+i} = 0$$

On a donc : $\forall k \in \llbracket 1, n^2 \rrbracket \lambda_k = 0$

donc $(e_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ est libre et a pour cardinal la dimension de $\text{Hom}(E)$ donc c'est une base.

Montrons que $\bar{\psi} \circ \phi^{-1}(e_{i,j}) = \text{tr}(e_{i,j})$:

Montrons que $\phi(e_i^* \otimes e_j) = e_{i,j}$

$\phi(e_i^* \otimes e_j)$ est l'application $z \rightarrow e_i^*(z)e_j$

Il s'agit donc de l'application qui pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\phi(e_i^* \otimes e_j)(e_k) = \begin{cases} e_j & \text{si } k = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

donc $\phi(e_i^* \otimes e_j) = e_{i,j}$.

$$\text{On a donc } \bar{\psi} \circ \phi^{-1}(e_{i,j}) = \bar{\psi}(e_i^* \otimes e_j) = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \text{tr}(e_{i,j})$$

On a donc $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \bar{\psi} \circ \phi^{-1}(e_{i,j}) = \text{tr}(e_{i,j})$

On a donc comme $(e_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base on a pour $u \in \text{Hom}(E)$:

$$\bar{\psi} \circ \phi^{-1}(u) = \bar{\psi} \circ \phi^{-1}(\sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_{i,j} e_{i,j}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_{i,j} \bar{\psi} \circ \phi^{-1}(e_{i,j}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_{i,j} \text{tr}(e_{i,j})$$

$$\bar{\psi} \circ \phi^{-1}(u) = \text{tr}(\sum_{1 \leq i, j \leq n} \lambda_{i,j} e_{i,j}) = \text{tr}(u)$$

Donc $\bar{\psi} \circ \phi^{-1} = \text{tr}$