

# Démonstration kholle 23

## I Produit matriciel : associativité, matrices identités.

**Propriété :**  $\forall (A, B, C) \in M_{np}(\mathbb{K}) \times M_{pr}(\mathbb{K}) \times M_{rs}(\mathbb{K}), A(BC) = (AB)C$

**Démonstration :**

$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq r}} C = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}} BC = (d_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq s}} AB = (e_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq r}}$  Pour  $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq s$

d'une part, le coefficient i-j de  $A(BC)$  est :

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} d_{kj}$$

or  $d_{kj} = \sum_{l=1}^r b_{kl} c_{lj}$  donc c'est :  $\sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^r a_{ik} b_{kl} c_{lj}$

d'autre part le coefficient de i-j de  $(AB)C$  est :

$$\sum_{l=1}^r e_{il} c_{lj}$$

Or  $e_{il} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kl}$  donc c'est :  $\sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kl} c_{lj}$

même valeur par interversion des sommes rectangulaires.

**Propriété :**  $\forall A \in M_{np}(\mathbb{K}), \underbrace{I_n}_{n \times n} \underbrace{A}_{n \times p} = \underbrace{A}_{n \times p} \underbrace{I_p}_{p \times p} = \underbrace{A}_{n \times p}$

**Démonstration :**

coefficient i-j de  $I_n A$  :

$$\sum_{k=1}^n \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}$$

pour  $AI_p$  :  $\sum_{k=1}^p a_{ik} \delta_{kj} = a_{ij}$

## II Matrice d'ordre 2 : caractérisation de l'inversibilité et formule pour l'inverse

**Propriété :**

La matrice  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est inversible si et seulement si  $ad - bc \neq 0$  et on a alors :  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

**Démonstration :**

si  $ad - bc \neq 0$  alors :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ab \\ cd-dc & ad-bc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$= I_2 \text{ de même } \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = I_2$$

si  $ad - bc = 0$  alors

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = 0_2$$

si A était inversible on aurait :

$$A^{-1}A \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = A^{-1} \times 0_2$$

$$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = 0_2$$

$a = b = c = d = 0$  donc  $A = 0_2$  contradiction avec A inversible

### III Une matrice carrée A est inversible si, et seulement si, pour toute colonne C, il existe une unique colonne X telle que $AX = C$

**Propriété :**

Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$  on a les équivalences :

- 1)  $A \in GL_n(\mathbb{K})$
- 2) Pour toute matrice colonne  $C \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ , il existe une unique solution  $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$  tel que  $AX = C$
- 3) Tout système dont la matrice des coefficient est A possède une unique solution

**Démonstration :**

3  $\Leftrightarrow$  2 est immédiate. On transpose le système en écriture matricielle.

1  $\Rightarrow$  3

On cherche  $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$  tel que  $AX = C$

**Analyse :** si une matrice  $X_0$  convient alors comme A est inversible on aurait  $X_0 = A^{-1}C$  d'où l'unicité de  $X_0$

**Synthèse :** vérifions que  $A^{-1}C$  convient :

$A(A^{-1}C) = (AA^{-1})C = I_n C = C$  il convient

2  $\rightarrow$  1

On va construire une matrice B tel que  $AB = I_n$ . On vérifiera  $BA = I_n$  pour  $j \in [[1, n]]$ , notons  $E_j \in M_{n,1}(\mathbb{K})$  la j-ième colonne de  $I_n$  soit  $B_j \in M_{n,1}$  telle que  $AB_j = E_j$  ( $B_j$  existe et est unique par 2) considérons  $B \in M_n(\mathbb{K})$  avec  $B_j$  l'ensemble des colonnes de B :

$$B = (B_1 \ B_2 \ \dots \ B_n)$$

alors  $AB = (AB_1 \ AB_2 \ \dots \ AB_n) = I_n$  (propriété au calcul matriciel par colonne)

pour  $j \in [[1, n]]$ ; on note  $A_j$  la j-ième colonne de A

par définition du produit matriciel :  $AE_j = A_j$

Par ailleurs, on sais que  $AB = I_n$  donc  $(AB)A_j = A_j$  et  $A(BA_j) = A_j$  donc par unicité  $BA_j = E_j$  et par propriété du calcul matriciel :

$$BA = I_n$$

### IV Transposition : produit, inverse $M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus AS_n(\mathbb{K})$

**Propriété :** Soit  $A \in M_{np}(\mathbb{K})$  et  $B \in M_{pr}(\mathbb{K})$ . Alors :

$$\underbrace{^t(AB)}_{\substack{n \times r \\ r \times n}} = \underbrace{^tB}_{r \times p} \underbrace{^tA}_{p \times n}$$

**Démonstration :**

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq r}}$$

$$AB = (c_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq r}} \quad ^tB^tA = (d_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq n}}$$

$$^tA = (a'_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \text{ avec } a'_{ij} = a_{ji} \quad ^tB = (b'_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq p}} \text{ avec } b'_{ij} = b_{ji} \quad ^t(AB) = (c'_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq n}} \text{ avec } c'_{ij} = c_{ji}$$

Soit  $(i, j) \in [[1, r]] \times [[1, n]]$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^p b'_{ik} a'_{kj} \text{ par définition de } ^tB^tA$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^p b_{ki} a_{jk} \text{ déf de } ^tA \text{ et } ^tB$$

$$d_{ij} = c_{ji} \text{ définition de } AB$$

$$d_{ij} = c'_{ij} \text{ définition de } ^t(AB)$$

**Propriété :**

Soit  $A \in GL_n(\mathbb{K})$ ,  $^tA \in GL_n(\mathbb{K})$  et  $(^tA)^{-1} = ^t(A^{-1})$

**Démonstration :**

$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$  transposons :

$$^t(A^{-1})^tA = ^tA^tA^{-1} = I_n \text{ car } ^tI_n = I_n$$

donc  $^tA \in GL_n(\mathbb{K})$  d'inverse  $^t(A^{-1})$

**Propriété :**

$$M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus AS_n(\mathbb{K})$$

**Démonstration :**

Soit  $s : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K})$

$A \mapsto {}^t A$

Alors  $s$  est une involution linéaire ( $s^2 = Id_{M_n(\mathbb{K})}$ ) donc :

$$M_n(\mathbb{K}) = \underbrace{Ker(s - Id_{M_n(\mathbb{K})})}_{S_n(\mathbb{K})} \oplus \underbrace{Ker(s + Id_{M_n(\mathbb{K})})}_{AS_n(\mathbb{K})}$$

**V Trace : définition et propriété**  $tr(AB) = tr(BA)$ .

**VI L'application**  $\Phi : A \in M_{n,p} \mapsto (\Phi_A : M \mapsto tr({}^t AM)) \in \mathcal{L}(M_{n,p}(\mathbb{K}), \mathbb{K})$   
**est un isomorphisme**