

Démonstration kholle 26

I Développement par rapport à une ligne ou une colonne.

Propriété :

$A \in M_n(\mathbb{K})$

A_{ij} , obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de A ($A_{ij} \in M_{n-1}(\mathbb{K})$)

$\Delta_{ij} = \det(A_{ij})$ mineur principal i-j

1) Pour $j \in [[1, n]]$ fixé :

$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$ développement par rapport à la j-ième colonne

2) Pour $i \in [[1, n]]$ fixé :

$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$ développement par rapport à la i-ème ligne

Démonstration :

$$1) \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \begin{vmatrix} 0 \\ \vdots \\ \text{coeff } A & 1 & \text{coeff } A \\ \vdots \\ 0 \end{vmatrix} \text{ par linéarité sur la j-ième colonne}$$

par permutation circulaire des colonnes j à n, on amène $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ en position n

puis permutation circulaire des lignes i à n, on amène la ligne i en position n

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \underbrace{(-1)^{n-j} (-1)^{n-i}}_{=(-1)^{2n} (-1)^{i+j}} \underbrace{\begin{vmatrix} 0 \\ \vdots \\ A_{ij} \\ 0 \\ ? & 1 \end{vmatrix}}_{\Delta_{ij}}$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$$

$$2) \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \begin{vmatrix} \text{coeff } A & & & \\ 0 & \dots & 1 & \dots \\ \text{coeff } A & & & \end{vmatrix} \text{ cycle sur les lignes puis les colonnes :}$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{n-i} (-1)^{n-j} \begin{vmatrix} A_{ij} & & ? \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

II Relation $A^t \text{Com}(A) = {}^t \text{Com}(A) A = \det(A) I_n$.

Propriété :

$\forall A \in M_n(\mathbb{K}), A^t \text{Com}(A) = {}^t \text{Com}(A) = \det(A) I_n$ Démonstration :

coeff i-j de $A^t \text{Com}(A)$

$\sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{j+k} \Delta_{jk}$ (cofacteur j-k car transposée)

si $i = j$: On reconnaît le développement de $\det(A)$ par rapport à la ligne i :

$\sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \Delta_{ik} = \det(A)$

si $i \neq j$: Soit B ayant les mêmes coefficients que A sauf la ligne j, que l'on remplace par la ligne i de A.

Alors $\det(B) = 0$ car deux lignes sont égales développement de B par rapport à la ligne j :

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} b_{jk} \Delta_{jk}$$

Comme B a les mêmes coefficients que A en hors de la ligne j :

$$0 = a_{ij} \text{ par définitions de B}$$

idem avec les colonnes :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} \Delta_{ki} a_{kj}$$

si $i \neq j$: on remplace la colonne i de A par sa colonne j

III Déterminant triangulaire par blocs.

IV Déterminant de Vandermonde

V Inégalité de Cauchy-Schwarz et cas d'égalité.

VI Inégalité triangulaire et cas d'égalité

VII Propriétés variées de la norme + théorème de Pythagore

VIII Propriétés générales de l'orthogonal d'une partie