

SOLUÇÕES

Nível 3

APOIO
impa
Instituto de Matematica
Pura e Aplicadas
Pura e Aplicadas

1. Alternativa B

São 14 casinhas no total e queremos que fiquem 7 brancas e 7 pretas; logo, mais duas casinhas brancas devem ficar pretas.

2. Alternativa E

As faces não visíveis são aquelas que têm os números 6 (oposta ao 1), 5 (oposta ao 2) e 4 (oposta ao 3). A soma é 6 + 5 + 4 = 15.

3. Alternativa D

Como 0.37 = 0.370 e 0.7 = 0.700, temos

0,307 < 0,37, alternativa (A) descartada.

0,073 < 0,37, alternativa (B) descartada.

0,737 > 0,7, alternativa (C) descartada.

0,703 > 0,7, alternativa (E) descartada.

A alternativa correta só pode ser (D).

De fato: 0.37 < 0.377 < 0.7.

Alternativa B

Roberto gastou $6 \times 5 + 29 \times 2 = 88$ reais na compra dos ladrilhos pois há 6 ladrilhos brancos e 29 pretos.



5. Alternativa C

Cada lápis custa $18 \div 6 = 3$ reais e cada caneta custa $42 \div 6 = 7$ reais. Logo, um conjunto de 2 canetas e 3 lápis custa $2 \times 7 + 3 \times 3 = 23$ reais.

6. Alternativa E


É fácil preencher o tabuleiro. Por exemplo, para preencher o canto superior esquerdo, os números 1, 3 e 4 já foram utilizados (olhe a linha e a coluna); logo, essa casa deve ser preenchida com o número 2. Preenchendo completamente a tabela, vemos que o produto dos números dos cantos é $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$.

	1	4	Г]		2	1	4		7		2	1	4	3]		2	1	4	3	
3			2	1		3			2	٦.	⇒	3			2] =	╮┃	3			2	₽
	2		1]	⇔		2		1	֓֟֞֓֟֟֓֟֝֟֓֓֟֓֓֓֓֓֟֓֓֟֟֓֓֟֟֓֓֓֟֟֓֓֓֟֓֓֟֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓		4	2		1] ີ	-	4	2		1	
1		2	Γ	7		1		2		7		1		2				1		2	4	
				_						_												
		2	1	4	3		2	: 1	1	4	3		Γ	2	1	4	3	1				
\Rightarrow	3		П		2	⇔	3	1	4		2	₽	. [3	4	1	2	1				
	4	: ;	2		1		4	. [2		1			4	2	3	1]				
	1		3	2	4		1		3	2	4		Γ	1	3	2	4	1				

7. Alternativa E

As áreas dos quadrados recortados, quando somadas, devem resultar na área da folha antes do corte. Essa soma é igual a $(4 \times 400) + (9 \times 100) + (21 \times 25) = 1600 + 900 + 525 = 3025$. Como $55 \times 55 = 3025$, a folha, antes de ser cortada, tinha lado de 55 cm.

Uma possível maneira de Alberto recortar a folha é apresentada abaixo:



8. Alternativa C

As peças do dominó podem ser organizadas da seguinte maneira:

(0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (0,6)

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

(2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

(3,3), **(3,4)**, **(3,5)**, **(3,6)**

(4,4), (4,5), (4,6)

(5,5), (5,6)

(6,6)

Em negrito estão as peças nas quais o número total de bolinhas é igual ou maior do que 7. São 12 peças com essa característica.

9. Alternativa D

As coberturas abaixo mostram que as alternativas A), B), C) e E) não são com certeza o que sempre ocorre.

Α	В	C
D	E	F
G	Н	1



Α	В	С
D	Ε	F
G	Н	_

Α	В	С
D	Е	F
G	Н	Т

Resta mostrar que certamente a peça com um único quadradinho nunca cobrirá B, D, F ou H. Suponha, por absurdo, que a peça com um único quadradinho cobrisse a letra B:

Α	В	С
D	Ε	F
G	Н	1

Uma peça dupla deve cobrir A e D e outra deve cobrir C e F:

Α	В	С
D	E	F
G	Н	1

Outra peça dupla deve cobrir E e H:




É impossível cobrir com uma peça dupla G e I. Logo, a peça simples não pode cobrir B. De modo análogo, vemos que também é impossível que o quadradinho unitário cubra D, F ou H.

10. Alternativa C


Fazemos a transferência de ½ quadradinho e também da metade de dois quadradinhos, como indicado na figura. Essas transferências não alteram a área.

Vemos, assim, que a parte cinza corresponde a 10 quadradinhos e, portanto, a parte cinza corresponde a 10/25 = 2/5 da área total.



11. Alternativa E

Foi arrecadado um total de $10 \times 100 + 20 \times 30 + 30 \times 40 + 40 \times 20 + 50 \times 50 = 1000 + 600 + 1200 + 800 + 2500 = 6100$ reais.



12. Alternativa D

No caso em que ocorre o empate das duas ginastas em primeiro lugar, há 10 possibilidades (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE) e, no caso em que uma fica em primeiro lugar e a outra em segundo, há $5 \times 4 = 20$ possibilidades. No total são 30 possibilidades.

13. Alternativa E

- (A) é falsa pois $(7/12) \neq 1$
- (B) é falsa pois $(7/9) \neq (3/4)$
- (C) é falsa pois $(7/12) \neq (25/12)$
- (D) é falsa pois $(23/12) \neq (3/4)$
- (E) é verdadeira já que
- (7/12) = (32 18)/24 = (14/24)







$$\frac{7}{12} \odot \frac{8}{6} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{7}{12}$$
 \bigcirc $\frac{8}{6}$ \bigcirc $\frac{3}{4}$

14. Alternativa E

Uma letra não pode ser codificada por um número terminado em 4 (isto é, com o algarismo 4 na casa das unidades) e as únicas letras iniciadas com 4 (isto é, com o algarismo 4 na casa das dezenas) são X, Y e Z. Assim, com certeza, Z aparece na senha de Alfredo. As outras letras são I e O.

3

15. Alternativa D

Como 36 é o triplo de 12 e 54 é o triplo de 18, concluímos que o preço da mercadoria comprada a segunda vez, sem desconto, seria o triplo, ou seja, $3 \times 36 = 108$. Como ela pagou 72 reais, ela teve um desconto de 108 - 72 = 36 reais. Como o desconto foi dado na compra dos 36 novelos, o desconto por novelo foi 36 reais dividido por 36 novelos, igual a 1 real por novelo.

Outra solução:

Sejam n o preço de um novelo antes da promoção, b o preço de um botão e d o desconto. Com a promoção, o novelo passou a custar n-d. Os dados do problema nos fornecem: 12 n + 18 b = 36 e 36 (n-d) + 54 b = 72. Logo, 36 n - 36 d + 54 b = 3 (12 n + 18 b) - 36 d = 3 x 36 - 36 d = 72. Segue que 36 d = 36, ou seja, o desconto foi de d = 1 real por novelo.

16. Alternativa B

Queremos encontrar s + n, sendo que 7s + 9n = 69, em que s = número de marcianos com sete antenas e n = número de marcianos com nove antenas.

n deve estar entre 1 e 7 pois n não pode ser 0 já que 69 não é múltiplo de 7 e se n > 8 o número de antenas ultrapassaria 69.

Se n = 1, 7s = 60 não é múltiplo de 7

Se n = 2, 7s = 51 não é múltiplo de 7

Se n = 3. 7s = 42 e s = 6.

Se n = 4, 7s = 33 não é múltiplo de 7

Se n = 5, 7s = 24 não é múltiplo de 7

Se n = 6, 7s = 15 não é múltiplo de 7

Se n = 7, 7s = 6 não é múltiplo de 7.

A única solução é s = 6, n = 3 e o número de marcianos na nave é, portanto, 9.

Outra solução: $7s + 9n = 69 \Leftrightarrow n = \frac{69 - 7s}{9}$

Substituindo s por 1, 2, 3,...,9 devemos achar um valor inteiro e positivo para n. Se s = 6, então

$$n = \frac{69 - 7 \times 6}{9} = \frac{69 - 42}{9} = \frac{27}{9} = 3.$$

Podemos verificar que esses são os únicos valores positivos inteiros; logo, podemos concluir que o número total de marcianos é s + n = 9.

17. Alternativa C

Rotulamos as regiões da figura como no desenho abaixo:



Vamos dividir as possibilidades de pintura em dois casos:

Caso 1: As regiões I e III têm a mesma cor.

Há três possibilidades para pintar I, uma possibilidade para pintar III, duas possibilidades para pintar II e duas possibilidades para pintar IV. Nesse caso, há, pelo princípio multiplicativo 3 x 1 x 2 x 2 = 12 possibilidades.


Caso 2: As regiões I e III têm cores diferentes.

Há três possibilidades para pintar I, 2 possibilidades para pintar III, uma possibilidade para pintar II e também uma só possibilidade de pintar IV. Nesse caso, há 3 x 2 x 1 x 1 = 6 modos diferentes de pintar.

Juntando os dois casos, vemos que o número total de possibilidades é 12 + 6 = 18.

18. Alternativa C

Denote por a, b, c, d, e, f as medidas, como na figura.



2a + 2e = 18,

2b + 2d = 22,

2c + 2e = 32

2b + 2f = 26

Somando tudo 2a + 2e + 2b + 2d + 2c + 2e + 2b + 2f = 18 + 22 + 32 + 26 = 98.

Como o perímetro do retângulo PQRS é 76, então, 2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f = 76 e, substituindo na equação acima, 2e + 2b = 98 - 76 = 22. Portanto, o perímetro do retângulo E é 22.