

Chapitre 3 : Nombres complexes : point de vue géométrique


Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$

I. Représentation géométrique

Définition : À tout nombre complexe $z = x + iy$ avec x et y réels, on associe le point π de coordonnées (x, y) .

On dit que π est l'image de z et on note $\pi(z)$.

Réciproquement, tout point $\pi(x, y)$ est l'image d'un seul nombre complexe $z = x + iy$. On dit que z est l'afixe du point π et on note z_π .



Remarque : L'axe des ordonnées est appelé axe imaginaire. L'axe des abscisses est appelé axe réel. Ce plan sera appelé plan complexe.

Affixe d'un vecteur

À tout vecteur $\vec{w}(x, y)$ on associe le nombre complexe $z = x + iy$. On dit que z est l'afixe du vecteur \vec{w} et on note $z_{\vec{w}}$.

Exercice 1 : Soit π un point d'afixe z . Soient π_1, π_2 et π_3 les points symétriques de π respectivement par rapport à l'axe des abscisses, l'origine du repère et l'axe des ordonnées.

Exprimer les affixes des points π_1, π_2 et π_3 en fonction de z .

On pose $z = x + iy$, x et y réels.

$$z_{\pi} = x + iy = z$$

$$z_{\pi_1} = x - iy = \bar{z}$$

$$z_{\pi_2} = -x - iy = -z$$

$$z_{\pi_3} = -x + iy = -\bar{z}$$

Propriétés : • Pour tous vecteurs \vec{w} et \vec{w}' et pour tout réel k ,
 $\vec{w} = \vec{w}' \Leftrightarrow z_{\vec{w}} = z_{\vec{w}'}$

$$z_{\vec{w} + \vec{w}'} = z_{\vec{w}} + z_{\vec{w}'}$$

$$z_{k\vec{w}} = k z_{\vec{w}}$$

• Pour tous points A et B d'affixes respectives z_A et z_B , on a :

$$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$$

• Si I est le milieu du segment $[AB]$ alors $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$

Exercice 2 : Dans le plan complexe suivant les points A(3; -1), B(2; 2) et C(-1; 1).

a) Déterminer les affixes des points A, B et C

b) Déterminer l'affixe du point D, tel que ABCD soit un parallélogramme.

c) Déterminer l'affixe du point I, milieu de $[AC]$.

a) $z_A = 3 - i$

$z_B = 2 + 2i$

$z_C = -1 + i$

b) ABCD est un parallélogramme. Soit :

$$\vec{AB} = \vec{DC} \Leftrightarrow z_{\vec{AB}} = z_{\vec{DC}} \Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D$$

$$\Leftrightarrow 2 + 2i - 3 + i = -1 + i - z_D$$

$$\Leftrightarrow z_D = -2i$$

c) I est le milieu de $[AC]$, donc :

$$z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{3 - i - 1 + i}{2} = 1$$

II. Module d'un nombre complexe

• Définition et interprétation géométrique

Définition : Soit $z = x + iy$ avec x et y réels un nombre complexe.

Le module de z est le nombre réel positif noté $|z|$ et défini par :

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Exercice 3 : Déterminer le module des nombres complexes suivants.

$$z_1 = 3 - 4i \quad z_2 = 2i \quad z_3 = -2 \quad z_4 = -7 - i \quad z_5 = -2 + 3i$$

$$|z_1| = |3-4i| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

$$|z_2| = |2i| = \sqrt{2^2} = 2$$

$$|z_3| = |-2| = \sqrt{(-2)^2} = 2$$

$$|z_4| = |-7-i| = \sqrt{(-7)^2 + (-1)^2} = 5\sqrt{2}$$

$$|z_5| = |-2+3i| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

Exercice 4: Dans le plan complexe, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$.

- Montrer que les points A, B et C appartiennent au même cercle de centre O, dont on déterminera le rayon.

$$OA = |z_A| = \sqrt{2^2} = 2$$

$$OB = |z_B| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$OC = |z_C| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\text{Donc } OA = OB = OC$$

Donc les points A, B et C appartiennent bien au cercle de centre O et de rayon 2.

Remarque: ① Si $z = x$ est un nombre réel alors le module de z est la valeur absolue de x .

$$② |z|^2 = x^2 + y^2$$

$$z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2$$

$$\text{Donc } |z|^2 = z\bar{z}$$

Interprétation géométrique: Dans le plan complexe:

• Si M a pour affixe z alors $|z| = OM$

• Si \vec{w} a pour affixe z alors $|z| = \|\vec{w}\|$

• Si A (z_A) et B (z_B) alors $|z_B - z_A| = |z_A - z_B| = AB$

Exercice 4 (suite): Quelle est la nature du triangle ABC?

$$z_A = 2$$

$$z_B = -1 + i\sqrt{3}$$

$$z_C = -1 - i\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-1 - \sqrt{3} - 2| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-1 + i\sqrt{3} - 2| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1 - i\sqrt{3} - (-1 + i\sqrt{3})| = |-2i\sqrt{3}| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$AB = AC = BC$ donc le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 5 : Soit A le point d'affixe $z_A = 2 + i$ et B le point d'affixe $z_B = 4 + i$.
Déterminer les ensembles suivants

1) Ensemble des points Π d'affixe z tel que $|z - 2 - i| = 4$

2) Ensemble des points Π d'affixe z tel que $|z - 2 - i| = |z - 4 - i|$

$$\bullet |z - 2 - i| = |z - (2 + i)| = |z - z_A|$$

1) $|z - 2 - i| = 4 \Leftrightarrow |z - z_A| = 4 \Leftrightarrow \Pi A = 4 \Leftrightarrow \Pi$ appartient au cercle de centre A et de rayon 4.

$$2) |z - 2 - i| = |z - 4 - i| \Leftrightarrow |z - (2 + i)| = |z - (4 + i)|$$

$$\Leftrightarrow |z - z_A| = |z - z_B|$$

$$\Leftrightarrow \Pi A = \Pi B$$

$\Leftrightarrow \Pi$ appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

Propriétés des modules : z et z' sont deux nombres complexes non nuls, n est un entier naturel non nul.

$$\bullet |zz'| = |z||z'|$$

$$\bullet \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$\bullet |z^n| = |z|^n$$

$$\bullet \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$$

Remarque : En général $|z + z'| \neq |z| + |z'|$.

Par exemple, $z = 1$ $|z| = 1$

$$z' = i \quad |z'| = |i| = 1$$

$$|z + z'| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Exercice 6 : Calculer le module des nombres complexes suivants.

$$\frac{3}{2-5i} ; \frac{3-4i}{1+i} ; (1-2i)^8$$

$$\left| \frac{3}{2-5i} \right| = \frac{|3|}{|2-5i|} = \frac{3}{\sqrt{2^2 + (-5)^2}} = \frac{3}{\sqrt{29}} = \frac{3\sqrt{29}}{29}$$

$$\left| \frac{3-4i}{1+i} \right| = \frac{|3-4i|}{|1+i|} = \frac{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{9+16}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$|(1-2i)^8| = |(1-2i)|^8 = \sqrt{1^2 + (-2)^2}^8 = \sqrt{5}^8 = (\sqrt{5}^2)^4 = 5^4 = 625$$

III. Argument et forme trigonométrique

1) Argument d'un nombre complexe non nul


Dans la suite du cours, on se place dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Définition: Soit z un complexe non nul, de point image M .

On appelle argument de z et on note $\arg(z)$ toute mesure en radian de l'angle orienté (\vec{u}, \vec{OM}) .

Remarques: • Si θ est un argument de z alors $\theta + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ est aussi un argument de z . On note $\arg(z) = \theta [2\pi]$ (modulo 2π)

• 0 n'a pas d'argument car l'angle n'est pas défini si M est en O .



Interprétation géométrique: Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

• si \vec{w} d'affixe $z \Rightarrow$ alors $\arg(z \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) [2\pi]$

• si $A(z_A)$ et $B(z_B)$ sont deux points distincts alors $\arg(z_B - z_A) = \arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \vec{AB}) [2\pi]$

Exemples: $\arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

$\arg(-3) = \pi [2\pi]$

$\arg(1+i) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$

Propriété : Pour tout nombre complexe z non nul.

$$\arg(-z) = \arg(z) + \pi \quad [2\pi]$$


$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad [2\pi]$$

z est un réel $\Leftrightarrow \arg(z) = 0 \quad [2\pi]$ ou $\arg(z) = \pi \quad [2\pi]$

z est un réel $\Leftrightarrow \arg(z) = 0 \quad [\pi]$

z est un imaginaire pur $\Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} \quad [2\pi]$ ou $\arg(z) = -\frac{\pi}{2} \quad [2\pi]$

z est un imaginaire pur $\Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$



2) Forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul

Définition : Soit z un complexe non nul.

La forme $z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ où $\theta = \arg(z)$ est appelée forme trigonométrique du complexe z .

Propriété : Passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique et réciproquement

Soit z un complexe non nul de forme algébrique $z = x + iy$ (x et y sont réels). On note $|z| = r$ et $\theta = \arg(z)$.

$$\begin{cases} |z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos(\theta) = \frac{x}{r} = \frac{x}{|z|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{y}{r} = \frac{y}{|z|} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

Exercice 7 : Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants, puis les écrire sous forme trigonométrique.

$$z_1 = -1 - i$$

$$z_2 = -17$$

$$z_3 = 5i$$

$$z_4 = -6\sqrt{3} + 6i$$

$$z_1 = |z_1| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

$$|z_1| = |-1-i| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\theta) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right\} \theta = -\frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$z_2 = |z_2| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

$$|z_2| = |-17| = 17$$

$$\cos(\theta) = \frac{-17}{17} = -1$$

$$\sin(\theta) = \frac{0}{17} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\theta) = -1 \\ \sin(\theta) = 0 \end{array} \right\} \theta = \pi [2\pi]$$

$$z_2 = -17 (\cos(\pi) + i \sin(\pi))$$

$$z_3 = |z_3| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

$$|z_3| = |5i| = \sqrt{5^2} = 5$$

$$\cos(\theta) = \frac{0}{5} = 0$$

$$\sin(\theta) = \frac{5}{5} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\theta) = 0 \\ \sin(\theta) = 1 \end{array} \right\} \theta = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$z_3 = 5 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

$$z_4 = |z_4| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

$$|z_4| = |-6\sqrt{3} + 6i| = \sqrt{(-6\sqrt{3})^2 + 6^2} = \sqrt{144} = 12$$

$$\cos(\theta) = \frac{-6\sqrt{3}}{12} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \theta = \frac{5\pi}{6} [2\pi]$$

$$z_4 = 12 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

2. Déterminer la forme algébrique du complexe de module $\sqrt{5}$ et dont un argument est $\frac{2\pi}{3}$.

3. Déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe $z = -4(\cos(\frac{\pi}{5}) + i\sin(\frac{\pi}{5}))$

2. $z = \sqrt{5}(\cos(\frac{2\pi}{3}) + i\sin(\frac{2\pi}{3})) = \sqrt{5}(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{15}}{2}i$

3. $z = -4(\cos(\frac{\pi}{5}) + i\sin(\frac{\pi}{5})) = 4(-\cos(\frac{\pi}{5}) - i\sin(\frac{\pi}{5}))$


Propriété : Pour tout réel α , on a :

$$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin(\alpha)$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin(\alpha)$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos(\alpha)$$



3) Règles de calculs sur les arguments

z et z' soit deux nombres complexes non nuls, n est un entier naturel non nul.

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
- $\arg(\frac{z'}{z}) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$
- $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) [2\pi]$

Exercice 8 : a) Déterminer la forme algébrique de $z = (1-i)(-\sqrt{3}+i)$

b) Déterminer la forme trigonométrique de $1-i$ et de $-\sqrt{3}+i$ et en réduire la forme trigonométrique de z .

c) Dédire des deux questions précédentes les valeurs exactes de $\cos(\frac{7\pi}{12})$ et $\sin(\frac{7\pi}{12})$.

a) $z = (1-i)(-\sqrt{3}+i) = -\sqrt{3}+i + \sqrt{3}i+1 = 1-\sqrt{3} + (1+\sqrt{3})i$

$$b) |1-i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \sin(\theta) = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right\} \theta = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$\text{donc } 1-i = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$|- \sqrt{3} + i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos(\theta) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \sin(\theta) = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \theta = \frac{5\pi}{6} [2\pi]$$

$$\text{donc } -\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

$$\arg(z) = \arg(1-i) + \arg(-\sqrt{3} + i) [2\pi]$$

$$\arg(z) = -\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{6} [2\pi] = -\frac{3\pi}{12} + \frac{10\pi}{12} [2\pi] = \frac{7\pi}{12} [2\pi]$$

$$|z| = |1-i| \cdot |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$$

$$z = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right)$$

$$3. 1 - \sqrt{3} + (1 + \sqrt{3})i = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right)$$

$$\Leftrightarrow 1 - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \text{ et } 1 + \sqrt{3} = 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \text{ et } \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ et } \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Propriété: A, B et C sont trois points d'affixes respectives z_A, z_B et z_C tel que $z_A \neq z_B$ et $z_A \neq z_C$.

$$\text{Alors } (\vec{AB}, \vec{BC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_C - z_A}\right) [2\pi]$$

Exercice 9: A, B et C sont les points d'affixes respectives :

$$a = 1 - 2i$$

$$b = 5 + i$$

$$c = -2 + 2i$$

Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ et en déduire la nature du triangle ABC.

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{-2+2i-1+2i}{5+i-1+2i} = \frac{-3+4i}{4+3i} = \frac{(-3+4i)(4-3i)}{(4+3i)(4-3i)} = \frac{-12+9i+16i-12i^2}{16-9i^2} = \frac{-12+25i+12}{25} = \frac{25i}{25} = i$$

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{|c-a|}{|b-a|} = |i| = 1 \quad \text{Donc } CA = BA, \text{ donc } ABC \text{ est isocèle.}$$

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = (\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]. \text{ Donc } ABC \text{ est rectangle.}$$

Ainsi, le triangle ABC est isocèle rectangle.

IV. Formes exponentielles

1) Exponentielle complexe

Définition : Pour tout réel θ , on définit l'exponentielle complexe de θ par :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Ainsi $e^{i\theta}$ est le nombre complexe de module 1 dont un argument est θ .
En d'autres termes, le cercle trigonométrique de centre l'origine O du repère est l'ensemble des points d'abscisses $e^{i\theta}$ où θ décrit \mathbb{R} .

Exemples :

$$\bullet e^{i0} = e^{i2\pi} = 1$$

$$\bullet e^{i\pi} = -1$$

$$\bullet e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$\bullet e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$$

$$\bullet e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2) Formes exponentielles

Tout nombre complexe $z \neq 0$ admet une forme trigonométrique $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.
On peut donc écrire $z = |z|e^{i\theta}$.

Définition : Une forme exponentielle d'un nombre complexe $z \neq 0$ dont un

argument est θ , est l'écriture $z = |z|e^{i\theta}$.

Propriétés: Pour tous nombres réels θ et θ' , pour tout nombre entier naturel n :

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) = \theta [2\pi]$

- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$

- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ (Formule de Moivre)

- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)}$

- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$

- $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$ si, et seulement si, $\theta = \theta' [2\pi]$

Exemple: Le nombre $z = -2e^{i\frac{\pi}{3}}$ n'est pas écrit sous forme exponentielle. Pour l'écrire sous forme exponentielle, on peut utiliser le fait que $e^{i\pi} = -1$. Alors $z = 2e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i(\pi+\frac{\pi}{3})} = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$

Propriétés: Pour tout réel θ et pour tout entier relatif n :

- Formule de Moivre: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

- Formule d'Euler: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Démonstrations:

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\begin{cases} |e^{i\theta}| = 1 \\ \arg(e^{i\theta}) = \theta [2\pi] \end{cases}$ alors $\begin{cases} |(e^{i\theta})^n| = |(e^{i\theta})|^n = 1 \\ \arg((e^{i\theta})^n) \equiv n \cdot \arg(e^{i\theta}) \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$

on peut écrire $(e^{i\theta})^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$. Par suite, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on pose $n' = -n$ alors $n' \in \mathbb{N}$. Comme $e^{i\theta} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$, on a:

$$\begin{cases} \left| \frac{1}{e^{in'\theta}} \right| = \frac{1}{|e^{in'\theta}|} = 1 \\ \arg\left(\frac{1}{e^{in'\theta}}\right) \equiv -\arg(e^{in'\theta}) \equiv -n' \arg(e^{i\theta}) \equiv -n'\theta \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

- Pour tout réel θ , on a $\begin{cases} e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \\ e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta) \end{cases}$

Par somme, $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos(\theta)$ soit $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

Par différence, $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ soit $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

• Conséquences

Formules d'addition :

Pour tous réels a et b , on a :

- $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$
- $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$

Démonstration : Comme $e^{ia} \times e^{ib} = e^{i(a+b)}$, en passant à la forme algébrique on obtient :

$(\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) = \cos(a+b) + i \sin(a+b)$, en développant :

$$(\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)) + i(\cos(a)\sin(b) + \sin(a)\cos(b)) = \cos(a+b) + i \sin(a+b)$$

Formule de duplication :

Pour tout réel a , on a :

- $\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$
- $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$