

Cirugía de estrabismo en pacientes adultos

La corrección de estrabismo en un adulto es un procedimiento que restablece la apariencia de una persona que ha sido afectada por la enfermedad.

Por Alta Visión

El tratamiento para el estrabismo consiste en el uso de gafas, parches, terapias o una combinación de estos tratamientos. Otras veces, la cirugía del músculo del ojo es necesaria para enderezar los ojos.



Siendo la desviación del alineamiento de un ojo con relación al otro, el estrabismo se presenta por la **falta de coordinación** entre los músculos oculares, impidiendo fijar la mirada de ambos ojos en un mismo punto. Además de ser un problema visual, se considera un problema estético debido al aspecto del ojo desviado. En los pacientes con estrabismo los ojos no miran al mismo sitio, un ojo dirige la mirada al objeto de su atención mientras que el otro se desvía en otra dirección sin poder ejercer control.

Para lograr la alineación de los ojos mediante la cirugía de estrabismo, se recurre al **fortalecimiento** de algunos músculos de ojo y al debilitamiento de otros, para cambiar su fuerza efectiva sobre el globo ocular y lograr que los dos se dirijan hacia un **mismo punto**.

El estrabismo se puede presentar desde muy pequeños, incluso **desde el nacimiento** por sufrimiento fetal, infecciones, traumatismo, factores emocionales, disminución en la visión de un ojo respecto al otro o ambliopía. Lo padecen entre el 3% y 5% de la población infantil, afectando a ambos sexos por igual y es frecuente cuando hay algún antecedente familiar. También puede ser secundario a enfermedades cerebrales.

Al realizarse el procedimiento quirúrgico para corregir el estrabismo, se debe tener en cuenta que es un procedimiento **relativamente seguro**, pero como en toda cirugía es conveniente tomar algunas

medidas de seguridad, sobre todo si se realiza bajo



anestesia general o si se trata de un niño.

Esta cirugía restaura la apariencia normal y además se considera **reconstructiva**, mejora la percepción de profundidad o de la visión binocular, mejora visión periférica, eliminando o minimizando la visión doble y logra una mejor función social ya que el contacto visual es fundamental en la comunicación humana.



Recuerde que este tipo de afectaciones pueden empeorar con el tiempo y afectar no solo su vida personal, sino también laboral y social. No existe **ninguna edad** en la cual se tenga que tolerar un estrabismo, incluso de adulto si se puede lograr su corrección.



más información en:

6164585 Opción 5

www.altavision.com.co