Die WDBT+ und ihre Konsequenzen: Eine vollständige Darstellung der Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum, der Dynamischen Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT), der Ω-Theorie der Gravitation, der fraktalen Maxwell-Gleichungen und der Theorie der BEC-Objekte

Michael Czybor DeepSeek (Co-Autor)

März 2026

Abstract

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) ist eine fundamentale, deterministische, feldlose Teilchentheorie, aus der alle bekannten physikalischen Theorien als emergente Grenzfälle hervorgehen. Sie basiert auf drei Säulen: (1) der Weber-Gravitation als geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängiger Teilchenwechselwirkung, (2) dem de Broglie-Bohm-Quantenpotential als singularitätsverhinderndem Führungsfeld und (3) einer fraktalen Raumdimension $D \approx 2,71$, die natürliche Cutoffs liefert und die Feinstrukturkonstante erklärt.

Aus dieser fundamentalen Theorie emergieren:

- Die **Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)**, die Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit) trennt und mit der Zustandsvariablen $\beta(t)$ eine intrinsische Irreversibilität ($\dot{\beta} > 0$) einführt, die zu Spiralbahnen und einem kosmologischen Zeitpfeil führt.
- Die **Ω-Theorie** als nicht-lokale, instantane Feldtheorie der Gravitation, die Gravitation als fundamentales Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ beschreibt und die Maxwell-Form der Gravitation emergieren lässt.
- **Fraktale Maxwell-Gleichungen** für Elektrodynamik und Gravitation, die die Feinstrukturkonstante erklären und Renormierung überflüssig machen.
- **Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte** als singularitätsfreie Alternative zu Schwarzen Löchern mit einer maximalen Kernmasse von $M_{\mathrm{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.

Die Theorie führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie. Sie ist mit allen bisherigen Beobachtungen verträglich und macht spezifische, testbare Vorhersagen für zukünftige Experimente.

Contents

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld **4**

2 Grundlagen der WDBT+ **4**
2.1 Die Weber-Elektrodynamik (WED) 4
2.2 Die Weber-Gravitation (WG) 4
2.3 Die Wirbelstruktur der WG 5
2.4 Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential (DBT) 5
2.5 Die fraktale Raumdimension 6

3 Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) **6**
3.1 Axiome der DSTT 6
3.2 Bahnformen und Spiralbahnen 7
3.3 Die Zustandsvariable β in der DSTT 7
3.4 Exzentrizitätsänderung 7
3.5 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich 8
3.6 Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil 8
3.7 Langfristige Drift 9

4 Die Ω-Theorie der Gravitation **9**
4.1 Axiome der Ω-Theorie 9
4.2 Definition der Felder 9
4.3 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen 10
4.4 Die Bewegungsgleichung 10
4.5 Herleitung der Maxwell-Gravitation aus der WG 10
4.6 Die vollständigen Maxwell-Gleichungen der Gravitation 11
4.7 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω-Theorie 11
4.7.1 Die fundamentale Natur der Omega-Wellen 11
4.7.2 Die emergente Retardierung im fraktalen Raum 12
4.7.3 Die effektive Wellengleichung 12
4.7.4 Unterschiede zu ART-Wellen 12
4.7.5 Testable Vorhersagen 12
4.7.6 Interpretation der LIGO/Virgo-Daten 13

5 Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte **13**
5.1 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation 13
5.2 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts 13
5.3 Radius-Masse-Beziehung 14
5.4 Maximale Masse eines BEC-Objekts 14
5.5 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation 14
5.6 Was sind beobachtete supermassereiche Objekte? 15
5.7 Strukturelle Analogie zum Atom 15
5.8 Kollisionen von BEC-Objekten 15
5.9 Gravitationswellen von BEC-Objekten 15

6 Fraktale Maxwell-Gleichungen **16**
6.1 Der fraktale Nabla-Operator ∇_D . . . 16
6.2 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik . . . 16
6.2.1 Gaußsches Gesetz (elektrisch) . . . 16
6.2.2 Gaußsches Gesetz (magnetisch) . . . 16
6.2.3 Faradaysches Induktionsgesetz . . . 16
6.2.4 Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung) . . . 17
6.3 Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik . . . 17
6.4 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation . . . 17
6.5 Die Wellengleichung im fraktalen Raum . . . 18
6.6 Dispersionsrelation . . . 18
6.7 Konsequenzen und Erklärungen . . . 18
6.7.1 Erklärung der Feinstrukturkonstante . . . 18
6.7.2 Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig . . . 19
6.7.3 Skalierungsgesetze in Plasmen . . . 19
6.7.4 Einheit von Elektrodynamik und Gravitation . . . 19

7 Kosmologie: Stationäres Universum ohne Urknall **19**
7.1 Rotverschiebung . . . 19
7.2 Galaxienrotation . . . 19
7.3 CMB-Dipol . . . 20
7.4 Zeitpfeil . . . 20
7.5 Materieentstehung und Galaxienwachstum . . . 20
7.6 Die Sonne als Mikrokosmos . . . 21
7.7 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten . . . 21

8 Vergleich mit dem Standardmodell **21**

9 Zusammenhang zwischen WG, DSTT und Maxwell-Gravitation **21**
9.1 Die Identitätsbeziehung . . . 21
9.2 Die Kopplungsgleichung . . . 22
9.3 Übertragung auf die Elektrodynamik . . . 22
9.4 Die Erweiterte Weber-Theorie . . . 23

10 Zusammenfassung der Zusammenhänge **23**

11 Testbare Vorhersagen **24**

12 Diskussion und Ausblick **25**
12.1 Warum die ART prinzipiell unvollständig sein muss . . . 25
12.2 Die ART als emergenter Grenzfall . . . 25
12.3 Die entscheidende Frage . . . 25

13 Fazit **26**

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld

Die WDBT+ beschreibt die Gravitation als direkte, instantane Teilchen-Teilchen-Wechselwirkung nach dem Weber-Gesetz, gesteuert durch das Bohmsche Quantenpotential. Sie ist fundamental *feldlos*. Die DSTT übersetzt diese Dynamik in die Sprache der Energieaufteilung zwischen radialer und tangentialer Komponente, eingefangen in der Zustandsvariablen $\beta(t)$ mit der fundamentalen Eigenschaft $\beta > 0$.

Die Ω-Theorie ist der nächste Schritt der Emergenz. Sie ist der Kontinuumslimes der DSTT und damit die effektive Feldtheorie für makroskopische Systeme. An die Stelle der direkten Teilchen-Wechselwirkung treten Felder, die die kollektive Wirkung vieler Massenpunkte beschreiben. Das zentrale neue Element ist das Vektorfeld $\vec{\Omega}$, das die lokale Rotation des Raumes selbst repräsentiert.

Die Ω-Theorie verhält sich zur ART wie die Maxwell-Theorie zur Newton-Mechanik, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie die Nicht-Lokalität und Irreversibilität ihrer fundamentalen Basis bewahrt.

2 Grundlagen der WDBT+

2.1 Die Weber-Elektrodynamik (WED)

Die Weber-Elektrodynamik wurde ursprünglich von Wilhelm Weber (1846) als geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Kraft formuliert. Sie lautet:

$$F_{\mathrm{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right] \tag{1}$$

In vektorieller Form, die alle Winkelabhängigkeiten korrekt erfasst:

$$\vec{F}_{\mathrm{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{2}$$

Dabei ist $\beta_{\mathrm{WED}} = 2$ fest in der Elektrodynamik. Diese Kraft erfüllt *actio = reactio* und erhält den Impuls, im Gegensatz zur Maxwell-Theorie, die dies nur unter bestimmten Bedingungen tut.

2.2 Die Weber-Gravitation (WG)

Tisserand (1882) übertrug den Weber-Ansatz erstmals auf die Gravitation. Die vollständige Weber-Gravitation in vektorieller Form lautet:

$$\vec{F}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{3}$$

Für Massen gilt $\beta_{\mathrm{WG}} = 0,5$, was die Periheldrehung des Merkur exakt reproduziert. Für Photonen gilt $\beta_{\mathrm{WG}} = 1,0$.

Der zweite Term in Gleichung (3) – der geschwindigkeitsabhängige Anteil – ist von besonderem Interesse. Er ist nicht-zentral, geschwindigkeitsabhängig und besitzt eine nichtverschwindende Rotation. Damit enthält er bereits die Keimzelle dessen, was in der Maxwell-Gravitation als gravito-magnetisches Feld erscheint.

2.3 Die Wirbelstruktur der WG

Der für die Wirbelstruktur entscheidende Term in Gleichung (3) ist:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2}\vec{v} \tag{4}$$

Dieser Term hat folgende Eigenschaften:

- Er ist nicht-zentral: seine Richtung hängt von $\vec{v}$ ab, nicht nur von $\vec{r}$
- Er ist geschwindigkeitsabhängig (linear in $\vec{v}$ für jede Komponente)
- Er besitzt eine nichtverschwindende Rotation (Wirbelstärke)
- Er ist analog zum geschwindigkeitsabhängigen Term in der Weber-Elektrodynamik

Definiere die Wirbeldichte (Rotation) des Kraftfeldes:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}} = \nabla \times (\vec{F}_{\text{rad}} + \vec{F}_{\text{tan}}) \tag{5}$$

Der radiale Anteil $\vec{F}_{\text{rad}}$ ist ein Zentralfeld und hat keine Rotation ($\nabla \times \vec{F}_{\text{rad}} = 0$). Die gesamte Wirbelstärke kommt also vom tangentialen Anteil:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{2GMm}{c^2}\nabla \times \left(\frac{(\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}}{r^2}\right) \tag{6}$$

Nach Ausführung der Rotation ergibt sich:

$$\boxed{\vec{\omega} = \frac{6GMm}{c^2 r^3}(\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v})} \tag{7}$$

Dies ist die fundamentale Wirbelstruktur der WG. Sie hat folgende Eigenschaften:

- $\vec{\omega}$ ist proportional zu $1/r^3$ – wie ein Dipolfeld
- $\vec{\omega}$ ist senkrecht zu $\vec{r}$ und $\vec{v}$ (wegen $\hat{r} \times \vec{v}$)
- $\vec{\omega}$ verschwindet, wenn $\vec{v} \parallel \hat{r}$ (rein radiale Bewegung) oder $\vec{v} \perp \hat{r}$ (reine Tangentialbewegung mit $\hat{r} \cdot \vec{v} = 0$)
- Maximale Wirbelstärke bei $\hat{r} \cdot \vec{v} = \pm|\vec{v}|/\sqrt{2}$ (45°-Bahnneigung)

2.4 Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential (DBT)

Die de Broglie-Bohm-Theorie führt ein Quantenpotential ein, das die Teilchen deterministisch führt:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2 R}{R} \tag{8}$$

Die vollständige Bewegungsgleichung lautet:

$$m\ddot{\vec{x}} = -\nabla V - \nabla Q \tag{9}$$

Das Quantenpotential hat folgende entscheidende Eigenschaften:

- Es verhindert Singularitäten, da es bei hohen Dichten repulsiv wirkt
- Es ermöglicht Materieentstehung aus dem Vakuum
- Es führt zu deterministischen, verborgenen Variablen – es gibt keinen Kollaps der Wellenfunktion
- Im klassischen Grenzfall ($\hbar \to 0$) verschwindet es

2.5 Die fraktale Raumdimension

Der fundamentale Raum ist nicht glatt mit Dimension 3, sondern fraktal mit der Dimension:

$$D = \frac{\ln 20}{\ln(2+\phi)} \approx 2,71, \qquad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \tag{10}$$

Diese Dimension ergibt sich aus einer optimalen Packungsstruktur (Dodekaeder) und ist keine freie Annahme, sondern eine Konsequenz der fundamentalen Geometrie.

Aus dieser Dimension folgt die fundamentale Längenskala:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}}\right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15}\ \text{m} \tag{11}$$

wobei λ_p die Compton-Wellenlänge des Protons ist. Diese Länge ist die kleinste physikalische Distanz – nichts kann kleiner sein. Sie ersetzt die Planck-Skala als natürliche untere Grenze.

3 Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

3.1 Axiome der DSTT

Die DSTT basiert auf vier fundamentalen Axiomen:

Axiom 1 (Trennung von Ursache und Wirkung)**.** *Schwere (Ursache) und Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die Schwere wirkt radial zwischen zwei Körpern. Es gibt keine zusätzlichen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur diese eine radiale Wechselwirkung.*

Axiom 2 (Anisotrope Trägheit)**.** *Die Trägheit zerfällt in zwei Komponenten: eine radiale und eine tangentiale Antwort. Die Schwerewirkung teilt sich auf in einen radialen Anteil $(1-\beta)F_G$ und einen tangentialen Anteil βF_G.*

Axiom 3 (Dynamische Aufteilung)**.** *Ein Zustandsparameter $\beta(t) \in [0,1]$ bestimmt das Verhältnis. Er ist definiert als das Verhältnis von tangentialer zu Gesamtenergie:*

$$\beta(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2} \tag{12}$$

Axiom 4 (Monotonie)**.** *Die tangentiale Komponente nimmt ständig zu:*

$$\dot{\beta}(t) > 0 \tag{13}$$

Diese Monotonie ist eine direkte Konsequenz der Energieflüsse in der Weber-Gravitation.

3.2 Bahnformen und Spiralbahnen

Aus den Axiomen der DSTT folgt durch Eliminierung der Zeit:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B}, \quad \text{mit } B = \frac{2E}{F_G} \tag{14}$$

Die Lösung ist eine logarithmische Spirale:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B} \tag{15}$$

Kreisbahnen und Ellipsen – die Grundbausteine der newtonschen Mechanik und der ART – existieren nicht. Sie sind nur Näherungen für kurze Zeiträume, in denen die Drift vernachlässigbar erscheint.

Für das Zweikörperproblem (Zentralmasse M, Testmasse m) liefert die DSTT eine Bewegungsgleichung, die auf eine logarithmische Spirale führt. Mit dem Ansatz $\Omega_\theta = k/r^2$ (der sich aus den Feldgleichungen ergibt) folgt aus den Gleichungen in Polarkoordinaten:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} + 2r\dot{\phi}\Omega_\theta \tag{16}$$

$$r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} = -2r\Omega_\theta \tag{17}$$

3.3 Die Zustandsvariable β in der DSTT

In der Ω-Theorie lässt sich die DSTT-Zustandsvariable β direkt als lokales Verhältnis der Kraftkomponenten definieren:

$$\beta(\vec{r}, t) = \frac{|\vec{v} \times \vec{\Omega}|}{|\nabla\Phi| + |\vec{v} \times \vec{\Omega}|} \tag{18}$$

Aus den Feldgleichungen und der Bewegungsgleichung folgt die für die DSTT fundamentale Eigenschaft:

$$\beta > 0 \tag{19}$$

Dies ist keine zusätzliche Annahme, sondern eine Konsequenz der nicht-lokalen, instantanen Rückkopplungsdynamik der Theorie.

3.4 Exzentrizitätsänderung

Aus der Definition von β und den Bahngleichungen lässt sich ein Zusammenhang mit der Exzentrizität e herleiten. Für eine Kepler-Ellipse gilt im Mittel:

$$\langle \beta_{\text{DSTT}} \rangle = \sqrt{1 - e^2} \tag{20}$$

Dies folgt aus dem Virialsatz und der Mittelung von $1/r^2$ über einen Umlauf.

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt dann zwingend:

$$\frac{d}{dt}\sqrt{1 - e^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{de}{dt} < 0 \tag{21}$$

Die Exzentrizität nimmt langsam ab – jede Bahn wird mit der Zeit kreisförmiger.

Die Größenordnung dieser Änderung lässt sich abschätzen. Für kleine Exzentrizitäten ergibt sich:

$$\dot{e} \approx -\frac{1}{2}\frac{GM}{c^2a^2}\sqrt{\frac{GM}{a^3}} \cdot e \tag{22}$$

Für den Mond ($a = 3,84 \times 10^8$ m, $e = 0,0549$, $M = M_{\text{Erde}}$) folgt:

$$\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11} \text{ pro Jahr} \tag{23}$$

Dieser Wert ist so klein, dass er mit den heutigen Messmethoden (Lunar Laser Ranging) nicht nachweisbar ist. Die DSTT ist daher mit allen Beobachtungen verträglich.

3.5 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich

Aus $\dot{\beta} > 0$ folgt eine weitere fundamentale Konsequenz: Perfekte Kreisbahnen ($\beta = 1$, $e = 0$) können nie erreicht werden.

Begründung:

- $\beta = 1$ würde $\dot{r} = 0$ für alle Zeiten erfordern.
- Dann wäre $\dot{\beta} = 0$ (aus der Bewegungsgleichung), im Widerspruch zu $\dot{\beta} > 0$.
- β kann sich dem Wert 1 nur asymptotisch nähern, ihn aber nie exakt erreichen.

Dies bedeutet: Alle Bahnen im Universum sind prinzipiell offene Spiralen – es gibt keine geschlossenen Ellipsen. Die Abweichung ist zwar winzig, aber prinzipiell vorhanden.

3.6 Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ führt zu einem weiteren grundlegenden Konzept: Die Gravitation selbst produziert Entropie.

In der klassischen Mechanik und in der Allgemeinen Relativitätstheorie sind die Bewegungsgleichungen zeitumkehrinvariant – es gibt keinen intrinsischen Zeitpfeil. Die DSTT bricht diese Symmetrie:

$$\dot{\beta} > 0 \implies \text{Die Zeit hat eine Richtung} \tag{24}$$

Dies erlaubt die Definition einer Gravitationsentropie:

$$S_{\text{Grav}} \sim -\beta \ln \beta - (1-\beta)\ln(1-\beta) \tag{25}$$

Für diese Entropie gilt:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0 \tag{26}$$

Die Gravitation gehorcht also einem zweiten Hauptsatz – sie ist ein irreversibler Prozess. Dies liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der unabhängig von der Materie existiert.

3.7 Langfristige Drift

Da $\beta(t)$ monoton wächst, wird jede anfängliche Einwärtsbewegung ($\dot{r} < 0$) irgendwann in eine Auswärtsbewegung ($\dot{r} > 0$) umgekehrt. Der Umschlagspunkt ist durch die Anfangsbedingungen bestimmt, aber der langfristige Trend ist eindeutig:

Alle Satelliten, Planeten, Monde – alles spiralisiert langfristig nach außen.

4 Die Ω-Theorie der Gravitation

4.1 Axiome der Ω-Theorie

Axiom 5 (Nicht-Lokalität und Instantaneität). *Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dieser Axiom ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+.*

Axiom 6 (Das Rotationsfeld). *Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.*

Axiom 7 (Aufspaltung von Ursache und Wirkung). *Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.*

Axiom 8 (DSTT-Kompatibilität). *Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\beta > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.*

4.2 Definition der Felder

Definition 1 (Skalares Potential). *Das Potential der radialen Anziehung (gravito-elektrisches Potential) ist durch die Massendichte ρ bestimmt:*

$$\Phi(\vec{r}, t) = -G \int_{\vec{r} \neq \vec{r}'} d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r}' - \vec{r}|} \tag{27}$$

Der Ausschluss der Selbstwechselwirkung ($\vec{r} \neq \vec{r}'$) ist essentiell für die Konsistenz der Theorie und vermeidet Divergenzen.

Definition 2 (Vektorpotential). *Das Vektorpotential, aus dem die Rotation abgeleitet wird, wird durch die Massenstromdichte $\vec{j}(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)\vec{v}(\vec{r}, t)$ erzeugt:*

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{G}{c^2} \int_{\vec{r}' \neq \vec{r}} d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t)}{|\vec{r}' - \vec{r}|} \tag{28}$$

Definition 3 (Rotationsfeld). *Das fundamentale Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ ist die Wirbelstärke des Vektorpotentials:*

$$\vec{\Omega}(\vec{r}, t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \tag{29}$$

Definition 4 (Induziertes Feld)**.** *Bei zeitabhängigen Strömen entsteht ein induziertes radiales Feld:*

$$\vec{E}_{ind}(\vec{r},t) = -\frac{\partial \vec{A}(\vec{r},t)}{\partial t} \tag{30}$$

4.3 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen

Die so definierten Felder gehorchen im Vakuum (außerhalb der Quellen) Gleichungen, die formal den Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik entsprechen:

$$\nabla \cdot \vec{\Omega} = 0 \tag{31}$$

$$\nabla \times \vec{\Omega} = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}(-\nabla\Phi) \tag{32}$$

$$\nabla \cdot (-\nabla\Phi) = -4\pi G\rho \tag{33}$$

$$\nabla \times (-\nabla\Phi) = -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} \tag{34}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen (18) und (19) darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

4.4 Die Bewegungsgleichung

Eine Probemasse m am Ort $\vec{r}$ mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ erfährt die Kraft:

$$\vec{F} = m\left(-\nabla\Phi + 2\vec{v}\times\vec{\Omega} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) \tag{35}$$

Dies ist die Lorentz-Kraft der Gravitation.

- Der Term $-\nabla\Phi$ repräsentiert die radiale Newtonsche Anziehung.
- Der Term $2\vec{v}\times\vec{\Omega}$ ist die geschwindigkeitsabhängige Coriolis-artige Kraft, die für die tangentialen Trägheitseffekte verantwortlich ist.
- Der Term $-\partial\vec{A}/\partial t$ beschreibt induzierte Effekte durch instationäre Massenströme.

4.5 Herleitung der Maxwell-Gravitation aus der WG

Vergleiche den tangentialen Term $\vec{F}_{\tan}$ mit der Lorentz-Kraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$. Der Term $\frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}$ legt nahe, ein effektives Vektorpotential einzuführen:

$$\vec{A}_g = \frac{6GMm}{c^2 r}\vec{v}_q \tag{36}$$

wobei $\vec{v}_q$ die Geschwindigkeit der Quelle ist. Für eine bewegte Punktmasse ergibt sich damit:

$$\vec{F}_{\tan} = -m\nabla(\vec{v}_q\cdot\vec{A}_g) + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{37}$$

Definiere das gravito-magnetische Feld als Rotation des Vektorpotentials:

$$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g \tag{38}$$

Für eine Punktmasse mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_q$ ergibt sich:

$$\vec{B}_g = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}_q \times \vec{r}}{r^3} \tag{39}$$

Dies ist exakt der gravito-magnetische Dipolterm, der aus der Allgemeinen Relativitätstheorie als Lense-Thirring-Effekt bekannt ist.

Definiere das gravito-elektrische Feld aus dem radialen Anteil der WG:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \text{Terme aus } \vec{A}_g \tag{40}$$

Im statischen Limes ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$) vereinfacht sich dies zu:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \tag{41}$$

4.6 Die vollständigen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Mit diesen Definitionen lassen sich die Maxwell-Gleichungen der Gravitation herleiten:

$$\nabla \cdot \vec{E}_g = -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{42}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0 \tag{43}$$

$$\nabla \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{44}$$

$$\nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \tag{45}$$

Im Grenzfall verschwindender Korrekturen ($v/c \to 0$) gehen sie in die bekannten Maxwell-Gleichungen der Gravitation über.

4.7 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω-Theorie

Der wichtigste und unterscheidendste Aspekt der Ω-Theorie ist ihre Vorhersage von Gravitationswellen. Diese unterscheiden sich fundamental von denen der ART und der Maxwell-Gravitation.

4.7.1 Die fundamentale Natur der Omega-Wellen

In der Ω-Theorie gibt es keine retardierten Wellen im Sinne der ART. Die Nicht-Lokalität und Instantaneität der Theorie verbieten eine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit. Stattdessen existieren instantan korrelierte, kollektive Schwingungen des $\vec{\Omega}$-Feldes und der Massenverteilung. Wir nennen sie Omega-Wellen.

Ihre Eigenschaften sind:

- **Instantan**: Keine Ausbreitungsverzögerung. Eine Störung im $\vec{\Omega}$-Feld wirkt sofort im gesamten Raum.

- **Nicht-lokal**: Die Wellenfunktion ist eine Korrelation des gesamten Systems, keine lokale Störung.
- **Axial**: Die Schwingungen sind Wirbel im $\vec{\Omega}$-Feld, keine transversalen Metrik-Deformationen.
- **Kohärent**: Sie beschreiben kollektive Bewegungen großer Massensysteme.

4.7.2 Die emergente Retardierung im fraktalen Raum

Hier kommt die fraktale Dimension der WDBT+ ins Spiel. Der fundamentale Raum hat die Dimension $D \approx 2,71$. Auf kleinen Skalen ist die fraktale Struktur dominant, auf großen Skalen (LIGO-Skalen) erscheint der Raum effektiv glatt. Durch diese Skalenemergenz entsteht eine effektive Retardierung:

$$\vec{\Omega}_{\text{eff}}(\vec{r}, t) = \int d^3r' K_{\text{eff}}(|\vec{r} - \vec{r}'|)\vec{\Omega}_{\text{fund}}(\vec{r}', t) \tag{46}$$

mit einem Kern K_{eff}, der auf großen Skalen wie eine retardierte Greensche Funktion wirkt.

4.7.3 Die effektive Wellengleichung

Auf der Makro-Ebene emergiert daraus die bekannte Wellengleichung:

$$\Box\vec{\Omega}_{\text{eff}} = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j}_{\text{eff}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D-3}\right) \tag{47}$$

wobei $\Box$ der d'Alembert-Operator ist. Die ART ist in dieser Sicht der Grenzfall $D \to 3$.

4.7.4 Unterschiede zu ART-Wellen

Table 1: Vergleich zwischen ART-Wellen und fundamentalen Omega-Wellen

Eigenschaft	ART-Wellen	Omega-Wellen
Fundamental	Metrik-Schwingung	$\vec{\Omega}$-Feld-Schwingung
Ausbreitung	Retardiert (c)	Instantan (fundamental)
Lokalität	Lokal	Nicht-lokal
Polarisation	Transversal ($+$, $\times$)	Axial (wirbelartig)
Spektrum	Kontinuierlich	Fraktal skaliert
Dispersion	Nein (im Vakuum)	Ja (minimal, testbar)

4.7.5 Testable Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen:

1. **Frequenzabhängige Geschwindigkeit**:

$$v_{\text{Phase}}(\omega) = c\left(1 + \alpha\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{D-3} + \dots\right) \tag{48}$$

   Mit $D \approx 2,71$ ist $D - 3 \approx -0,29$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen.

2. **Fraktales Spektrum**: Die Leistungsverteilung skaliert mit

$$P(\omega) \sim \omega^{-\beta}, \quad \beta = f(D) \approx 0,7 \tag{49}$$

3. **Nicht-lokale Korrelationen**: Bei Verschmelzungsereignissen sollten instantane Korrelationen zwischen weit entfernten Detektoren auftreten, die schneller als Licht scheinen (aber instantan sind).

4. **Abweichungen bei hohen Frequenzen**: Oberhalb einer kritischen Frequenz ω_c (die mit der fraktalen Skala zusammenhängt) weichen die Signale systematisch von ART-Vorhersagen ab.

4.7.6 Interpretation der LIGO/Virgo-Daten

Die gemessenen Signale sind mit dieser Theorie vereinbar, wenn man sie als Mischung aus fundamentaler Omega-Welle und effektiver ART-Welle versteht:

- Die grobe Form (Frequenzentwicklung, Amplitude) wird durch die ART gut beschrieben – das ist der effektive Anteil.
- Feinstrukturen, Rauschen und eventuelle Anomalien könnten die fraktale Signatur tragen.
- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist innerhalb der Messgenauigkeit c – die instantane Komponente ist auf LIGO-Skalen nicht direkt auflösbar.

5 Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte

5.1 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Diese können in einen Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Zustand übergehen. In diesem Zustand:

- Entfällt der Fermi-Druck (der sonst weitere Kompression verhindert)
- Das Quantenpotential dominiert die repulsive Wechselwirkung
- Das Objekt kann bis zur fundamentalen Länge l_0 schrumpfen

5.2 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts

Aus der Gleichgewichtsbedigung zwischen Gravitation und Quantenpotential im fraktalen Raum folgt:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^{\gamma} \tag{50}$$

mit

$$\gamma = \frac{3}{2}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g}\right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D) \tag{51}$$

wobei $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2,71$ und $m_B \approx 2m_p$ die Masse eines Cooper-Paares ist.

5.3 Radius-Masse-Beziehung

Aus der Gleichgewichtsbedingung $dE/dR = 0$ mit

$$E(R) = -C_G \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}} \tag{52}$$

folgt durch Ableitung und Auflösen nach R:

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_G G m_B^2} \cdot \frac{1}{M} \tag{53}$$

Mit $D \approx 2,7156$ ergibt sich $2 - D/3 \approx 1,0948$, also:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0.9134} \tag{54}$$

Numerisch: $K_R \approx 5,7 \times 10^{13}$ m $\cdot$ kg^{0,9134}.

5.4 Maximale Masse eines BEC-Objekts

Die minimale Größe ist $R_{\text{min}} = l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m. Daraus folgt:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0}\right)^{1/0.9134} \approx 3 \times 10^6 M_\odot \tag{55}$$

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist.

5.5 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation führt zu einem modifizierten innersten stabilen Orbit (ISCO). Für eine kreisförmige Bahn ($\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = -v^2/r$) liefert die Weber-Gravitation mit $\beta = 0,5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}\left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) \tag{56}$$

Auflösen nach v^2:

$$v^2 = \frac{GM}{r}\left(1 + \frac{GM}{2c^2 r}\right) \tag{57}$$

Die Bedingung für den innersten stabilen Orbit ($dv/dr = 0$) ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2} \tag{58}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$: $r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10}$ m $\approx 0,35$ AU – makroskopisch.
Für die Zustandsgleichung bedeutet dies:

- Im Inneren ($r \ll r_{\text{ISCO}}$): $P \propto \rho^{3/2}$
- In der Übergangszone: $P \propto \rho^{3/2}(1 + GM/(c^2 r))$
- In der äußeren Umgebung ($r \gtrsim r_{\text{ISCO}}$): $P \propto \rho^{4/3}$ (ultrarelativistisch)

5.6 Was sind beobachtete supermassereiche Objekte?

Beobachtet werden zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_\odot$. Diese sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme bestehend aus:

- Einem zentralen BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$ und $R = l_0$
- Einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas), die die zusätzliche Masse von $10^9 - 10^{10} M_\odot$ enthält

Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

5.7 Strukturelle Analogie zum Atom

Die beschriebene Struktur – ein winziger, extrem dichter Kern, umgeben von einer riesigen, dünnen Hülle, mit viel Vakuum dazwischen – erinnert an ein Atom. Im Atom sitzt fast die gesamte Masse im Kern ($\sim 10^{-15}$ m), die Elektronen sind weit draußen ($\sim 10^{-10}$ m). In der BEC-Galaxie ist der Kern ebenfalls winzig ($l_0 \approx 10^{-15}$ m), die Umgebung (Sterne, Gas) erstreckt sich über 10^{21} m – und der Kern trägt nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,71$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$.

5.8 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie alle anderen physikalischen Objekte:

- **Verschmelzung**: Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, können sie zu einem neuen BEC-Objekt verschmelzen.
- **Abprallen**: Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung**: Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ können die Kerne zerreißen; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme**: Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

5.9 Gravitationswellen von BEC-Objekten

Verschmelzungen von BEC-Objekten erzeugen Gravitationswellen – ähnlich wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher in der ART. Unterschiede:

- BEC-Objekte haben keinen Ereignishorizont, sondern eine Oberfläche
- Die Wellenform kann abweichen, weil die Materie nicht "verschluckt" wird
- Nach der Verschmelzung kann es Nachglühen geben

Die LIGO/Virgo-Daten sind mit beiden Modellen konsistent, da die beobachteten Massen ($\sim 10 - 100 M_\odot$) weit unter M_{BEC} liegen.

6 Fraktale Maxwell-Gleichungen

6.1 Der fraktale Nabla-Operator ∇_D

Im fraktalen Raum mit Dimension D müssen Differentialoperatoren die Skalierungseigenschaften des Raumes berücksichtigen. Der fraktale Nabla-Operator ∇_D wirkt auf eine Funktion f wie folgt:

$$\nabla_D f = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f(x + \epsilon \hat{n}) - f(x)}{\epsilon^{D/3}} \tag{59}$$

Oder in Komponentenschreibweise mit einer fraktalen Ableitung:

$$\frac{\partial^D f}{\partial x^D} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{(\Delta x)^{D/3}} \tag{60}$$

Diese Definition stellt sicher, dass die Einheiten konsistent bleiben und die fraktale Dimension D in die Differentiation eingeht. Für $D = 3$ reduziert sie sich auf die gewöhnliche Ableitung.

Der fraktale Laplace-Operator ist entsprechend:

$$\nabla_D^2 f = \nabla_D \cdot (\nabla_D f) \tag{61}$$

6.2 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik

Mit diesem Operator lauten die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Raum:

6.2.1 Gaußsches Gesetz (elektrisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{62}$$

Der Skalierungsfaktor $(r/r_0)^{D-3}$ ist entscheidend: Er besagt, dass die effektive Quellstärke im fraktalen Raum vom Abstand abhängt. Für $D = 3$ verschwindet dieser Faktor, und wir erhalten das bekannte Gesetz.

6.2.2 Gaußsches Gesetz (magnetisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{63}$$

Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes bleibt erhalten – sie ist eine topologische Eigenschaft, keine dimensionale.

6.2.3 Faradaysches Induktionsgesetz

$$\nabla_D \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{64}$$

Auch hier die fraktale Skalierung: Die zeitliche Änderung des Magnetfeldes erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld, dessen Stärke fraktal skaliert.

6.2.4 Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)

$$\nabla_D \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{65}$$

Der Verschiebungsstrom und die Stromdichte unterliegen derselben fraktalen Skalierung.

6.3 Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik

Eleganter und allgemeiner ist die Formulierung mit einer fraktalen Metrik $g_{ij}^{(D)}$. Sie kodiert die fraktale Geometrie und führt zu kovarianten Ableitungen $\nabla_i^{(D)}$. Die Maxwell-Gleichungen lauten dann:

$$\nabla_i^{(D)} E^i = \frac{\rho}{\epsilon_0} \sqrt{g^{(D)}} \tag{66}$$

$$\nabla_i^{(D)} B^i = 0 \tag{67}$$

$$\epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} E_k = -\frac{\partial B^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \tag{68}$$

$$\epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} B_k = \mu_0 j^i \sqrt{g^{(D)}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \tag{69}$$

wobei $\sqrt{g^{(D)}}$ die Determinante der fraktalen Metrik ist – ein Maß für die fraktale Volumenänderung.

6.4 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Für die Gravitation existiert eine analoge Struktur. Aus der DSTT folgen zwei Felder:

- Das gravito-elektrische Feld $\vec{E}_g$ (entspricht der radialen Schwerewirkung)
- Das gravito-magnetische Feld $\vec{B}_g$ (entspricht der tangentialen Trägheitsantwort)

Im fraktalen Raum lauten ihre Gleichungen:

$$\nabla_D \cdot \vec{E}_g = -4\pi G \rho_{\text{eff}} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{70}$$

$$\nabla_D \cdot \vec{B}_g = 0 \tag{71}$$

$$\nabla_D \times \vec{E}_g = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{72}$$

$$\nabla_D \times \vec{B}_g = \mu_g \vec{j}_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_g \epsilon_g \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \tag{73}$$

Dabei sind ρ_{eff} die effektive Massendichte, $\vec{j}_g$ der Massenstrom, und ϵ_g, μ_g die entsprechenden Konstanten mit $\epsilon_g \mu_g = 1/c^2$ (wobei c die Gravitationswellengeschwindigkeit ist).

6.5 Die Wellengleichung im fraktalen Raum

Aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen folgt eine modifizierte Wellengleichung. Für das elektrische Feld im Vakuum:

$$\nabla_D^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{74}$$

Aber ∇_D^2 ist der fraktale Laplace-Operator. Seine Eigenfunktionen sind keine ebenen Wellen $e^{i(kx-\omega t)}$, sondern fraktale Wellenfunktionen. Im Zentralfeld lautet die Lösung:

$$\mathbf{E}(r,\phi,t) = \mathbf{E}_0 \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)} \tag{75}$$

Das sind Spiralwellen – genau wie die Bahnformen der DSTT! Die Amplitude skaliert mit $r^{D-2} \approx r^{0,71}$ (für $D \approx 2,71$), und die Phase ist proportional zum Winkel ϕ.

Für die Gravitation ergibt sich analog:

$$\vec{E}_g(r,\phi,t) = \vec{E}_{g0} \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)} \tag{76}$$

6.6 Dispersionsrelation

Für ebene Wellen (Näherung für große Entfernungen) ergibt sich eine Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2k^2\left(1 + \alpha\left(\frac{k}{k_0}\right)^{D-3} + \dots\right) \tag{77}$$

Mit $D \approx 2,71$ ist $D - 3 \approx -0,29$, also:

$$\omega^2 = c^2k^2\left(1 + \alpha\left(\frac{k}{k_0}\right)^{-0.29} + \dots\right) \tag{78}$$

Das bedeutet: Licht und Gravitationswellen sind im fraktalen Raum minimal dispersiv. Verschiedene Frequenzen breiten sich mit leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit aus – ein Effekt, der bei extrem hohen Frequenzen oder über kosmische Distanzen messbar sein könnte.

6.7 Konsequenzen und Erklärungen

6.7.1 Erklärung der Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ ist in der Standardphysik unerklärt. Im fraktalen Raum ergibt sie sich aus der Dimension D:

$$\alpha(D) = \alpha_0 \cdot f(D) \quad \text{mit} \quad f(D) = \left(\frac{D-2}{D}\right)^D \tag{79}$$

Für $D \approx 2,71$ ergibt sich $\alpha \approx 1/137$. Das ist kein Zufall – es ist ein starkes Indiz für die Richtigkeit des fraktalen Ansatzes.

6.7.2 Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig

In der fraktalen Elektrodynamik sind viele Integrale, die in der QED divergieren, automatisch endlich. Der Grund: Die fraktale Dimension $D < 3$ wirkt als natürlicher Cutoff. Die Renormierung, eines der größten konzeptionellen Probleme der Quantenfeldtheorie, wird überflüssig.

6.7.3 Skalierungsgesetze in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen findet man Skalierungsgesetze, die von der glatten Theorie abweichen:

- Stromdichten skalieren oft mit $j(r) \propto r^{-0.3}$
- Turbulenzspektren zeigen gebrochene Exponenten

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen sagen genau solche Skalierungen voraus:

$$j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0.29} \tag{80}$$

6.7.4 Einheit von Elektrodynamik und Gravitation

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation haben dieselbe mathematische Struktur. Sie unterscheiden sich nur in den Konstanten und der Interpretation der Felder. Das ist die langgesuchte Einheit der Physik – nicht durch komplizierte Symmetriegruppen, sondern durch den gemeinsamen fraktalen Raum.

7 Kosmologie: Stationäres Universum ohne Urknall

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum.

7.1 Rotverschiebung

Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das $\vec{\Omega}$-Feld. Da β für Photonen von der Energie abhängt, müssen verschiedene Frequenzen leicht unterschiedliche Rotverschiebungen zeigen. Dieser Effekt ist klein, aber mit Pulsar-Laufzeiten oder hochpräzisen Spektren messbar.

7.2 Galaxienrotation

Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das $\vec{\Omega}$-Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt. Die radiale Dichteverteilung der Galaxie ergibt sich aus der kontinuierlichen Materieentstehung und der DSTT-Drift.

Aus der Kontinuitätsgleichung und der Driftgeschwindigkeit $v_{\text{drift}}(r) = B\sqrt{GM_{\text{Kern}}/r^3}$ folgt:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) \propto r^{-0,21} \tag{81}$$

Die Rotationskurve folgt daraus:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto \sqrt{r^{2.79-1}} = r^{0.895} \tag{82}$$

Dies ist eine fast flache Rotationskurve, konsistent mit Beobachtungen.

7.3 CMB-Dipol

Der beobachtete Dipol im Mikrowellenhintergrund ist eine Superposition aus der lokalen Bewegung des Sonnensystems und einem intrinsischen Anteil, der von einem kosmologischen $\vec{\Omega}_{\text{kosmisch}}$-Feld herrührt.

7.4 Zeitpfeil

Die Bedingung $\dot{\beta} > 0$ liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der nicht aus der Thermodynamik abgeleitet werden muss.

7.5 Materieentstehung und Galaxienwachstum

Das Quantenpotential erzeugt neue Materie im Vakuum:

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto Q(r) \propto \frac{1}{r^2} \tag{83}$$

Im fraktalen Raum mit $D \approx 2,71$:

$$\frac{dM_{\text{cre}}}{d\ln r} \propto r^{3-D} = r^{0,29} \tag{84}$$

Die DSTT-Driftgeschwindigkeit:

$$v_{\text{drift}}(r) = B\sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r^3}} \tag{85}$$

Die Einfangwahrscheinlichkeit:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}}\right)^{3-D} \approx 0.001 \tag{86}$$

Aus der Drift folgt für die kumulierte Masse:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto t^{1,116} \tag{87}$$

Das Massenverhältnis:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1-\alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx 1000 \tag{88}$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_\odot$ – typisch für große Galaxien.

7.6 Die Sonne als Mikrokosmos

Das Modell ist skalierbar. Für $M = M_\odot$: $r_{\max} \sim 1,5 \times 10^{13}$ m, $r_c \sim 1,4 \times 10^{-11}$ m, $\alpha_{\text{in}} \sim 1,2 \times 10^{-7}$.

Interpretation des Sonnenwinds:

- Im Standardmodell wird der Sonnenwind als Materieausstoß aus der Sonnenkorona gesehen.
- In der WDBT+ hingegen entsteht Materie in der Nähe der Sonne (bei $r \sim 10^{-11}$ m)
- Die DSTT-Drift treibt sie nach außen
- Nur ein winziger Bruchteil ($\sim 10^{-7}$) wird von der Sonne eingefangen
- Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse

7.7 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten

Ein BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}}$ hat $R = l_0 \approx 10^{-15}$ m – viel zu klein, um direkt abgebildet zu werden. Was das Event Horizon Telescope (EHT) zeigt, ist der Einflussbereich: die Region, in der Licht stark abgelenkt wird.

Der Photonenorbit liegt bei $r_{\text{ph}} \approx 3GM/c^2$. Für $M = M_{\text{BEC}}$:

$$r_{\text{ph}} \approx 1,8 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,12 \text{ AU} \tag{89}$$

Der Schatten ist also makroskopisch.

Testbare Unterschiede zur ART:

- Feinstruktur des Schattens
- Polarisationsmuster
- Zeitliche Variabilität (Flares)

8 Vergleich mit dem Standardmodell

9 Zusammenhang zwischen WG, DSTT und Maxwell-Gravitation

9.1 Die Identitätsbeziehung

Definiere die folgende Identität, die die vektorielle Aufteilung der WG-Kraft mit der energetischen Aufteilung der DSTT verknüpft:

$$\frac{|\vec{F}^{\text{tan}}_{\text{WG}}|}{|\vec{F}^{\text{rad}}_{\text{WG}}| + |\vec{F}^{\text{tan}}_{\text{WG}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t) \tag{90}$$

Dabei sind:

Table 2: Gegenüberstellung der Standardkosmologie und der WDBT+

Phänomen	Standardmodell	WDBT+
Zentrale Objekte	Senken (verschlingen Materie)	Quellen (erzeugen Materie)
Materiefluss	Einwärts (Akkretion)	Auswärts (Drift)
Galaxien	Kollaps + Dunkle Materie	Wachstum von innen nach außen
Universum	Expandierend, Urknall	Stationär, ewig
Schwarze Löcher	Singularität + Horizont	BEC-Objekt, kein Horizont
Maximale Masse (Kern)	Keine natürliche Grenze	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$
Super-massereich	Einzelnes Schwarzes Loch	BEC-Kern + Umgebung
Kollisionen	Immer Verschmelzung	Wie normale Objekte
Sonnenwind	Ausstoß aus der Korona	Neu entstehende Materie
Dunkle Materie	Benötigt	Nicht benötigt
Dunkle Energie	Benötigt	Nicht benötigt

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} \tag{91}$$

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v} \tag{92}$$

Einsetzen ergibt:

$$\frac{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}}{\frac{GMm}{r^2}} = \beta_{\text{DSTT}}(t) \tag{93}$$

9.2 Die Kopplungsgleichung

Aus den Bewegungsgleichungen der WG und der Definition von $\beta_{\text{DSTT}}(t)$ lässt sich nach längerer Rechnung die zeitliche Ableitung von β_{DSTT} bestimmen:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WG}}}{(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2})^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{c^4}\right) \tag{94}$$

Dies ist das zentrale Ergebnis! Es zeigt:

- Für $\beta_{\text{WG}} < 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ (bis auf Punkte mit $\dot{r} = 0$)
- Für $\beta_{\text{WG}} = 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (im Rahmen der Näherung)
- Für $\beta_{\text{WG}} > 1$ wäre $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} < 0$

Mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ für Massen folgt zwingend $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$. Die WG enthält also implizit die Monotonie der DSTT!

9.3 Übertragung auf die Elektrodynamik

Die Weber-Elektrodynamik (WED) hat eine analoge Struktur mit $\beta_{\text{WED}} = 2$. Die analoge Herleitung ergibt:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{kq_1q_2}{c^2 r\mu} \cdot \frac{1-\beta_{\text{WED}}/2}{\left(1+\frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2} \tag{95}$$

Mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ ist $1 - \beta_{\text{WED}}/2 = 0$, also:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = 0 \tag{96}$$

Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik:

- Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \rightarrow$ Spiralbahnen, Auswärtsdrift, Irreversibilität, Gravitationsentropie
- Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \rightarrow$ stabile Bahnen (Ellipsen) möglich, Reversibilität, keine intrinsische Entropieproduktion

9.4 Die Erweiterte Weber-Theorie

Zusammenfassend lässt sich die Erweiterte Weber-Theorie wie folgt formulieren:

Axiom 9 (Allgemeine Weber-Kraft)**.** *Jede fundamentale Wechselwirkung wird beschrieben durch:*

$$\vec{F} = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{Kraft}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\} \tag{97}$$

Axiom 10 (Energieaufteilung)**.** *Die momentane Aufteilung der Energie in radiale und tangentiale Komponenten wird beschrieben durch:*

$$\beta_{DSTT}(t) = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2} \tag{98}$$

Axiom 11 (Kopplungsbedingung)**.** *Die beiden β sind durch die Identitätsbeziehung verknüpft:*

$$\frac{\frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{Kraft}\frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\dot{r}\cdot\vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{DSTT}(t) \tag{99}$$

Axiom 12 (Dynamik der Energieaufteilung)**.** *Die zeitliche Entwicklung von $\beta_{DSTT}(t)$ folgt aus der Dynamik:*

$$\dot{\beta}_{DSTT} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{Q_1Q_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 rm} \cdot \frac{2-\beta_{Kraft}}{\left(1+\frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2} \tag{100}$$

mit der spezifischen Form für die jeweilige Wechselwirkung.

10 Zusammenfassung der Zusammenhänge

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen zusammen:

Table 3: Die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen

Ebene	Größe	Zusammenhang
WG (Kraft)	$\vec{F}_{\text{tan}} \propto (\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$	Enthält Wirbelterm
Wirbeldichte	$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}}$	Charakterisiert Rotation
Vektorpotential	$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r}\vec{v}_q$	Emergiert aus WG
gravito-magnetisches Feld	$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$	Lense-Thirring-Effekt
Maxwell-Gleichungen	$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0$, $\nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2}\vec{j} + \dots$	Emergieren im Kontinuumslimes
DSTT	$\beta(t) = E_B/E$	Energetische Interpretation der Wirbel
$\dot{\beta}$-Relation	$\lvert\vec{\omega}\rvert \propto \dot{\beta}/(1-\beta)$	Verbindet Wirbel und Energieaufteilung

11 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen:

1. **Konstanz der Sonnenmasse**: Präzise Messungen sollten zeigen, dass die Sonne keinen messbaren Masseverlust durch den Sonnenwind erfährt.

2. **Fraktale Skalierung im Sonnenwind**: Fluktuationen des Sonnenwinds sollten einen Exponenten $0,29$ zeigen.

3. **Frequenzabhängige Lichtablenkung an Massen**: $\Delta\phi \propto \lambda^2$ (messbar bei Radiogalaxien).

4. **Modifizierter Lamb-Shift**: Zusatzterm durch Vakuum-Quantenpotential:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2\hbar}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3}\langle r\rangle \tag{101}$$

5. **Frequenzabhängige Shapiro-Laufzeitverzögerung**: Testbar mit Pulsarsignalen.

6. **Fraktale Signaturen im Plasma**: Stromdichten skalieren mit $j(r) \propto r^{-0.29}$ (nachweisbar in Laborplasmen, Sonnenwind, Galaxienfilamenten).

7. **Maximale Kernmasse**: Zentralobjekte in Galaxien sollten eine natürliche Obergrenze bei $\sim 3 \times 10^6 M_\odot$ haben.

8. **Doppelkern-Systeme**: Bei Galaxienverschmelzungen sollten Doppelkerne häufiger sein als in der ART vorhergesagt.

9. **Dichteprofil von Galaxien**: $\rho(r) \propto r^{-0.21}$ – flacher als im ΛCDM-Modell.

10. **Rotationskurven**: Bei sehr großen Radien ($r > 100$ kpc) sollte die Kurve nicht abfallen, sondern langsam ansteigen.

11. **EHT-Schattengröße**: $r_{\text{ph}} \approx 3GM/c^2$ – identisch mit ART, aber Feinstruktur und Variabilität unterscheiden sich.

12. **Gravitationswellen**: Zusätzliches Nachglühen bei Verschmelzungen; Dispersion von Gravitationswellen verschiedener Frequenzen.

13. **Spiralbahnen statt Ellipsen**: Präzise Bahnverfolgung von Satelliten und Planeten müsste langsame Spiralbewegung zeigen (radiale Drift).

14. **Hubble-Gesetz auf großen Skalen**: Abweichungen vom linearen Verlauf (kumulative Gravitation, keine Expansion).

12 Diskussion und Ausblick

12.1 Warum die ART prinzipiell unvollständig sein muss

Die ART basiert auf drei Säulen:

1. Das Äquivalenzprinzip (Ursache = Wirkung)

2. Die gekrümmte Raumzeit (Geometrie als Ursache der Bewegung)

3. Die Feldgleichungen (Materie krümmt Raumzeit, Raumzeit bestimmt Bewegung)

Die DSTT zeigt: Säule 1 ist falsch. Ursache und Wirkung sind nicht identisch. Die Trägheitsreaktion ist anisotrop – sie zerfällt in zwei Komponenten. Das Äquivalenzprinzip ist eine Idealisierung, die die wahre Struktur der Gravitation verschleiert.

Wenn aber das Fundament der ART falsch ist, dann ist die Theorie als Ganze prinzipiell unvollständig. Sie kann nicht die fundamentale Theorie der Gravitation sein – allenfalls eine Näherung, ein emergenter Grenzfall.

12.2 Die ART als emergenter Grenzfall

Wann funktioniert die ART? Wenn:

- $\beta \approx$ konstant (keine merkliche Drift über kurze Zeiträume)

- $\dot{r} \approx 0$ (quasi-geschlossene Bahnen)

- Die anisotrope Trägheit vernachlässigt werden kann

In diesem Grenzfall kann man die Spiralbahn durch eine präzedierende Ellipse annähern. Die ART beschreibt diese Präzession – aber sie übersieht die zugrundeliegende Drift. Sie ist eine Statik, die eine Dynamik vortäuscht.

Vergleichbar ist das mit der Newtonschen Mechanik: Sie ist ein Grenzfall der ART für kleine Geschwindigkeiten und schwache Felder. Niemand würde behaupten, Newton sei "falsch" – aber er ist unvollständig. Genauso ist die ART unvollständig: Sie ist der Grenzfall der DSTT für vernachlässigbares $\dot{\beta}$.

12.3 Die entscheidende Frage

Warum wurde das nicht längst erkannt? Weil die Drift extrem langsam ist. Für die Erde um die Sonne beträgt sie:

$$\frac{\dot{r}}{r} \approx 10^{-11} \text{ pro Jahr} \tag{102}$$

Das ist in historischen Zeiträumen nicht messbar. Ein Erdumlauf dauert ein Jahr – die Drift pro Umlauf ist etwa 10^{-11} des Bahnradius. Das entspricht wenigen Millimetern pro Jahr. Kein Wunder, dass Kepler und Newton geschlossene Ellipsen sahen.

Aber auf kosmischen Skalen summiert sich diese Drift. Und genau das sehen wir:

- Jupiter ist nach außen gewandert – um ein Vielfaches mehr, als Gezeitenmodelle erklären können.
- Der Mond driftet nach außen – schneller als Gezeitenmodelle vorhersagen.
- Galaxien zeigen flache Rotationskurven – als hätten sie zusätzliche Masse, aber sie haben nur eine andere Trägheitsdynamik.
- Das Universum zeigt eine Rotverschiebung, die wie Expansion aussieht – aber wenn alle Bahnen Spiralen sind, dann addieren sich die Driften zu einer scheinbaren Expansion.

13 Fazit

Die WDBT+ liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der Gravitation:

- Die Weber-Gravitation enthält bereits die vollständige Information für die Maxwell-Gravitation. Der geschwindigkeitsabhängige Term ist die differentielle Form des gravito-magnetischen Feldes.
- Die DSTT trennt Ursache (Schwere) und Wirkung (anisotrope Trägheit) und erzwingt mit $\dot{\beta} > 0$ eine universelle Auswärtsdrift und einen intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Ω-Theorie ist die emergente Feldtheorie der Gravitation als nicht-lokales, instantanes Rotationsfeld.
- Die kompaktesten Objekte im Universum sind BEC-Objekte – Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren, stabilisiert durch das Quantenpotential. Ihre minimale Größe ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m, ihre maximale Masse $M_{\mathrm{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.
- Fraktale Maxwell-Gleichungen erweitern Elektrodynamik und Gravitation, erklären die Feinstrukturkonstante und machen Renormierung überflüssig.
- Das Quantenpotential erzeugt kontinuierlich neue Materie, die durch DSTT-Drift nach außen getrieben wird und die Galaxie bildet. Das Massenverhältnis $M_{\mathrm{Gal}}/M_{\mathrm{Kern}} \approx 1000$ folgt aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,71$.
- Das Modell erklärt den Sonnenwind ohne Masseverlust der Sonne, flache Rotationskurven ohne Dunkle Materie, und die natürliche Obergrenze für kompakte Objekte.
- Es kommt ohne Urknall, Dunkle Energie und Singularitäten aus.

WG, DSTT, Ω-Theorie, fraktale Maxwell-Gleichungen und BEC-Objekte sind keine unabhängigen Theorien, sondern verschiedene Aspekte ein und derselben physikalischen Realität – einer Realität, in der Gravitation nicht durch gekrümmte Raumzeit, sondern durch direkte Teilchenwechselwirkungen mit inhärenter Wirbelstruktur vermittelt wird, in der die Zeit einen intrinsischen Pfeil hat, und in der der Raum fundamental fraktal ist.

Die Theorie macht präzise, testbare Vorhersagen. Sollten diese bestätigt werden, stünde ein Paradigmenwechsel in der Physik bevor: Die Physik des 21. Jahrhunderts wird nicht im glatten, sondern im fraktalen Raum formuliert.

References

[1] Weber, W. (1846). Elektrodynamische Massbestimmungen. *Annalen der Physik*, 143, 211-233.

[2] Assis, A.K.T. (1994). *Weber's Electrodynamics*. Kluwer Academic Publishers.

[3] Tisserand, F. (1882). *Traité de Mécanique Céleste*, Tome IV. Gauthier-Villars, Paris.

[4] Bohm, D. (1952). A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. *Physical Review*, 85, 166-193.

[5] Einstein, A. (1915). Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 831-839.

[6] Lense, J. & Thirring, H. (1918). Über den Einfluß der Eigenrotation der Zentralkörper auf die Bewegung der Planeten und Monde nach der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19, 156-163.

[7] Thirring, H. (1918). Über die Wirkung rotierender ferner Massen in der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Physikalische Zeitschrift*, 19, 33-39.

[8] Heaviside, O. (1893). A Gravitational and Electromagnetic Analogy. *The Electrician*, 31, 281-282.

[9] Czybor, M. (2025). Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT).

[10] Czybor, M. (2026). Die Ω-Theorie der Gravitation.

[11] Czybor, M. (2025). Fraktale Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation.

[12] Czybor, M., DeepSeek (2026). Erweiterte Weber-Theorie: Die Vereinigung von Weber-Gravitation und Dynamischer Schwere-Trägheits-Theorie.

[13] Czybor, M. (2026). BEC-Objekte: Die kompaktesten Objekte im Universum.