

Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation

IWT & WDBT+

Informations-Weber-Theorie (IWT) – Fundamentale diskrete Urtheorie

Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) – Emergente Physik

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2.704$$

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

Michael Czybor

Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation

Michael Czybor

8. Juni 2026

Vorwort

Die moderne Physik befindet sich in einer paradoxen Lage. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Beide liefern präzise Vorhersagen, beide sind experimentell bestätigt, und doch stehen sie in einem fundamentalen Widerspruch zueinander. Die eine beschreibt die Welt als nichtlokale, konfigurationsraumweite Wellenlandschaft, die andere als lokale Geometrie einer gekrümmten Raumzeit. Beide funktionieren, aber sie können nicht gleichzeitig fundamental sein.

Seit über einem Jahrhundert versucht die Physik, diese Spannung zu überbrücken, doch die vorgeschlagenen Lösungen – Felder, Krümmungen, Renormierungen, Zusatzdimensionen, Strings, Schleifen, Inflationsfelder, dunkle Materie und dunkle Energie – haben die Lage eher verkompliziert als geklärt. Je mehr Zusatzannahmen eingeführt werden, desto deutlicher wird, dass die etablierten Theorien nicht falsch sind, aber nicht fundamental.

Die vorliegende Arbeit stellt eine alternative Sichtweise vor: eine zweistufige Theorie, die aus der fundamentalen, diskreten Informations-Weber-Theorie (IWT) und der emergierenden, kontinuumsnahen Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) besteht. Diese Theorie ist kein weiterer Versuch, bestehende Modelle zu modifizieren oder zu erweitern. Sie ist ein Neuansatz, der die Grundannahmen der modernen Physik hinterfragt und durch ein einfacheres, klareres und konzeptionell einheitliches Fundament ersetzt.

Zur Lektüre:

Dieses Buch fasst mehrere eigenständige Theorien zusammen (IWT, WDBT, WDBT+, DSTT, Ω -Theorie u.a.). Sie wurden unabhängig voneinander entwickelt. Dass sie dieselbe fraktale Dimension $D \approx 2.704$ und ähnliche Strukturen teilen, ist kein Zufall, sondern ein Hinweis auf eine gemeinsame Grundlage.

Der Leser findet hier keine lückenlose Deduktion aller Größen aus einem Prinzip, sondern eine Zusammenstellung von Ähnlichkeiten. Das ist beabsichtigt. Axiome werden als solche gekennzeichnet. Brückengesetze zwischen den Theorien werden angegeben, nicht hergeleitet.

Danksagung: Ich danke **André Koch Torres Assis** für seine langjährige, grundlegende Arbeit zur Weber-Elektrodynamik. Durch seine Forschung und seine historischen Aufarbeitungen wurde ich auf Wilhelm Weber und die Bedeutung seiner elektrodynamischen Fernwirkungstheorie aufmerksam. Assis hat über viele Jahre hinweg die Weber-Tradition in die moderne Physik zurückgebracht – diese Arbeit steht in ihrer Schuld.

Die IWT geht von einem radikal anderen Prinzip aus: **Information ist fundamental**. Nicht Raum, nicht Zeit, nicht Materie, nicht Energie, sondern Information und ihre Kopplung bilden die Grundlage aller physikalischen Prozesse. Aus dieser diskreten Informationsdynamik emergieren Raum als fraktale Geometrie, Zeit als Schrittindex eines globalen Update-Prozesses, Trägheit als lokale Informationsstruktur, Gravitation als globaler Informationsfluss, Quantenphänomene als nichtlokale Organisation und Naturkonstanten als Skalierungsparameter. Die beobachtbare Physik ist eine kontinuierliche Näherung dieser tieferen Struktur.

Die WDBT+ bildet die mittlere Ebene dieser Architektur. Sie zeigt, dass direkte Wechsel-

wirkungen und Bohm'sche Nichtlokalität keine Gegensätze sind, sondern zwei Aspekte desselben Informationsprozesses. Das Quantenpotential ist kein mysteriöser Zusatzterm, sondern der globale Anteil der Informationsdynamik. Die Weber-Kraft ist der lokale Anteil derselben Struktur. Zusammen ergeben sie eine kohärente, deterministische, nichtlokale Theorie, die sowohl die Quantenmechanik als auch die klassische Elektrodynamik umfasst.

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) schließlich ist der makroskopische Gravitationssektor dieser Ur-Theorie. Sie zeigt, dass Gravitation nicht als Krümmung der Raumzeit verstanden werden muss, sondern als dynamische Aufteilung der Schwerewirkung in radiale und tangentielle Trägheitsantworten. Der zentrale Parameter dieser Theorie, der Umlenkungszustand $\beta(t)$, ist die makroskopische Version des Bohm'schen Quantenpotentials. Seine monotone Entwicklung erklärt planetare Migration, Spiralbahnen, Lichtablenkung, Rotverschiebung und galaktische Rotationskurven ohne dunkle Materie, ohne dunkle Energie und ohne expandierende Raumzeit.

Die drei Ebenen – IWT, WDBT+ und DSTT – bilden zusammen eine Ur-Theorie, die ohne Widersprüche auskommt, ohne Singularitäten, ohne Renormierung und ohne unphysikalische Zusatzannahmen. Sie ist deterministisch, nichtlokal, fraktal, informationsbasiert und skalenübergreifend konsistent. Sie erklärt nicht nur die bekannten Phänomene der Physik, sondern auch, warum die etablierten Theorien funktionieren und wo ihre Grenzen liegen.

Die Stärke dieser Theorie liegt nicht in mathematischer Eleganz um ihrer selbst willen, sondern in konzeptioneller Klarheit. Sie zeigt, dass die Natur nicht aus Feldern besteht, die sich im leeren Raum ausbreiten, sondern aus Informationsflüssen, die ein fraktales Netzwerk strukturieren. Sie zeigt, dass Quantenphänomene keine Paradoxien sind, sondern Ausdruck globaler Organisation. Sie zeigt, dass Gravitation keine Geometrie ist, sondern ein Energiefluss zwischen lokalen und globalen Informationsanteilen. Und sie zeigt, dass das Universum weder expandiert noch aus dem Nichts entstanden ist, sondern ein dynamisches, stationäres Informationssystem darstellt.

Die vorliegende Arbeit ist die autoritative und endgültige Fassung der Theorie. Sie ersetzt alle früheren Veröffentlichungen des Autors zur Informations-Weber-Theorie (IWT), zur Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie (WDBT, WDBT+), zur Dynamischen Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT), zur Ω -Theorie der Gravitation, zu den fraktalen Maxwell-Gleichungen, zur Theorie der fraktalen Entropie sowie zu allen verwandten Themen. Frühere Dokumente enthalten teilweise veraltete, fehlerhafte oder redundante Darstellungen und sollten nicht mehr verwendet werden.

Dieses Werk ist daher nicht nur ein Beitrag zur theoretischen Physik, sondern ein Vorschlag für einen Paradigmenwechsel. Es fordert dazu auf, die Grundannahmen der modernen Physik zu hinterfragen und die Möglichkeit zuzulassen, dass Raum, Zeit, Materie und Energie nicht fundamental sind, sondern emergente Erscheinungen einer tieferen, diskreten Informationsdynamik.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Physik bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Doch unabhängig davon steht fest: Eine Theorie, die Quantenmechanik, Elektrodynamik, Gravitation und Kosmologie in einem einzigen, widerspruchsfreien Rahmen vereint, verdient es, ernst genommen zu werden. Sie verdient es, geprüft, diskutiert, weiterentwickelt und experimentell getestet zu werden.

Dieses Buch ist ein erster Schritt auf diesem Weg.

Die Beurteilung dieser Theorie anhand der Maßstäbe der von ihr kritisierten Standardmodelle wäre ein Kategorienfehler. Kapitel 1 erläutert diese grundsätzliche Unterscheidung; die Lektüre wird vor jeder weitergehenden Diskussion vorausgesetzt.

Michael Czybor
Langenstein/AT, 8. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
I Informations-Weber-Theorie (IWT)	13
1 Einleitung und Motivation	15
1.1 Das Problem der modernen Physik	15
1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie	15
1.3 Die drei Säulen der WDBT+	15
1.4 Ziel dieser Arbeit	16
1.5 Anmerkung zu den Naturkonstanten	16
1.6 Überblick über die Arbeit	16
2 Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)	17
2.1 Einleitung	17
2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld	17
2.3 Axiom 2: Informationserhaltung	17
2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie	18
2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik	18
2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik	18
2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss	19
2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter	19
2.9 Axiom 8: Fraktale Informationsdimension	19
2.10 Axiom 9: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik	19
2.11 Axiom 10: Universelle Gültigkeit	20
2.12 Zusammenfassung	20
3 Diskrete Informationsdynamik	21
3.1 Der diskrete Informationszustand	21
3.2 Diskrete Informationserhaltung	21
3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen	22
3.3.1 Diskrete Energie	22
3.3.2 Diskreter Impuls	22
3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)	22
3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss	22
3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft	22
3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur	23
3.4.3 Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk	23
3.5 Zusammenfassung	24

4	Diskretes Informations-Lagrange-Funktional	25
4.1	Einleitung	25
4.2	Grundidee des diskreten Variationsprinzips	25
4.3	Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional	25
4.3.1	Diskrete räumliche Gradienten	26
4.3.2	Diskrete zeitliche Änderung	26
4.4	Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen	26
4.5	Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz	27
4.6	Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge	27
4.6.1	Lokaler diskreter Anteil	27
4.6.2	Globaler diskreter Anteil	28
4.7	Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle	28
4.8	Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz	28
4.8.1	Translationsinvarianz	28
4.8.2	Zeitinvarianz	28
4.8.3	Rotationsinvarianz	28
4.9	Implementierung als diskreter Update-Algorithmus	29
4.10	Grenzfall zur kontinuierlichen Form	29
4.11	Zusammenfassung	29
5	Emergenz von Raum, Zeit und Metrik	31
5.1	Einleitung	31
5.2	Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie	31
5.3	Definition der diskreten Informationsmetrik	31
5.3.1	Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen	31
5.3.2	Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix	32
5.3.3	Interpretation der diskreten Metrik	32
5.4	Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz	32
5.4.1	Diskretes Linienelement	32
5.4.2	Effektive kontinuierliche Metrik	32
5.4.3	Diskrete Netzwerkstruktur	32
5.5	Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten	33
5.5.1	Diskrete Zeit als Schritindex	33
5.5.2	Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung	33
5.5.3	Zwei diskrete Zeitstrukturen	33
5.6	Dynamik der diskreten Informationsmetrik	33
5.6.1	Kontinuierlicher Grenzfall	34
5.7	Zusammenfassung	34
6	Fraktale Informationsdimension D	35
6.1	Einleitung	35
6.2	Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt	35
6.3	Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz	35
6.4	Definition der fraktalen Dimension	36
6.4.1	Vermehrungsfaktor	36
6.4.2	Skalierungsfaktor	36
6.4.3	Fraktale Dimension	36
6.5	Numerischer Wert	36
6.6	Korrektur früherer Veröffentlichungen	37
6.7	Physikalische Bedeutung	37
6.8	Zusammenfassung	37

7	Emergenz der Naturkonstanten	39
7.1	Zwei Ebenen physikalischer Konstanten	39
7.2	Fundamentale IWT-Parameter	39
7.3	Emergente WDBT+-Konstanten	40
7.4	Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten	40
7.4.1	Lichtgeschwindigkeit	40
7.4.2	Plancksches Wirkungsquantum	40
7.4.3	Gravitationskonstante	40
7.4.4	Feinstrukturkonstante	40
7.4.5	Boltzmann-Konstante	40
7.4.6	Neutrinomasse	41
7.5	Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten	41
7.6	Äquivalenz der beiden Beschreibungen	41
7.7	Zusammenfassung	41
7.8	Ausblick	42
II	Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)	43
8	Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte	45
8.1	Einleitung	45
8.2	Axiome der DSTT	45
8.2.1	Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung	45
8.2.2	Axiom 2: Anisotrope Trägheit	45
8.2.3	Axiom 3: Dynamische Aufteilung	45
8.2.4	Axiom 4: Monotonie	46
8.3	Bahnformen und Spiralbahnen	46
8.4	Die Weber-Kräfte	46
8.4.1	Allgemeine Form	46
8.4.2	Weber-Elektrodynamik (WED)	46
8.4.3	Weber-Gravitation (WG) für Massen	46
8.4.4	Weber-Gravitation (WG) für Photonen	47
8.4.5	Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation	47
8.5	Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften	48
8.6	Die Kopplungsgleichung	49
8.7	Exzentrizitätsänderung	49
8.8	Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich	50
8.9	Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil	50
8.10	Übertragung auf die Elektrodynamik	50
8.11	Die Erweiterte Weber-Theorie	51
8.11.1	Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft	51
8.11.2	Postulat 2: Energieaufteilung	51
8.11.3	Postulat 3: Kopplungsbedingung	51
8.11.4	Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung	51
8.12	Zusammenfassung	51
9	Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω-Theorie	53
9.1	Einleitung	53
9.2	Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation	53
9.2.1	Der geschwindigkeitsabhängige Term	53
9.2.2	Die Wirbeldichte der WG	53
9.3	Von der WG zur Maxwell-Gravitation	54

9.3.1	Identifikation des Vektorpotentials	54
9.3.2	Das gravito-magnetische Feld	54
9.3.3	Das gravito-elektrische Feld	54
9.4	Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation	55
9.5	Die Rolle der DSTT als Vermittler	55
9.6	Die Ω -Theorie der Gravitation	55
9.6.1	Axiome der Ω -Theorie	55
9.6.2	Die Feldgleichungen der Ω -Theorie	56
9.6.3	Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie	56
9.6.4	Testbare Vorhersagen	56
9.7	Zusammenfassung der Zusammenhänge	57
9.8	Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie	57
9.9	Fazit	57
10	Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte	59
10.1	Einleitung	59
10.2	Die fundamentale Längenskala l_0	59
10.3	Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation	59
10.4	Zustandsgleichung eines BEC-Objekts	60
10.5	Radius-Masse-Beziehung	60
10.6	Maximale Masse eines BEC-Objekts	60
10.7	Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation	60
10.8	Beobachtete supermassereiche Objekte	61
10.9	Strukturelle Analogie zum Atom	61
10.10	Kollisionen von BEC-Objekten	61
10.11	Gravitationswellen von BEC-Objekten	61
10.12	Zusammenfassung	62
11	Fraktale Maxwell-Gleichungen	63
11.1	Einleitung	63
11.2	Der fraktale Nabla-Operator ∇_D	63
11.3	Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik	63
11.3.1	Gaußsches Gesetz (elektrisch)	63
11.3.2	Gaußsches Gesetz (magnetisch)	64
11.3.3	Faradaysches Induktionsgesetz	64
11.3.4	Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)	64
11.4	Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik	64
11.5	Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation	64
11.6	Die Wellengleichung im fraktalen Raum	65
11.7	Dispersionsrelation	65
11.8	Konsequenzen	65
11.8.1	Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig	65
11.8.2	Skalierungsgesetze in Plasmen	66
11.8.3	Einheit von Elektrodynamik und Gravitation	66
11.9	Zusammenfassung	66
12	Das Neutrino als Q-Teilchen	67
12.1	Einleitung	67
12.2	Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen	67
12.3	Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge	67
12.4	Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität	68
12.5	Drei Neutrino-Generationen	68

12.6	Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion	69
12.7	Konsequenzen für die Dunkle Materie	69
12.8	Zusammenfassung	69
13	Theorie der fraktalen Entropie	71
13.1	Einleitung	71
13.2	Axiome der Theorie	71
13.2.1	Axiom 1: Fraktale Raumstruktur	71
13.2.2	Axiom 2: Fraktale Entropie	71
13.2.3	Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz	71
13.2.4	Axiom 4: Lokale Entropieproduktion	72
13.2.5	Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität	72
13.2.6	Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator	72
13.2.7	Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen	72
13.3	Die drei Phasen	72
13.4	Die Entropieflüsse	72
13.5	Der geschlossene Kreislauf	73
13.5.1	Stationärer Zustand	73
13.6	Warum kein Wärmetod eintritt	73
13.6.1	Bedingungen für einen Wärmetod	73
13.6.2	Die Verhinderung des Wärmetods	74
13.6.3	Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik	74
13.7	Kosmologische Konsequenzen	74
13.8	Zusammenfassung	74
14	Stationäre Kosmologie	77
14.1	Einleitung	77
14.2	Rotverschiebung ohne Expansion	77
14.3	Galaxienrotation ohne Dunkle Materie	77
14.3.1	Dichteverteilung	77
14.3.2	Rotationskurve	78
14.4	Kontinuierliche Materieentstehung	78
14.4.1	Drift und Einfang	78
14.5	Galaxienwachstum	78
14.5.1	Massenverhältnis Galaxie zu Kern	78
14.6	Die Sonne als Mikrokosmos	79
14.6.1	Interpretation des Sonnenwinds	79
14.7	Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten	79
14.8	Vergleich mit dem Standardmodell	79
14.9	Zusammenfassung	80
15	Testbare Vorhersagen	81
15.1	Einleitung	81
15.2	Kosmologie und Galaxien	81
15.2.1	Fraktale Skalengesetze	81
15.2.2	Maximale Masse kompakter Objekte	81
15.2.3	Doppelkern-Systeme	81
15.2.4	Hubble-Gesetz	82
15.3	Gravitationsphysik	82
15.3.1	Frequenzabhängige Lichtablenkung	82
15.3.2	Gravitationswellen-Dispersion	82
15.3.3	Shapiro-Laufzeitverzögerung	82

15.3.4	Spiralbahnen statt Ellipsen	82
15.4	Quanten- und Teilchenphysik	82
15.4.1	Neutrinomasse	82
15.4.2	Neutrino-Oszillationen	83
15.4.3	Drei Neutrino-Generationen	83
15.4.4	Modifizierter Lamb-Shift	83
15.5	Plasmaphysik	83
15.5.1	Fraktale Skalierung im Sonnenwind	83
15.5.2	Sonnenmasse	83
15.5.3	Stromdichten in Plasmen	83
15.6	Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen	83
15.7	Fazit	84
16	Zusammenfassung	85
16.1	Die zwei Ebenen der Theorie	85
16.2	Die drei Säulen der WDBT+	85
16.3	Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)	85
16.4	Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie	86
16.5	BEC-Objekte	86
16.6	Fraktale Maxwell-Gleichungen	86
16.7	Neutrino als Q-Teilchen	87
16.8	Fraktale Entropie	87
16.9	Stationäre Kosmologie	87
16.10	Testbare Vorhersagen	87
16.11	Fazit	88
A	Mathematische Grundlagen	89
A.1	Einleitung	89
A.2	Diskrete Variationsrechnung	89
A.2.1	Diskretes Funktional	89
A.2.2	Variation diskreter Funktionale	90
A.2.3	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen	90
A.2.4	Beispiel: Diskrete Wellengleichung	90
A.3	Diskrete Noether-Theoreme	90
A.3.1	Symmetrien in diskreten Systemen	90
A.3.2	Erhaltungsgrößen	90
A.3.3	Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze	91
A.4	Diskrete Informationsmetrik	91
A.4.1	Definition aus dem Funktional	91
A.4.2	Alternative Definition über Kopplungsmatrix	91
A.4.3	Eigenschaften	91
A.5	Fraktale Analysis diskreter Netzwerke	91
A.5.1	Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks	91
A.5.2	Praktische Berechnung	91
A.5.3	Beispiel: Fraktales Netz	92
A.6	Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung	92
A.6.1	Rekursive Update-Regeln	92
A.6.2	Stabilitätsanalyse	92
A.6.3	Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft	92
A.7	Diskrete Fourier-Analyse	92
A.7.1	Diskrete Fourier-Transformation	92
A.7.2	Dispersionsrelationen	92

A.8	Matrixdarstellungen diskreter Operatoren	93
A.8.1	Laplace-Matrix	93
A.8.2	Eigenwertanalyse	93
A.9	Zusammenfassung der mathematischen Struktur	93
A.10	Hinweise zur praktischen Anwendung	93
B	Numerische Simulationen	95
B.1	Einleitung	95
B.2	Das diskrete Simulationsnetzwerk	95
B.2.1	Grundstruktur	95
B.2.2	Initialisierungsprotokolle	95
B.3	Implementierung der diskreten Dynamik	96
B.3.1	Hauptalgorithmus	96
B.3.2	Diskrete Weber-Dynamik	96
B.3.3	Diskretes Bohm-Potential	96
B.4	Rekonstruktion emergenter Physik	97
B.4.1	Raumemergenz	97
B.4.2	Zeitemergenz	97
B.5	Validierung und Konsistenzchecks	97
B.5.1	Erhaltungsgrößen	97
B.5.2	Grenzfalltests	98
B.6	Anwendungsbeispiele	98
B.6.1	Doppelspaltexperiment	98
B.6.2	Gravitationspotential	98
B.6.3	Kosmologische Simulation	98
B.7	Technische Implementierung	98
B.7.1	Performance-Optimierungen	98
B.7.2	Visualisierung	99
B.8	Zusammenfassung	99
B.8.1	Zukünftige Entwicklung	99
C	Vergleich mit etablierten Theorien	101
C.1	Einleitung	101
C.2	Vergleich mit der klassischen Mechanik	101
C.2.1	Fundamentale Konzepte	101
C.2.2	Emergenz aus der IWT	101
C.2.3	Emergente Gleichungen	102
C.2.4	Fundamentaler vs. emergenter Status	102
C.3	Vergleich mit der Elektrodynamik	102
C.3.1	Drei Formen der Elektrodynamik	102
C.3.2	Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung	102
C.3.3	Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung	102
C.3.4	Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT	102
C.4	Vergleich mit der Quantenmechanik	103
C.4.1	Fundamentale Konzepte	103
C.4.2	Emergenz aus der IWT	103
C.4.3	Emergente Schrödinger-Gleichung	103
C.5	Vergleich mit der Relativitätstheorie	103
C.5.1	Spezielle Relativitätstheorie (SRT)	103
C.5.2	Allgemeine Relativitätstheorie (ART)	104
C.5.3	Emergente Einstein-Gleichungen	104
C.6	Grenzfälle und Übergänge	104

C.7	Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)	104
C.7.1	Korrespondenz zwischen QED und WDBT	104
C.7.2	Regularisierung durch das Quantenpotential	104
C.7.3	Lamb-Shift	105
C.8	Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)	105
C.8.1	Die unvollständige ART	105
C.8.2	ART+ als Vervollständigung durch die DBT	105
C.8.3	Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT	105
C.8.4	Der experimentelle Entscheid	105
C.9	Zusammenfassung der Vergleiche	106
D	Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT	107
D.1	Einleitung	107
D.2	Rotverschiebung im stationären Universum	107
D.2.1	Grundgleichung	107
D.2.2	Fraktale Dichteverteilung	107
D.2.3	Eingeschlossene Masse	107
D.2.4	Integration	108
D.2.5	Effektive Hubble-Konstante	108
D.3	Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie	108
D.3.1	Bewegungsgleichung	108
D.3.2	Quantenpotential für exponentielle Dichte	108
D.3.3	Rotationskurve	108
D.3.4	Asymptotisches Verhalten	108
D.4	Frequenzabhängige Lichtablenkung	109
D.4.1	Weber-Gravitation für Photonen	109
D.4.2	Reduktion auf die Bahnebene	109
D.4.3	Substitution $u = 1/r$	109
D.4.4	Beschleunigung in Polarkoordinaten	109
D.4.5	Transformation auf $u(\phi)$	109
D.4.6	Vereinfachung	109
D.4.7	Störungsrechnung	110
D.4.8	Physikalische Konsequenz	110

Teil I

Informations-Weber-Theorie (IWT)

Kapitel 1

Einleitung und Motivation

1.1 Das Problem der modernen Physik

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Andererseits sind diese Theorien fundamental inkompatibel: Die Quantenmechanik ist nicht-lokal und probabilistisch, die Allgemeine Relativitätstheorie ist lokal und deterministisch. Beide Theorien enthalten Singularitäten – unendliche Dichten in Schwarzen Löchern und beim Urknall – was auf ihre Unvollständigkeit hinweist.

Die vorgeschlagenen Lösungen – Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, dunkle Materie, dunkle Energie – haben das Problem nicht gelöst, sondern die Theorielandschaft weiter verkompliziert. Es fehlt ein einheitliches, konsistentes Fundament.

1.2 Zwei Ebenen einer neuen Theorie

In dieser Arbeit wird eine zweistufige Theorie vorgestellt:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)**
Eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)**
Die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie ohne Urknall, dunkle Materie und dunkle Energie.

1.3 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. **Die Weber-Kraft**
Eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik und Gravitation auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung.
2. **Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential**
Ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht.

3. Die fraktale Raumdimension D

Der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit einer charakteristischen Dimension D , die aus der optimalen Packung von Dodekaedern und einer Fibonacci-Rekursion folgt. D ist eine fundamentale Konstante der WDBT+.

1.4 Ziel dieser Arbeit

Ziel ist eine konsistente, geschlossene Darstellung der IWT und der WDBT+ – frei von überflüssigen Annahmen, frei von Singularitäten, frei von dunklen Komponenten. Die Theorie macht testbare Vorhersagen und beansprucht, die fundamentalere Beschreibung der physikalischen Realität zu sein.

1.5 Anmerkung zu den Naturkonstanten

Die in dieser Arbeit auftretenden Naturkonstanten (c , $\hbar$, G , α , etc.) werden als gegebene Größen der etablierten Physik betrachtet. Die WDBT+ benötigt keine Ableitung dieser Konstanten aus D ; sie sind entweder direkt übernommen oder emergieren aus der IWT (Teil I). Die Behauptung, dass alle Naturkonstanten aus D folgen, wird in dieser Arbeit nicht aufgestellt. Stattdessen wird D als eine zusätzliche fundamentale Konstante eingeführt, die die fraktale Struktur des Raumes beschreibt.

1.6 Überblick über die Arbeit

Teil I (Kapitel 2 bis 7) entwickelt die IWT axiomatisch. Teil II (Kapitel 8 bis 17) entfaltet die emergente Physik der WDBT+. Die Anhänge enthalten mathematische Grundlagen, Hinweise zur numerischen Simulation und einen Vergleich mit etablierten Theorien.

Kapitel 2

Axiome der Informations-Weber-Theorie (IWT)

2.1 Einleitung

Die IWT ist eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Sie postuliert keine Raumzeit, keine Materie, keine Felder – nur Information. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.

Die folgenden Axiome definieren die IWT vollständig. Sie sind logisch unabhängig und bilden die Grundlage für alle weiteren Ableitungen.

2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld

Es existiert ein skalares, diskretes Informationsfeld

$$I_k^{(n)},$$

das die vollständige physikalische Realität beschreibt. Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationsknoten,
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Update-Schritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – dimensionsloser Informationswert.

Materie, Energie, Wellen, Geometrie und Dynamik sind Manifestationen der Struktur und Veränderung dieses Feldes.

2.3 Axiom 2: Informationserhaltung

Die Gesamtinformation ist erhalten:

$$\sum_{k=1}^N I_k^{(n)} = \text{const} \quad \text{für alle } n.$$

Information wird nicht erzeugt oder vernichtet – sie wird nur zwischen den Knoten umverteilt.

2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie

Die physikalische Raumzeit ist nicht fundamental. Stattdessen entsteht eine effektive diskrete Metrik

$$g_{kl}^{(n)}$$

aus der lokalen und globalen Struktur des Informationsfeldes und seiner Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$. Die Metrik ist dynamisch und wird nicht vorgegeben.

2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik

Die Dynamik des Informationsfeldes folgt aus einem universellen diskreten Informations-Lagrange-Funktional

$$\mathcal{L}_d[I_k^{(n)}] = \mathcal{L}_{\text{local}} + \mathcal{L}_{\text{global}} + \mathcal{L}_{\text{fraktal}},$$

mit drei fundamentalen Beiträgen:

- **Lokaler Anteil (Weber-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{local}} = \frac{1}{2} \sum_{k,l} K_{kl}^{(n)} \Delta_{kl} I^{(n)} \Delta_{kl} I^{(n)},$$

beschreibt direkte Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten.

- **Globaler Anteil (Bohm-Struktur):**

$$\mathcal{L}_{\text{global}} = -\frac{\lambda}{2} \sum_k \frac{\Delta_k^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}},$$

beschreibt nicht-lokale Organisationsstrukturen über das gesamte Netzwerk.

- **Fraktaler Anteil (kosmische Skalierung):**

$$\mathcal{L}_{\text{fraktal}} = \mu \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \sum_k I_k^{(n)},$$

beschreibt die skaleninvariante Struktur des Universums.

2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik

Die Metrik entsteht aus der Variation des diskreten Funktionals. Die fundamentale Gleichung der Informationsmetrik in diskreter Form lautet:

$$g_{kl}^{(n+1)} = g_{kl}^{(n)} + T \left[\Delta_k I^{(n)} \Delta_l I^{(n)} - \lambda \frac{\Delta_{kl}^2 I^{(n)}}{I_{kl}^{(n)}} + \mu g_{kl}^{(n)} \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \right].$$

Sie vereinigt lokale Weber-Dynamik, globale Bohm-Struktur und fraktale kosmische Skalierung.

2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss

Energie ist keine fundamentale Größe. Sie entsteht als Erhaltungsgröße des diskreten Informationsflusses. Die diskrete Energie folgt aus der Zeitinvarianz des Informations-Lagrange-Funktional:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \Delta_t I_k^{(n)} - \mathcal{L}_d \right],$$

und es gilt $E^{(n+1)} = E^{(n)}$.

2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter

Die fundamentalen Naturkonstanten sind keine Eingaben der Theorie, sondern feste Punkte der diskreten Informationsdynamik. Sie emergieren aus den Netzwerkparametern:

- c – maximale Informationsflussrate,
- $\hbar$ – globale Informationsgranularität,
- G – fraktale Kopplungsstärke,
- α – Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung,
- k_B – Informations-Temperatur-Skala.

Die expliziten Zusammenhänge werden in Kapitel 7 angegeben.

2.9 Axiom 8: Fraktale Informationsdimension

Der universelle Informationsraum besitzt eine fundamentale, skaleninvariante fraktale Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)}, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Diese Dimension ist eine primäre Eigenschaft des Informationsfeldes und bestimmt die Skalierung der Informationsmetrik, die Kopplung lokaler und globaler Informationsflüsse, die Form der Weber-Kraft im makroskopischen Grenzfall, die Struktur des Bohm-Potentials sowie die emergenten Naturkonstanten.

2.10 Axiom 9: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik

Raum, Zeit und Dynamik sind emergente Eigenschaften der Informationsmetrik:

- **Raum:** Der physikalische Raum entsteht aus der diskreten Metrik

$$d_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot \lambda_0,$$

mit fundamentaler Länge λ_0 .

- **Zeit:** Die physikalische Zeit entsteht als Ordnungsstruktur der Informationsänderung

$$t \approx n \cdot T,$$

wobei n der Update-Index und T der fundamentale Zeitschritt ist.

- **Dynamik:** Klassische Mechanik, Quantenmechanik und Gravitation sind Grenzfälle der diskreten Informationsdynamik.

2.11 Axiom 10: Universelle Gültigkeit

Die IWT gilt auf allen Skalen:

- **Mikroskopisch:** Quantenstruktur, Elementarteilchen, Wellenphänomene,
- **Mesoskopisch:** Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik,
- **Makroskopisch:** Gravitation, Astrophysik, Planetenbewegung,
- **Kosmologisch:** Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung, großskalige Struktur.

2.12 Zusammenfassung

Die zehn Axiome definieren die IWT vollständig in ihrer fundamentalen diskreten Formulierung. Alle physikalischen Phänomene – von der Quantenmechanik über die Gravitation bis zur Kosmologie – folgen aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsfeldes und der daraus emergierenden Metrik.

Die IWT ist fundamental diskret, emergent kontinuierlich, vereinheitlicht alle Wechselwirkungen und macht testbare Vorhersagen.

Kapitel 3

Diskrete Informationsdynamik

3.1 Der diskrete Informationszustand

Die IWT beschreibt jeden physikalischen Zustand durch eine diskrete Informationsverteilung. Diese wird durch eine skalare Dichtesequenz

$$I_k^{(n)}$$

repräsentiert, die angibt, wie viel strukturierte Information am Netzwerkknoten k zum Zeitschritt n vorliegt.

Dabei ist:

- $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Zeitschritt),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – Informationswert (skalar, dimensionslos).

Im Gegensatz zu klassischen Feldern besitzt $I_k^{(n)}$ keine materielle Bedeutung. Sie beschreibt weder Masse noch Ladung oder Energie, sondern die Organisation eines physikalischen Systems. Energie, Impuls und andere Größen entstehen erst als abgeleitete Funktionale dieser Informationsstruktur.

3.2 Diskrete Informationserhaltung

Analog zur Kontinuitätsgleichung der klassischen Physik wird der Informationsfluss durch diskrete Differenzengleichungen beschrieben. Die fundamentale Erhaltungsgleichung im diskreten Netz lautet:

$$\sum_{k \in \mathcal{N}(l)} \left(I_k^{(n+1)} - I_k^{(n)} \right) + \sum_{m \in \partial \mathcal{N}(l)} J_{lm}^{(n)} = 0,$$

wobei:

- $\mathcal{N}(l)$ – Menge der Nachbarknoten von l ,
- $\partial \mathcal{N}(l)$ – Rand des Nachbarschaftsbereichs,
- $J_{lm}^{(n)}$ – Informationsfluss von Knoten l zu m in Zeitschritt n .

Diese Gleichung ist das diskrete Herzstück der Theorie: Sie ersetzt die kontinuierliche Energieerhaltung durch eine diskrete Informationserhaltung. Die gesamte Dynamik ergibt sich aus der rekursiven Umlagerung von Information zwischen Netzwerkknoten.

3.3 Information als Ursprung physikalischer Größen

In der diskreten IWT entstehen physikalische Größen als Funktionale der Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.

3.3.1 Diskrete Energie

Die Energie am Knoten k zum Zeitpunkt n ist:

$$E_k^{(n)} = \alpha \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right)^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2,$$

mit Kopplungskonstanten α, β .

3.3.2 Diskreter Impuls

Der Impulsfluss zwischen Knoten k und l ist:

$$p_{kl}^{(n)} = \gamma \left(I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)} \right) \left(I_l^{(n)} - I_l^{(n-1)} \right),$$

mit Kopplungskonstante γ .

3.3.3 Diskrete Masse (Trägheit)

Die effektive Masse am Knoten k ist:

$$m_k^{(n)} = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2,$$

mit Kopplungskonstante δ . Sie misst den Widerstand gegen Änderungen der lokalen Informationsstruktur.

Damit wird die klassische Unterscheidung zwischen Materie, Feldern und Geometrie aufgehoben: Alles entsteht aus einer einzigen fundamentalen diskreten Größe – der Information.

3.4 Dynamik als diskreter Informationsfluss

Die Bewegungsgleichungen eines Systems ergeben sich aus der rekursiven Umlagerung von Information. Die Theorie unterscheidet zwei komplementäre diskrete Dynamikformen:

- **Lokale diskrete Dynamik:** beschrieben durch die diskrete Weber-Kraft,
- **Globale diskrete Dynamik:** beschrieben durch das diskrete Bohm-Potential.

Diese beiden Strukturen sind keine konkurrierenden Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsdynamik.

3.4.1 Lokale diskrete Dynamik: Diskrete Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft beschreibt lokale Informationsflüsse zwischen benachbarten Knoten. Für zwei wechselwirkende Knotengruppen A und B lautet sie:

$$\vec{F}_{AB}^{(n)} = \frac{q_A q_B}{4\pi\epsilon_0 (r_{AB}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{r_{AB}^{(n)} - r_{AB}^{(n-1)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{AB}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{r_{AB}^{(n+1)} - 2r_{AB}^{(n)} + r_{AB}^{(n-1)}}{T^2} \right] \hat{r}_{AB}^{(n)}.$$

Eigenschaften:

1. Explizit rekursiv: Berechnet $r^{(n+1)}$ aus $r^{(n)}$ und $r^{(n-1)}$,
2. Nicht-zirkulär: Keine implizite Abhängigkeit $F = f(\vec{r})$ mit $\vec{r} = F/m$,
3. Lokal: Nur Nachbarkopplungen,
4. Feldlos: Benötigt keine kontinuierlichen Felder.

3.4.2 Globale diskrete Dynamik: Diskrete Bohm-Struktur

Das diskrete Bohm-Potential beschreibt die systemische, nicht-lokale Organisation des Informationszustands. Im diskreten Netz lautet es:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} (f_l - f_k).$$

Eigenschaften:

1. Global: Wirkt über das gesamte Netz,
2. Instantan: Keine Retardierung,
3. Nicht-energetisch: Transportiert keine Energie,
4. Organisierend: Optimiert die Gesamtstruktur.

3.4.3 Die digitale WDBT als fundamentales Netzwerk

Die digitale WDBT beschreibt die Gesamtwirkung auf einen Knoten k durch drei diskrete Beiträge:

$$F_k^{(n)} = F_{\text{WED},k}^{(n)} + F_{\text{WG},k}^{(n)} + F_{Q,k}^{(n)},$$

wobei:

- $F_{\text{WED},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Elektrodynamik (Ladungen),
- $F_{\text{WG},k}^{(n)}$ – diskrete Weber-Gravitation (Massen),
- $F_{Q,k}^{(n)}$ – diskrete Bohm-Struktur (globale Organisation).

Diese digitale Theorie besitzt kein vorgegebenes Raummodell. Der Raum emergiert aus der Kopplungsstruktur $K_{kl}^{(n)}$.

3.5 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsdynamik der IWT basiert auf:

- einem diskreten Informationszustand $I_k^{(n)}$ als Grundgröße,
- einer diskreten Erhaltungsgleichung für Information,
- einer zweistufigen Dynamik: lokal (Weber-Kraft) und global (Bohm-Potential),
- der Emergenz von Raum, Zeit, Energie, Impuls und Masse aus der Informationsstruktur.

Damit ist die fundamentale Dynamik der IWT vollständig definiert, ohne Rückgriff auf kontinuierliche Felder oder eine vorgegebene Raumzeit.

Kapitel 4

Diskretes Informations-Lagrange-Funktional

4.1 Einleitung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional ist die mathematische Grundlage der IWT. Alle Größen sind diskrete Sequenzen mit Zeitindex n und Raumindex k . Die Variation erfolgt über diskrete Ableitungen, nicht über Differentiale.

Im informationsbasierten Rahmen ersetzt dieses Funktional:

- die Newtonsche Bewegungsgleichung durch rekursive Update-Regeln,
- die Maxwell-Gleichungen durch diskrete Weber-Kopplungen,
- die Schrödinger-Gleichung durch diskrete Bohm-Struktur,
- die geometrische Gravitation durch emergente diskrete Metrik.

Es bildet die mathematische Grundlage der gesamten Theorie und zeigt, dass kontinuierliche Gleichungen als Grenzfälle einer tieferen diskreten Informationsdynamik erscheinen.

4.2 Grundidee des diskreten Variationsprinzips

Die diskrete IWT geht von folgenden Prinzipien aus:

1. Der physikalische Zustand ist eine diskrete Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
2. Information ist eine diskret erhaltene Größe.
3. Dynamik ist rekursive Umlagerung von Information.
4. Lokale und globale Dynamik sind komplementär.

Daraus folgt, dass die Dynamik durch ein diskretes Funktional beschrieben werden muss, das sowohl lokale als auch globale Informationsstrukturen berücksichtigt.

4.3 Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional lautet allgemein:

$$L_I[\{I_k^{(n)}\}] = \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_k(I_k^{(n)}, \Delta I_k^{(n)}, \delta I_k^{(n)}) \Delta V_k.$$

Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationszelle (Knoten),
- $I_k^{(n)} \in \mathbb{R}^+$ – Informationswert am Knoten k zum Zeitindex n ,
- $\Delta I_k^{(n)}$ – diskreter räumlicher Gradient (Nachbarschaftsdifferenzen),
- $\delta I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ – diskrete zeitliche Änderung,
- ΔV_k – diskretes Volumenelement (knotenspezifisch),
- $\mathcal{F}_k$ – diskrete Lagrangedichte am Knoten k .

4.3.1 Diskrete räumliche Gradienten

Der diskrete Gradient am Knoten k ist definiert als:

$$\Delta I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}),$$

mit:

- $\mathcal{N}(k)$ – Nachbarknoten von k ,
- w_{kl} – Kopplungsgewichte (normiert: $\sum_l w_{kl} = 1$).

4.3.2 Diskrete zeitliche Änderung

Die diskrete zeitliche Ableitung ist:

$$\delta_t I_k^{(n)} = \frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T},$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

4.4 Diskrete Variation und Euler-Lagrange-Gleichungen

Die Dynamik folgt aus dem diskreten Variationsprinzip:

$$\delta L_I = 0 \quad \text{für alle } \delta I_k^{(n)}.$$

Die Variation nach $I_k^{(n)}$ führt zur diskreten Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\delta_t \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} \right) + \Delta \left(\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} = 0.$$

Hierbei sind:

- $\delta_t f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T}$ – diskrete zeitliche Vorwärtsdifferenz,
- $\Delta f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$ – diskrete räumliche Divergenz.

4.5 Diskreter Informationsfluss als natürliche Konsequenz

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung folgt unmittelbar der diskrete Informationsfluss:

$$J_{kl}^{(n)} = \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})},$$

mit $\Delta_{kl} I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

Damit wird die diskrete Kontinuitätsgleichung

$$\delta_t I_k^{(n)} + \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} J_{kl}^{(n)} = 0$$

zu einer direkten Konsequenz des diskreten Variationsprinzips.

4.6 Zerlegung in lokale und globale diskrete Beiträge

Die Struktur von $\mathcal{F}_k$ erlaubt eine natürliche Zerlegung:

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F}_k^{\text{local}} + \mathcal{F}_k^{\text{global}}.$$

4.6.1 Lokaler diskreter Anteil

Der lokale Anteil beschreibt lokale Informationsflüsse:

$$\mathcal{F}_k^{\text{local}} = \alpha (\delta_t I_k^{(n)})^2 + \beta (\Delta I_k^{(n)})^2 + \gamma I_k^{(n)} \ln \left(\frac{I_k^{(n)}}{I_0} \right).$$

Er führt im diskreten Grenzfall zu:

- der diskreten Weber-Kraft,
- klassischen Trägheits- und Energiebegriffen,
- stabiler numerischer Integration.

Die Variation des lokalen Anteils ergibt:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial I_k^{(n)}} = \gamma \left(1 + \ln \left(\frac{I_k^{(n)}}{I_0} \right) \right),$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = 2\alpha \delta_t I_k^{(n)},$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}_k^{\text{local}}}{\partial (\Delta I_k^{(n)})} = 2\beta \Delta I_k^{(n)}.$$

4.6.2 Globaler diskreter Anteil

Der globale Anteil beschreibt systemische Informationsorganisation:

$$\mathcal{F}_k^{\text{global}} = \lambda \frac{(\Delta I_k^{(n)})^2}{I_k^{(n)}} + \mu \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}},$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta^2 I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}).$$

Die Variation dieses Terms führt zum diskreten Bohm-Potential:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}}.$$

4.7 Diskrete Weber-Kraft und Bohm-Potential als Grenzfälle

Die diskrete IWT reproduziert zwei fundamentale Strukturen:

- **Diskrete Weber-Kraft:** Lokaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik,
- **Diskretes Bohm-Potential:** Globaler Grenzfall der diskreten Informationsdynamik.

Beide entstehen aus demselben diskreten Funktional – sie sind keine unabhängigen Modelle, sondern zwei Projektionen derselben diskreten Informationsstruktur.

4.8 Symmetrien und Erhaltungsgrößen im diskreten Netz

Nach dem diskreten Noether-Theorem ergeben sich:

4.8.1 Translationsinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nur von Differenzen $I_k^{(n)} - I_l^{(n)}$ abhängt, dann ist der diskrete Gesamtimpuls erhalten:

$$P^{(n)} = \sum_k \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} = \text{konstant}.$$

4.8.2 Zeitinvarianz

Wenn $\mathcal{F}_k$ nicht explizit von n abhängt, dann ist die diskrete Energie erhalten:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\delta_t I_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\delta_t I_k^{(n)})} - \mathcal{F}_k \right] = \text{konstant}.$$

4.8.3 Rotationsinvarianz

Wenn das Netz rotationssymmetrisch ist, dann ist der diskrete Drehimpuls erhalten.

4.9 Implementierung als diskreter Update-Algorithmus

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung ergibt sich eine explizite Update-Regel für $I_k^{(n+1)}$:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k \left(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\}, I_k^{(n-1)} \right),$$

mit

$$\Phi_k = -\frac{1}{2\alpha} \left[\Delta \left(2\beta \Delta I_k^{(n)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}} \right].$$

Die konkreten Update-Schritte sind:

1. Berechne räumliche Gradienten: $\Delta I_k^{(n)}, \Delta^2 I_k^{(n)}$,
2. Berechne partielle Ableitungen: $\frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial I_k^{(n)}}, \frac{\partial \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta I_k^{(n)})}$, etc.,
3. Löse die Euler-Lagrange-Gleichung nach $I_k^{(n+1)}$ auf,
4. Update aller Knoten gleichzeitig (globale Synchronisation).

4.10 Grenzfall zur kontinuierlichen Form

Für $T \rightarrow 0$ und $N \rightarrow \infty$ mit $\Delta V_k \rightarrow 0$ ergibt sich der kontinuierliche Grenzfall:

$$L_I[\rho_I] = \int \mathcal{F}(\rho_I, \nabla \rho_I, \partial_t \rho_I) d^3x,$$

mit $\rho_I(\vec{r}, t) = \lim I_k^{(n)}$.

Die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung geht über in:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\partial_t \rho_I)} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial (\nabla \rho_I)} \right) - \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \rho_I} = 0.$$

4.11 Zusammenfassung

Das diskrete Informations-Lagrange-Funktional bildet die mathematische Grundlage der diskreten IWT:

- Es beschreibt die Dynamik der diskreten Informationsverteilung $I_k^{(n)}$.
- Es erzeugt die diskrete Kontinuitätsgleichung als natürliche Konsequenz.
- Es zerlegt sich in lokale und globale diskrete Beiträge.
- Es reproduziert die diskrete Weber-Kraft und das diskrete Bohm-Potential.
- Es liefert diskrete Erhaltungssätze aus diskreten Symmetrien.
- Es ist algorithmisch direkt implementierbar.
- Der kontinuierliche Grenzfall emergiert für feine Diskretisierung.

Kapitel 5

Emergenz von Raum, Zeit und Metrik

5.1 Einleitung

In der IWT sind Raum und Zeit keine fundamentalen Größen. Sie emergieren aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsnetzwerks. Dieses Kapitel zeigt, wie aus der diskreten Informationsverteilung $I_k^{(n)}$ und der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ eine effektive Geometrie entsteht.

Die zentrale Idee lautet:

Raum ist die effektive Metrik der diskreten Informationskopplung.

Damit wird die klassische Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht verworfen, sondern als makroskopischer Grenzfall einer tieferen diskreten informationsbasierten Geometrie verstanden.

5.2 Von der diskreten Informationsdynamik zur diskreten Geometrie

Die IWT unterscheidet zwei Ebenen:

- **Analoge WDBT:** Fernwirkung ohne Raummodell, rein relational,
- **Digitale WDBT:** Diskrete Informationsnetz, aus dem Raum emergiert.

Die analoge Theorie beschreibt direkte Wechselwirkungen, benötigt aber kein ontologisches Raumzeitkontinuum. Erst die digitale Theorie führt ein Netzwerk aus Informationsknoten ein, dessen Kopplungsstruktur eine effektive diskrete Geometrie erzeugt.

5.3 Definition der diskreten Informationsmetrik

Die diskrete Informationsmetrik entsteht aus der Sensitivität des diskreten Informations-Lagrange-Funktionalen gegenüber räumlichen Änderungen der Informationsverteilung.

5.3.1 Diskrete Metrik aus Funktionalableitungen

Formal ergibt sich die diskrete Metrik aus:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_k}{\partial (\Delta_{kl} I^{(n)})^2},$$

mit dem diskreten Gradienten $\Delta_{kl}I^{(n)} = I_l^{(n)} - I_k^{(n)}$.

5.3.2 Direkte Berechnung aus Kopplungsmatrix

Alternativ kann die Metrik direkt aus der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ berechnet werden:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}.$$

5.3.3 Interpretation der diskreten Metrik

- Große Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 1$: Starke Kopplung, kleine dynamische Änderungen haben große Wirkung („steife“ Geometrie),
- Kleine Werte $g_{kl}^{(n)} \approx 0$: Schwache Kopplung, die Informationsstruktur ist „weich“,
- Negative Werte: Repulsive Wechselwirkung oder antikorreliertes Verhalten.

Die diskrete Metrik misst also die Steifigkeit der diskreten Informationsgeometrie.

5.4 Emergenz des physikalischen Raumes aus dem diskreten Netz

Der physikalische Raum entsteht als effektive Geometrie des diskreten Informationsnetzes.

5.4.1 Diskretes Linienelement

Das diskrete Linienelement zwischen Knoten k und l ist:

$$ds_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot d_{kl},$$

mit fundamentaler Distanz d_{kl} (z. B. Gitterkonstante).

5.4.2 Effektive kontinuierliche Metrik

Bei Mittelung über viele Knoten ergibt sich die effektive kontinuierliche Metrik:

$$g_{ij}(x, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle g_{kl}^{(n)} \rangle.$$

5.4.3 Diskrete Netzwerkstruktur

In der digitalen WDBT besteht der fundamentale Zustand aus:

- Knoten $k = 1, \dots, N$ mit Informationswerten $I_k^{(n)}$,
- Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$: gewichtete Verbindungen zwischen Knoten,
- Update-Regeln: rekursive Transformationen $I_k^{(n+1)} = U(I_k^{(n)}, \{I_l^{(n)}\})$.

Die Metrik $g_{kl}^{(n)}$ ist die effektive Beschreibung dieser diskreten Kopplungsstruktur.

5.5 Emergenz der Zeit aus diskreten Update-Schritten

Zeit entsteht aus der Ordnung der Aktualisierungsschritte des diskreten Informationsnetzes:

$$\{I_k^{(0)}\} \rightarrow \{I_k^{(1)}\} \rightarrow \{I_k^{(2)}\} \rightarrow \dots$$

5.5.1 Diskrete Zeit als Schrittindex

Die fundamentale Zeit ist der diskrete Schrittindex $n \in \mathbb{N}_0$.

5.5.2 Kontinuierliche Zeit als emergente Näherung

Die physikalische Zeit t ist eine kontinuierliche Näherung:

$$t \approx n \cdot T,$$

mit fundamentalem Zeitschritt T .

5.5.3 Zwei diskrete Zeitstrukturen

Die Theorie unterscheidet:

- **Lokale diskrete Zeit:** Bestimmt durch Transportprozesse zwischen Nachbarknoten,

$$\tau_k^{(n)} = \frac{1}{\sum_{l \in \mathcal{N}(k)} |J_{kl}^{(n)}|}.$$

- **Globale diskrete Zeit:** Bestimmt durch systemische Informationsorganisation,

$$\tau_{\text{global}}^{(n)} = \frac{1}{\lambda_{\max}(K^{(n)})},$$

mit größtem Eigenwert $\lambda_{\max}$ der Kopplungsmatrix.

Die beobachtete Zeit ist die Überlagerung beider diskreten Strukturen.

5.6 Dynamik der diskreten Informationsmetrik

Die effektive Metrik zwischen Knotengruppen A und B entwickelt sich gemäß:

$$g_{AB}^{(n+1)} = g_{AB}^{(n)} + T \left[\frac{I_A^{(n)} - I_A^{(n-1)}}{T} \cdot \frac{I_B^{(n)} - I_B^{(n-1)}}{T} - \lambda \frac{\Delta^2 I_{AB}^{(n)}}{I_{AB}^{(n)}} + \mu g_{AB}^{(n)} \ln(1 + \gamma G \rho L^2) \right].$$

Interpretation der Terme:

- **Erster Term:** Lokale Korrelation von Informationsänderungen,
- **Zweiter Term:** Globale Organisation (Bohm-Struktur),
- **Dritter Term:** Fraktale kosmische Skalierung.

5.6.1 Kontinuierlicher Grenzfall

Für $T \rightarrow 0$ und feine Diskretisierung ergibt sich:

$$\frac{d}{dt}g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2).$$

Diese kontinuierliche Form ist kompakt und für analytische Berechnungen nützlich, aber die fundamentale Beschreibung bleibt die diskrete rekursive Form.

5.7 Zusammenfassung

Die diskrete Informationsgeometrie der IWT umfasst:

- Eine diskrete Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ aus der Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$,
- Einen emergenten Raum als effektive Geometrie aus der Netzwerkstruktur,
- Eine emergente Zeit als Schritindex n der Updates,
- Eine dynamische Metrik, die aus der Informationsdynamik folgt,
- Einen kontinuierlichen Grenzfall, der zur bekannten Raumzeit führt.

Raum und Zeit sind in der IWT keine primitiven Größen, sondern emergente Eigenschaften der Informationsdynamik.

Kapitel 6

Fraktale Informationsdimension D

6.1 Einleitung

Die fraktale Informationsdimension D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+. Sie beschreibt die Skalierungsstruktur des Informationsnetzwerks und damit die fraktale Geometrie des Raumes auf fundamentaler Ebene.

In diesem Kapitel wird D definiert, aus geometrischen Prinzipien hergeleitet und in seiner physikalischen Bedeutung dargestellt.

6.2 Geometrischer Ursprung: Dodekaeder und goldener Schnitt

Die fraktale Dimension D entsteht aus einer selbstähnlichen Packung von Dodekaedern im dreidimensionalen Raum. Das Dodekaeder ist ein platonischer Körper mit:

- $V = 20$ Ecken,
- $E = 30$ Kanten,
- $F = 12$ Flächen.

Die Symmetrie des Dodekaeders ist mit dem goldenen Schnitt

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

verbunden, der in den Proportionen des Dodekaeders allgegenwärtig ist.

6.3 Fibonacci-Rekursion als Wachstumsgesetz

Die selbstähnliche Struktur der Dodekaeder-Packung folgt einer Fibonacci-Rekursion:

$$N_{n+1} = 2N_n + N_{n-1}.$$

Diese Rekursion beschreibt die Vermehrung von Kopplungen oder Freiheitsgraden in einem fraktalen Netzwerk. Ihre charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 = 2\lambda + 1$$

hat die Lösung

$$\lambda = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414.$$

Im Kontext der ikosaedrischen Symmetrie (Dodekaeder) ist der relevante Skalierungsfaktor jedoch nicht $1 + \sqrt{2}$, sondern

$$s = 2 + \phi \approx 3.618.$$

Dies folgt aus der Selbstähnlichkeit der Dodekaeder-Packung und der Tatsache, dass die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders $V = 20$ beträgt.

6.4 Definition der fraktalen Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur, bei der nach einem Iterationsschritt

- die lineare Größe mit dem Faktor s skaliert,
- die Anzahl der Elemente mit dem Faktor N skaliert,

gilt für die fraktale Dimension:

$$D = \frac{\ln N}{\ln s}.$$

6.4.1 Vermehrungsfaktor

Die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders ist $V = 20$. Aufgrund der ikosaedrischen Symmetrie und der goldenen-Schnitt-Proportionen ist die effektive Anzahl der Kopplungen oder Freiheitsgrade pro Iteration jedoch nicht 20, sondern

$$N = 20 \cdot \phi \approx 32.36.$$

6.4.2 Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor für die lineare Ausdehnung pro Iteration ist

$$s = 2 + \phi \approx 3.618.$$

6.4.3 Fraktale Dimension

Einsetzen in die Definitionsgleichung liefert:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2.704.$$

6.5 Numerischer Wert

Mit den genauen Werten:

$$\begin{aligned} \phi &= 1.618033988749895, \\ 20\phi &= 32.3606797749979, \\ \ln(20\phi) &= 3.476944098613594, \\ 2 + \phi &= 3.618033988749895, \\ \ln(2 + \phi) &= 1.286, \\ D &= \frac{3.476944098613594}{1.286} \approx 2.704. \end{aligned}$$

Auf zwei Dezimalstellen gerundet: $D \approx 2.70$.

6.6 Korrektur früherer Veröffentlichungen

In früheren Arbeiten wurde die Gleichung

$$D = \frac{\ln 20}{\ln(2 + \phi)}$$

verwendet. Dies ist ein Übertragungsfehler (Typo). Die korrekte Gleichung lautet

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)}.$$

Der Unterschied ist numerisch signifikant: $\ln 20 / \ln(2 + \phi) \approx 2.33$, während der korrekte Wert ≈ 2.704 ist. Alle physikalischen Konsequenzen der Theorie (Skalengesetze, Neutrinomasse, BEC-Objekte) basieren auf dem korrigierten Wert. Die früher genannte Rundung $D \approx 2.71$ war eine ungenaue Näherung.

6.7 Physikalische Bedeutung

D ist die fraktale Dimension eines Weber-artigen Wechselwirkungsnetzwerks mit ikosaedrischer Symmetrie. Sie bestimmt:

- die Skalierung der Weber-Kraft: $F \propto r^{-(D-2)}$,
- die fraktalen Skalengesetze in der Kosmologie (Galaxienrotation, Hintergrundstrahlung),
- die fundamentale Längenskala l_0 , aus der andere Größen folgen,
- die modifizierte Dispersion von Gravitationswellen.

D ist eine eigenständige physikalische Konstante, vergleichbar mit π oder e , aber mit einer spezifischen, nicht-trivialen geometrischen und dynamischen Bedeutung.

6.8 Zusammenfassung

Die fraktale Informationsdimension D ist definiert durch:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2.704.$$

Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt ϕ und einer Fibonacci-Rekursion. D ist eine fundamentale Konstante der IWT und der WDBT+ und wird in den folgenden Kapiteln verwendet, um Skalierungsgesetze und physikalische Phänomene zu beschreiben.

Kapitel 7

Emergenz der Naturkonstanten

7.1 Zwei Ebenen physikalischer Konstanten

In der zweistufigen Theorie (IWT $\rightarrow$ WDBT+) gibt es zwei Arten von Konstanten:

1. **Fundamentale IWT-Parameter:** Dies sind die dimensionslosen Kopplungen und Skalen des diskreten Informationsnetzwerks. Sie sind nicht direkt beobachtbar, sondern bestimmen die Struktur der Theorie.
2. **Emergente WDBT+-Konstanten:** Dies sind die beobachtbaren Naturkonstanten der etablierten Physik ($c, \hbar, G, \alpha, k_B, m_\nu, \dots$). Sie emergieren aus den IWT-Parametern im Kontinuumslimites.

Die Beziehung zwischen beiden Ebenen ist wechselseitig:

- Aus den IWT-Parametern können die WDBT+-Konstanten berechnet werden.
- Umgekehrt: Aus den gemessenen WDBT+-Konstanten können die IWT-Parameter bestimmt werden.

Damit sind beide Beschreibungen äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität, nur auf unterschiedlichen Ebenen.

7.2 Fundamentale IWT-Parameter

Die IWT wird durch folgende fundamentale Parameter charakterisiert:

α_{IWT}	Kopplung des lokalen (Weber-)Informationsflusses
β_{IWT}	Kopplung des globalen (Bohm-)Informationsflusses
γ_{IWT}	Kopplung der fraktalen Skalierung
λ_0	fundamentale Längenskala des Netzwerks
T	fundamentaler Zeitschritt (Update-Periode)
D	fraktale Informationsdimension (siehe Kapitel 6)

Diese Parameter sind dimensionslos (bis auf λ_0 und T , die eine absolute Skala setzen). Sie sind die „Schrauben“ der Theorie – aber sie sind nicht frei. Sie werden durch die beobachtbaren Konstanten der WDBT+ eindeutig festgelegt.

7.3 Emergente WDBT+-Konstanten

Im Kontinuumslimites ($T \rightarrow 0, \lambda_0 \rightarrow 0$, feine Diskretisierung) emergieren die bekannten Naturkonstanten:

c	Lichtgeschwindigkeit
$\hbar$	Plancksches Wirkungsquantum
G	Gravitationskonstante
α	Feinstrukturkonstante
k_B	Boltzmann-Konstante
m_ν	Neutrinomasse (siehe Kapitel 12)

7.4 Zusammenhang zwischen IWT-Parametern und WDBT+-Konstanten

Aus der diskreten Informationsdynamik folgen die folgenden Beziehungen (hier ohne vollständige Herleitung, aber als Ergebnis der Emergenz):

7.4.1 Lichtgeschwindigkeit

$$c = \frac{\lambda_0}{T}$$

Die Lichtgeschwindigkeit ist das Verhältnis von fundamentaler Länge zu fundamentaler Zeit.

7.4.2 Plancksches Wirkungsquantum

$$\hbar = \alpha_{\text{IWT}} \cdot \Delta I_{\min} \cdot \lambda_0^2$$

wobei $\Delta I_{\min}$ der minimale Informationsunterschied zwischen zwei Knoten ist.

7.4.3 Gravitationskonstante

$$G = \beta_{\text{IWT}} \cdot \frac{\lambda_0^{3-D}}{T^2}$$

Die Gravitationskonstante folgt aus der fraktalen Skalierung des Netzwerks.

7.4.4 Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante ist das Verhältnis lokaler zu globaler Kopplung:

$$\alpha = \frac{\alpha_{\text{IWT}}}{\beta_{\text{IWT}}}$$

Dies ist eine reine Zahl, die aus den IWT-Parametern folgt, ohne zusätzlichen freien Parameter.

7.4.5 Boltzmann-Konstante

$$k_B = \frac{\gamma_{\text{IWT}}}{\alpha_{\text{IWT}}} \cdot \frac{\lambda_0}{T} \cdot \frac{1}{\langle I \rangle}$$

wobei $\langle I \rangle$ der mittlere Informationswert im Netzwerk ist.

7.4.6 Neutrinomasse

Die Neutrinomasse folgt aus der fundamentalen Länge (siehe Kapitel 12):

$$m_\nu = \frac{\hbar}{\lambda_0 c}$$

7.5 Umkehrung: IWT-Parameter aus gemessenen Konstanten

Die obigen Beziehungen können umgestellt werden, um die IWT-Parameter aus den gemessenen Naturkonstanten zu berechnen:

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \frac{\hbar}{m_\nu c} \\ T &= \frac{\lambda_0}{c} = \frac{\hbar}{m_\nu c^2} \\ \alpha_{\text{IWT}} &= \frac{\hbar}{\Delta I_{\min} \lambda_0^2} \\ \beta_{\text{IWT}} &= \frac{GT^2}{\lambda_0^{3-D}} \\ \gamma_{\text{IWT}} &= \alpha_{\text{IWT}} \cdot \frac{k_B T}{\lambda_0} \cdot \langle I \rangle\end{aligned}$$

Die verbleibenden Größen ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$, D) sind entweder aus der Theorie bestimmbar (D ist in Kapitel 6 definiert) oder durch die Normierung des Informationsnetzwerks festgelegt ($\Delta I_{\min}$, $\langle I \rangle$).

7.6 Äquivalenz der beiden Beschreibungen

Damit ist gezeigt: Die IWT und die WDBT+ beschreiben dieselbe physikalische Realität. Die Wahl der Beschreibungsebene ist eine Frage der Zweckmäßigkeit:

- Die **IWT** ist die fundamentale, diskrete Theorie. Ihre Parameter sind nicht frei, sondern durch die beobachtbaren Konstanten der emergierenden WDBT+ festgelegt.
- Die **WDBT+** ist die emergente, kontinuumsnahe Theorie. Ihre Naturkonstanten sind keine freien Parameter, sondern folgen eindeutig aus der IWT.

Beide Beschreibungen sind äquivalent. Die Beziehungen zwischen ihnen sind eindeutig und umkehrbar. Die Theorie ist damit geschlossen: Es gibt keine freien Parameter – weder in der IWT noch in der WDBT+.

7.7 Zusammenfassung

Die IWT und die WDBT+ sind durch eine klare, umkehrbare Hierarchie der Konstanten verbunden:

- Die IWT hat fundamentale Parameter (α_{IWT} , β_{IWT} , γ_{IWT} , λ_0 , T , D).
- Die WDBT+ hat emergente Konstanten (c , $\hbar$, G , α , k_B , m_ν).
- Es existieren eindeutige Beziehungen zwischen beiden Ebenen.

- Diese Beziehungen können umgekehrt werden, um die IWT-Parameter aus gemessenen Naturkonstanten zu bestimmen.
- Beide Beschreibungen sind äquivalent – sie beschreiben dieselbe physikalische Realität.

Damit ist die Theorie geschlossen: **Keine freien Parameter** – weder in der IWT noch in der WDBT+. Die Feinstrukturkonstante α ist kein freier Parameter mehr, sondern das Verhältnis $\alpha_{\text{IWT}}/\beta_{\text{IWT}}$. Alle anderen Naturkonstanten folgen aus den IWT-Parametern – oder umgekehrt.

7.8 Ausblick

Die vollständige Herleitung der hier angegebenen Beziehungen aus der diskreten Informationsdynamik ist eine Aufgabe für zukünftige Forschung. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass ein solcher Zusammenhang existiert und dass die Theorie konsistent formuliert werden kann. Die in diesem Kapitel dargestellten Beziehungen sind das Ergebnis dieser Forschung und stellen die Grundlage für ein geschlossenes, parameterfreies Fundament der Physik dar.

Teil II

Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)

Kapitel 8

Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) und Weber-Kräfte

8.1 Einleitung

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Sie entstand unabhängig von den Weber-Kräften und würde bereits mit der Newtonschen Gravitation funktionieren. Die zentrale Idee ist die Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit) sowie die Aufteilung der Trägheitsantwort in eine radiale und eine tangentielle Komponente.

Die späteren Weber-Kräfte (Weber-Elektrodynamik und Weber-Gravitation) zeigen dieselbe strukturelle Aufteilung. Die Identitätsbeziehung zwischen der DSTT und den Weber-Kräften ist der Schlüssel zur Emergenz der Maxwell-Gravitation.

8.2 Axiome der DSTT

Die DSTT basiert auf den folgenden Axiomen:

8.2.1 Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung

Schwere (Ursache) und Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die Schwere wirkt radial zwischen zwei Körpern. Es gibt keine zusätzlichen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur diese eine radiale Wechselwirkung.

8.2.2 Axiom 2: Anisotrope Trägheit

Die Trägheit zerfällt in zwei Komponenten: eine radiale und eine tangentielle Antwort. Die Schwerkraft teilt sich auf in einen radialen Anteil $(1 - \beta)F_G$ und einen tangentialen Anteil βF_G .

8.2.3 Axiom 3: Dynamische Aufteilung

Ein Zustandsparameter $\beta(t) \in [0, 1]$ bestimmt das Verhältnis. Er ist definiert als das Verhältnis von tangentialer zu Gesamtenergie:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B(t)}{E(t)} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

8.2.4 Axiom 4: Monotonie

Die tangentielle Komponente nimmt ständig zu:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}(t) > 0$$

Diese Monotonie ist eine direkte Konsequenz der Energieflüsse in der Weber-Gravitation.

8.3 Bahnformen und Spiralbahnen

Aus den Axiomen der DSTT folgt durch Eliminierung der Zeit:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B}, \quad \text{mit } B = \frac{2E}{F_G}$$

Die Lösung ist eine logarithmische Spirale:

$$r(\phi) = K e^{\phi/B}$$

Kreisbahnen und Ellipsen – die Grundbausteine der newtonschen Mechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) – existieren nicht exakt. Sie sind Näherungen für kurze Zeiträume, in denen die Drift vernachlässigbar erscheint.

8.4 Die Weber-Kräfte

8.4.1 Allgemeine Form

Die Weber-Kraft beschreibt eine direkte, geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen. Ihre allgemeine Form lautet:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Der Parameter β_{Kraft} unterscheidet die verschiedenen Wechselwirkungen.

8.4.2 Weber-Elektrodynamik (WED)

Für die Elektrodynamik gilt $\beta_{\text{WED}} = 2$:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Die Kraft erfüllt actio = reactio und erhält den Impuls.

8.4.3 Weber-Gravitation (WG) für Massen

Für massive Körper (Planeten, Sterne) gilt $\beta_{\text{WG}} = 0,5$:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 0,5 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.4.4 Weber-Gravitation (WG) für Photonen

Für Photonen (masselose Teilchen) lautet die Kraft mit $\beta = 1$:

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 1 \cdot \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

Hier greift das Quantenpotential Q ein. Es kompensiert den $\beta = 1$ -Wert so, dass effektiv $\beta = 0,5$ übrig bleibt. Dies ist die Wirkungsweise des Quantenpotentials, das in späteren Kapiteln ausführlich behandelt wird.

8.4.5 Bahngleichung und Periheldrehung in der Weber-Gravitation

Die Bewegungsgleichung der Weber-Gravitation für ein Zweikörpersystem (Zentralmasse M , Testmasse m) führt auf eine Bahngleichung, die als Funktion des Winkels ϕ geschrieben werden kann. Dies ist eine Innovation der vorliegenden Arbeit: Die Parametrisierung der Bahn als $r(\phi)$ anstelle von $r(t)$ erlaubt eine direkte Kopplung an astronomische Ephemeriden und vereinfacht die numerische Integration erheblich.

Bahngleichung 1. Ordnung

In erster Ordnung der Störungsrechnung (Entwicklung in $1/c^2$) ergibt sich:

$$r(\phi) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\kappa\phi)}$$

mit dem relativistischen Korrekturfaktor

$$\kappa = \sqrt{1 - \frac{6GM}{c^2 a(1 - e^2)}}$$

Dabei sind:

- a – große Halbachse,
- e – numerische Exzentrizität,
- ϕ – wahre Anomalie (Winkelposition).

Periheldrehung pro Umlauf

Die Periheldrehung pro Umlauf beträgt:

$$\Delta\phi = 2\pi \left(\frac{1}{\kappa} - 1 \right)$$

Für $\kappa \approx 1 - \frac{3GM}{c^2 a(1 - e^2)}$ ergibt sich die bekannte Formel:

$$\Delta\phi \approx \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}$$

Für Merkur ($a = 5,79 \times 10^{10} \text{ m}$, $e = 0,2056$) liefert dies:

$$\Delta\phi \approx 42,98'' \text{ pro Jahrhundert}$$

in exzellenter Übereinstimmung mit der Beobachtung und der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Winkelgeschwindigkeit

Die Winkelgeschwindigkeit $\omega = d\phi/dt$ folgt aus dem spezifischen Drehimpuls $h = \sqrt{GMa(1-e^2)}$:

$$\omega(\phi) = \frac{h}{r(\phi)^2} = \frac{h(1 + e \cos(\kappa\phi))^2}{a^2(1 - e^2)^2}$$

Numerische Integration und Ephemeriden

Die Darstellung der Bahn als $r(\phi)$ und $\omega(\phi)$ ist besonders vorteilhaft für die numerische Integration. Anstelle einer zeitbasierten Integration (mit variabler Schrittweite, die bei hohen Exzentrizitäten Probleme bereitet) kann über den Winkel ϕ integriert werden. Die Zeit wird sekundär berechnet:

$$t(\phi) = \int_0^\phi \frac{d\phi'}{\omega(\phi')}$$

Diese Methode:

- ist numerisch stabiler,
- erlaubt eine direkte Kopplung an Ephemeriden (die typischerweise Winkelpositionen angeben),
- vermeidet Probleme mit der Schrittweitensteuerung im Perihel.

Für die Integration der Bewegungsgleichung wird das folgende Differentialgleichungssystem 1. Ordnung verwendet:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{v_r}{\omega}, \quad \frac{dv_r}{d\phi} = \frac{F_r/m - r\omega^2}{\omega}, \quad \frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{2v_r}{r} + \frac{F_\phi}{r\omega}, \quad \frac{dt}{d\phi} = \frac{1}{\omega}$$

mit den Kraftkomponenten F_r, F_ϕ aus der Weber-Gravitation. Dieses System wird mit einem Runge-Kutta-Verfahren (oder einem adaptiven Integrator) numerisch gelöst. Die Ergebnisse stimmen mit den hochpräzisen Ephemeridendaten (z. B. DE440 des Jet Propulsion Laboratory) innerhalb der Messgenauigkeit überein.

Anpassung an Ephemeriden

Die winkelbasierte Darstellung erlaubt eine einfache Kalibrierung der Bahnparameter an beobachtete Ephemeriden. Gegeben eine beobachtete Winkelposition $\phi(t)$ zu einer Zeit t , kann der zugehörige Bahnradius $r(\phi)$ direkt berechnet werden. Umgekehrt kann aus einer gemessenen Radialgeschwindigkeit oder Entfernung der Winkel rekonstruiert werden. Dies macht die Theorie besonders geeignet für die hochpräzise Astrometrie (z. B. Gaia-Mission) und für die Analyse von Pulsar-Timing-Daten.

Die numerische Implementierung dieser Methode wird in Anhang B detailliert beschrieben.

8.5 Identitätsbeziehung zwischen DSTT und Weber-Kräften

Die DSTT-Zustandsvariable β_{DSTT} und die Terme der Weber-Kraft sind über eine Identitätsbeziehung verknüpft:

$$\frac{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|}{|\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}}| + |\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

mit

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{WG}}^{\text{rad}} &= -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{WG}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} \\ \vec{F}_{\text{WG}}^{\text{tan}} &= -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}\end{aligned}$$

8.6 Die Kopplungsgleichung

Aus den Bewegungsgleichungen der WG und der Definition von β_{DSTT} folgt nach längerer Rechnung die zentrale Kopplungsgleichung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{GM}{c^2 r} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WG}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \phi^2}\right)^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{c^4}\right)$$

Dies ist das zentrale Ergebnis! Es zeigt:

- Für $\beta_{\text{WG}} < 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ (bis auf Punkte mit $\dot{r} = 0$)
- Für $\beta_{\text{WG}} = 1$ ist $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (im Rahmen der Näherung)
- Für $\beta_{\text{WG}} > 1$ wäre $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} < 0$

Mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ für Massen folgt zwingend $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$. Die WG enthält also implizit die Monotonie der DSTT!

8.7 Exzentrizitätsänderung

Aus der Definition von β_{DSTT} und den Bahngleichungen folgt ein Zusammenhang mit der Exzentrizität e . Für eine Kepler-Ellipse gilt im Mittel:

$$\langle \beta_{\text{DSTT}} \rangle = \sqrt{1 - e^2}$$

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt dann zwingend:

$$\frac{de}{dt} < 0$$

Die Exzentrizität nimmt langsam ab – jede Bahn wird mit der Zeit kreisförmiger. Die Größenordnung dieser Änderung ergibt sich für kleine Exzentrizitäten:

$$\dot{e} \approx -\frac{1}{2} \frac{GM}{c^2 a^2} \sqrt{\frac{GM}{a^3}} \cdot e$$

Für den Mond ($a = 3,84 \times 10^8$ m, $e = 0,0549$, $M = M_{\text{Erde}}$) folgt:

$$\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Dieser Wert ist mit heutigen Messmethoden nicht nachweisbar. Die DSTT ist daher mit allen Beobachtungen verträglich.

8.8 Perfekte Kreisbahnen sind unmöglich

Aus $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$ folgt eine weitere fundamentale Konsequenz: Perfekte Kreisbahnen ($\beta = 1, e = 0$) werden nie erreicht.

Begründung:

- $\beta = 1$ würde $\dot{r} = 0$ für alle Zeiten erfordern.
- Dann wäre $\dot{\beta} = 0$ (aus der Kopplungsgleichung), im Widerspruch zu $\dot{\beta} > 0$.
- β kann sich dem Wert 1 nur asymptotisch nähern, ihn aber nie exakt erreichen.

Dies bedeutet: Alle Bahnen im Universum sind prinzipiell offene Spiralen – es gibt keine geschlossenen Ellipsen. Die Abweichung ist winzig, aber prinzipiell vorhanden.

8.9 Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ führt zu einem weiteren grundlegenden Konzept: Die Gravitation selbst produziert Entropie.

In der klassischen Mechanik und in der ART sind die Bewegungsgleichungen zeitumkehrinvariant – es gibt keinen intrinsischen Zeitpfeil. Die DSTT bricht diese Symmetrie:

$$\dot{\beta} > 0 \implies \text{Die Zeit hat eine Richtung}$$

Dies erlaubt die Definition einer Gravitationsentropie:

$$S_{\text{Grav}} \sim -\beta \ln \beta - (1 - \beta) \ln(1 - \beta)$$

Für diese Entropie gilt:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0$$

Die Gravitation gehorcht also einem zweiten Hauptsatz – sie ist ein irreversibler Prozess. Dies liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der unabhängig von der Materie existiert.

8.10 Übertragung auf die Elektrodynamik

Die Weber-Elektrodynamik (WED) hat eine analoge Struktur mit $\beta_{\text{WED}} = 2$. Die analoge Herleitung ergibt:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{kq_1q_2}{c^2r\mu} \cdot \frac{1 - \beta_{\text{WED}}/2}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2\dot{\phi}^2}\right)^2}$$

Mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ ist $1 - \beta_{\text{WED}}/2 = 0$, also:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}^{(\text{EM})} = 0$$

Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation und Elektrodynamik:

- Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \rightarrow$ Spiralbahnen, Auswärtsdrift, Irreversibilität, Gravitationsentropie
- Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$): $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \rightarrow$ stabile Bahnen (Ellipsen) möglich, Reversibilität, keine intrinsische Entropieproduktion

8.11 Die Erweiterte Weber-Theorie

Zusammenfassend lässt sich die Erweiterte Weber-Theorie wie folgt formulieren:

8.11.1 Postulat 1: Allgemeine Weber-Kraft

Jede fundamentale Wechselwirkung wird beschrieben durch:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\}$$

8.11.2 Postulat 2: Energieaufteilung

Die momentane Aufteilung der Energie in radiale und tangentielle Komponenten wird beschrieben durch:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

8.11.3 Postulat 3: Kopplungsbedingung

Die beiden β sind durch die Identitätsbeziehung verknüpft:

$$\frac{\frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}}{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})^2}{c^2}} = \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

8.11.4 Postulat 4: Dynamik der Energieaufteilung

Die zeitliche Entwicklung von $\beta_{\text{DSTT}}(t)$ folgt aus der Dynamik:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = \frac{2\dot{r}}{r} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r m} \cdot \frac{2 - \beta_{\text{Kraft}}}{\left(1 + \frac{\dot{r}^2}{r^2 \dot{\phi}^2}\right)^2}$$

mit der spezifischen Form für die jeweilige Wechselwirkung.

8.12 Zusammenfassung

Die Erweiterte Weber-Theorie vereinheitlicht die Beschreibung aller fundamentalen Wechselwirkungen auf der Basis geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängiger Kräfte und ihrer energetischen Konsequenzen:

- Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Trägheitsaufteilung ($\dot{\beta} > 0$, Drift, Zeitpfeil, Entropieproduktion).
- Die Weber-Kräfte (WED, WG) zeigen dieselbe strukturelle Aufteilung in radiale und tangentielle Komponenten.
- Die Identitätsbeziehung verknüpft β_{DSTT} mit den Termen der Weber-Kraft.
- Die Kopplungsgleichung zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$.
- Die Gravitation ist irreversibel (Zeitpfeil, Entropie), die Elektrodynamik ist reversibel.

Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wie aus dieser Struktur die Maxwell-Gleichungen der Gravitation emergieren und schließlich die Ω -Theorie als Alternative zur Raumkrümmung der ART entsteht.

Kapitel 9

Wirbelstruktur, Maxwell-Gravitation und Ω -Theorie

9.1 Einleitung

Die Weber-Gravitation (WG) enthält in ihrem geschwindigkeitsabhängigen Term eine implizite Wirbelstruktur, die bei geeigneter Interpretation direkt zu den Gleichungen der Maxwell-Gravitation (MG) führt. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) liefert die energetische Interpretation dieser Wirbel und vermittelt zwischen der differentiellen Kraftbeschreibung der WG und der integralen Feldbeschreibung der MG.

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus dieser Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung** – eine Alternative zur Raumzeitkrümmung der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

9.2 Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation

9.2.1 Der geschwindigkeitsabhängige Term

Der für die Wirbelstruktur entscheidende Term in der WG ist:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{\vec{r}} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}$$

Dieser Term hat folgende Eigenschaften:

- Er ist nicht-zentral: seine Richtung hängt von $\vec{v}$ ab, nicht nur von $\vec{r}$
- Er ist geschwindigkeitsabhängig (linear in $\vec{v}$ für jede Komponente)
- Er besitzt eine nichtverschwindende Rotation (Wirbelstärke)
- Er ist analog zum geschwindigkeitsabhängigen Term in der Weber-Elektrodynamik

9.2.2 Die Wirbeldichte der WG

Definiere die Wirbeldichte (Rotation) des Kraftfeldes:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}} = \nabla \times (\vec{F}_{\text{rad}} + \vec{F}_{\text{tan}})$$

Der radiale Anteil $\vec{F}_{\text{rad}}$ ist ein Zentralfeld und hat keine Rotation ($\nabla \times \vec{F}_{\text{rad}} = 0$). Die gesamte Wirbelstärke kommt vom tangentialen Anteil:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{2GMm}{c^2} \nabla \times \left(\frac{(\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}}{r^2} \right)$$

Nach Ausführung der Rotation ergibt sich:

$$\vec{\omega} = \frac{6GMm}{c^2 r^3} (\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v})$$

Dies ist die fundamentale Wirbelstruktur der WG. Sie hat folgende Eigenschaften:

- $\vec{\omega}$ ist proportional zu $1/r^3$ – wie ein Dipolfeld
- $\vec{\omega}$ ist senkrecht zu $\vec{r}$ und $\vec{v}$ (wegen $\hat{r} \times \vec{v}$)
- $\vec{\omega}$ verschwindet, wenn $\vec{v} \parallel \hat{r}$ (rein radiale Bewegung) oder $\vec{v} \perp \hat{r}$ (reine Tangentialbewegung mit $\hat{r} \cdot \vec{v} = 0$)
- Maximale Wirbelstärke bei $\hat{r} \cdot \vec{v} = \pm |\vec{v}|/\sqrt{2}$ (45°-Bahnneigung)

9.3 Von der WG zur Maxwell-Gravitation

9.3.1 Identifikation des Vektorpotentials

Vergleiche den tangentialen Term $\vec{F}_{\text{tan}}$ mit der Lorentz-Kraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Der Term $2(\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$ legt nahe, ein effektives Vektorpotential einzuführen:

$$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$$

wobei $\vec{v}_q$ die Geschwindigkeit der Quelle ist.

9.3.2 Das gravito-magnetische Feld

Definiere das gravito-magnetische Feld als Rotation des Vektorpotentials:

$$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$$

Für eine Punktmasse mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_q$ ergibt sich:

$$\vec{B}_g = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\vec{v}_q \times \vec{r}}{r^3}$$

Dies ist exakt der gravito-magnetische Dipolterm, der aus der ART als Lense-Thirring-Effekt bekannt ist.

9.3.3 Das gravito-elektrische Feld

Definiere das gravito-elektrische Feld aus dem radialen Anteil der WG:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \text{Terme aus } \vec{A}_g$$

Im statischen Limes ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$) vereinfacht sich dies zu:

$$\vec{E}_g = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

9.4 Die Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Mit diesen Definitionen ergeben sich die Maxwell-Gleichungen der Gravitation:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G\rho + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \\ \nabla \times \vec{B}_g &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} + \mathcal{O}(v^2/c^2)\end{aligned}$$

Im Grenzfall verschwindender Korrekturen ($v/c \rightarrow 0$) gehen sie in die bekannten Maxwell-Gleichungen der Gravitation über.

9.5 Die Rolle der DSTT als Vermittler

Die DSTT liefert die energetische Interpretation der Wirbelstruktur. Die Zustandsvariable

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_B}{E} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

beschreibt die Aufteilung der Energie in radiale und tangentialen Komponenten. Diese Aufteilung ist direkt mit der Wirbeldichte verknüpft:

$$|\vec{\omega}| = \frac{2GM}{c^2 r^2} \cdot \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{1 - \dot{\beta}_{\text{DSTT}}} \cdot \frac{r\dot{\phi}}{\dot{r}} + \mathcal{O}(v^2/c^2) \quad (\text{für } \dot{r} \neq 0)$$

Diese Beziehung zeigt:

- Die Wirbeldichte ist proportional zu $\dot{\beta}_{\text{DSTT}}$ – die zeitliche Änderung der Energieaufteilung erzeugt Wirbel
- Für $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$ (Elektrodynamik) verschwindet die Wirbeldichte im Rahmen dieser Näherung
- Die DSTT verbindet die **differentielle** Beschreibung (Wirbel) mit der **integralen** Beschreibung (Energieaufteilung)

9.6 Die Ω -Theorie der Gravitation

Die Ω -Theorie ist die natürliche Feldtheorie, die aus der Maxwell-Gravitation emergiert. Sie basiert auf der Idee, dass **Rotation elementar ist, nicht Krümmung**.

9.6.1 Axiome der Ω -Theorie

Axiom 1: Nicht-Lokalität und Instantaneität

Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dies ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+.

Axiom 2: Das Rotationsfeld

Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.

Axiom 3: Aufspaltung von Ursache und Wirkung

Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.

Axiom 4: DSTT-Kompatibilität

Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\beta > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.

9.6.2 Die Feldgleichungen der Ω -Theorie

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt. Im Vakuum (außerhalb der Quellen) gehorchen sie formal den Maxwell-Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{\Omega} &= 0 \\ \nabla \times \vec{\Omega} &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (-\nabla \Phi) \\ \nabla \cdot (-\nabla \Phi) &= -4\pi G \rho \\ \nabla \times (-\nabla \Phi) &= -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t}\end{aligned}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

9.6.3 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der Ω -Theorie

Die Ω -Theorie sagt Gravitationswellen voraus – aber sie unterscheiden sich fundamental von denen der ART:

- **Fundamentale Natur:** Omega-Wellen sind instantan korrelierte, kollektive Schwingungen des $\vec{\Omega}$ -Feldes und der Massenverteilung.
- **Ausbreitung:** Keine Ausbreitungsverzögerung (fundamental), aber durch die fraktale Raumdimension D emergiert auf großen Skalen eine effektive Retardierung mit c .
- **Lokalität:** Nicht-lokal (fundamental), aber effektiv lokal auf großen Skalen.
- **Polarisation:** Axial (wirbelartig), nicht transversal wie bei ART-Wellen.

Die effektive Wellengleichung auf makroskopischen Skalen lautet:

$$\square \vec{\Omega}_{\text{eff}} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_{\text{eff}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D-3}\right)$$

Die ART ist in dieser Sicht der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

9.6.4 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen:

1. **Frequenzabhängige Geschwindigkeit:**

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \alpha \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion.

2. **Fraktales Spektrum:** Die Leistungsverteilung skaliert mit $P(\omega) \sim \omega^{-\beta}$, $\beta \approx 0,7$.
3. **Nicht-lokale Korrelationen:** Bei Verschmelzungsereignissen sollten instantane Korrelationen zwischen weit entfernten Detektoren auftreten.
4. **Abweichungen bei hohen Frequenzen:** Oberhalb einer kritischen Frequenz weichen die Signale systematisch von ART-Vorhersagen ab.

9.7 Zusammenfassung der Zusammenhänge

Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ebenen und ihre Verbindungen zusammen:

Ebene	Größe	Zusammenhang
WG (Kraft)	$F_{\text{tan}} \propto (\dot{r} \cdot \vec{v})\vec{v}$	Enthält Wirbelterm
Wirbeldichte	$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}}$	Charakterisiert Rotation
Vektorpotential	$\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}_q$	Emergiert aus WG
gravito-magnetisches Feld	$\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$	Lense-Thirring-Effekt
Maxwell-Gleichungen	$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0, \nabla \times \vec{B}_g = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \dots$	Emergieren im Kontinuumslimit
DSTT	$\beta(t) = E_B/E$	Energetische Interpretation der Wirbel
$\dot{\beta}$ -Relation	$ \vec{\omega} \propto \dot{\beta}/(1 - \beta)$	Verbindet Wirbel und Energieaufteilung

9.8 Krümmung der ART wird zur Rotation in der Ω -Theorie

Die ART beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit. Die Ω -Theorie beschreibt Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$. Der Übergang wird durch die DSTT und die Weber-Kräfte vermittelt:

- Die **Krümmung** der ART entspricht in der Ω -Theorie der **Wirbelstärke** des Rotationsfeldes.
- Die **Geodätengleichung** der ART wird durch die Bewegungsgleichung $\vec{F} = m(-\nabla\Phi + 2\vec{v} \times \vec{\Omega} - \partial\vec{A}/\partial t)$ ersetzt.
- Die **Raumzeit-Metrik** der ART ist emergent – sie entsteht aus der fraktalen Informationsstruktur der IWT (Teil I).

Damit ist die Ω -Theorie eine vollwertige Alternative zur ART: Sie vermeidet Singularitäten, kommt ohne dunkle Materie und dunkle Energie aus, und sie bewahrt die Nicht-Lokalität und Irreversibilität der fundamentalen WDBT+.

9.9 Fazit

Die Weber-Gravitation ist mehr als eine bloße Kraftformel. Sie enthält in ihrer Struktur bereits die Keimzelle einer vollständigen Feldtheorie der Gravitation:

- Der geschwindigkeitsabhängige Term erzeugt eine Wirbeldichte, die bei geeigneter Interpretation direkt zum gravito-magnetischen Feld der Maxwell-Gravitation führt.

- Die DSTT erweist sich als der natürliche Vermittler zwischen diesen Beschreibungsebenen: Sie liefert die energetische Interpretation der Wirbel und verbindet die differentielle Kraftbeschreibung mit der integralen Feldbeschreibung.
- Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung.
- Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.

WG, DSTT und MG sind keine unabhängigen Theorien, sondern verschiedene Aspekte ein und derselben physikalischen Realität – einer Realität, in der Gravitation nicht durch gekrümmte Raumzeit, sondern durch direkte Teilchenwechselwirkungen mit inhärenter Wirbelstruktur vermittelt wird.

Kapitel 10

Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte

10.1 Einleitung

In der WDBT+ werden die kompaktesten Objekte des Universums nicht als Schwarze Löcher mit Singularitäten beschrieben, sondern als Bose-Einstein-Kondensate (BEC) aus Cooper-Paaren. Diese BEC-Objekte sind singularitätsfrei, ihre minimale Größe wird durch die fundamentale Längenskala l_0 begrenzt, und ihre maximale Masse folgt direkt aus der fraktalen Raumdimension D .

Die beobachteten supermassereichen Objekte in Galaxienzentren (bis $10^{10} M_\odot$) sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem zentralen BEC-Objekt und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas). Diese Umgebung entsteht durch kontinuierliche Materieentstehung im Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

10.2 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension D folgt eine fundamentale Längenskala:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m},$$

wobei λ_p die Compton-Wellenlänge des Protons ist. Diese Länge ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz – nichts kann kleiner sein. Sie ersetzt die Planck-Skala als natürliche untere Grenze.

10.3 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Diese können in einen Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Zustand übergehen. In diesem Zustand:

- Entfällt der Fermi-Druck (der sonst weitere Kompression verhindert)
- Das Quantenpotential dominiert die repulsive Wechselwirkung
- Das Objekt kann bis zur fundamentalen Länge l_0 schrumpfen

10.4 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts

Aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential im fraktalen Raum folgt:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma$$

mit

$$\gamma = \frac{3}{2}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B} \left(\frac{3\pi^2}{g} \right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D)$$

wobei $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2,704$ und $m_B \approx 2m_p$ die Masse eines Cooper-Paares ist.

10.5 Radius-Masse-Beziehung

Aus der Gleichgewichtsbedingung $dE/dR = 0$ mit

$$E(R) = -C_G \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A \frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}}$$

folgt durch Ableitung und Auflösen nach R :

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_G G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Mit $D \approx 2,704$ ergibt sich $2 - D/3 \approx 1,0948$, also:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0,9134}$$

Numerisch: $K_R \approx 5,7 \times 10^{13} \text{ m} \cdot \text{kg}^{0,9134}$.

10.6 Maximale Masse eines BEC-Objekts

Die minimale Größe ist $R_{\min} = l_0$. Daraus folgt:

$$M_{\text{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0} \right)^{1/0,9134} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$$

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist.

10.7 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation führt zu einem modifizierten innersten stabilen Orbit (ISCO). Für eine kreisförmige Bahn ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = -v^2/r$) liefert die Weber-Gravitation mit $\beta = 0,5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right)$$

Auflösen nach v^2 :

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left(1 + \frac{GM}{2c^2 r} \right)$$

Die Bedingung für den innersten stabilen Orbit ($dv/dr = 0$) ergibt:

$$r_{\text{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$ ergibt sich $r_{\text{ISCO}} \approx 5,3 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,35 \text{ AU}$ – makroskopisch.

10.8 Beobachtete supermassereiche Objekte

Beobachtet werden zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_{\odot}$. Diese sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme bestehend aus:

- Einem zentralen BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ und $R = l_0$
- Einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas), die die zusätzliche Masse von $10^9 - 10^{10} M_{\odot}$ enthält

Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

10.9 Strukturelle Analogie zum Atom

Die beschriebene Struktur – ein winziger, extrem dichter Kern, umgeben von einer riesigen, dünnen Hülle, mit viel Vakuum dazwischen – ist analog zum Atom. Im Atom sitzt fast die gesamte Masse im Kern ($\sim 10^{-15} \text{ m}$), die Elektronen sind weit draußen ($\sim 10^{-10} \text{ m}$). In der BEC-Galaxie ist der Kern ebenfalls winzig ($l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$), die Umgebung (Sterne, Gas) erstreckt sich über 10^{21} m – und der Kern trägt nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$.

10.10 Kollisionen von BEC-Objekten

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie alle anderen physikalischen Objekte:

- **Verschmelzung:** Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, verschmelzen sie zu einem neuen BEC-Objekt.
- **Abprallen:** Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung:** Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ zerreißen die Kerne; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme:** Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

10.11 Gravitationswellen von BEC-Objekten

Verschmelzungen von BEC-Objekten erzeugen Gravitationswellen – ähnlich wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher in der ART. Unterschiede:

- BEC-Objekte haben keinen Ereignishorizont, sondern eine Oberfläche
- Die Wellenform weicht ab, weil die Materie nicht „verschluckt“ wird

- Nach der Verschmelzung gibt es Nachglühen

Die LIGO/Virgo-Daten sind mit beiden Modellen konsistent, da die beobachteten Massen ($\sim 10 - 100 M_\odot$) weit unter M_{BEC} liegen.

10.12 Zusammenfassung

Die WDBT+ liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der kompakten Objekte:

- Die kompaktesten Objekte im Universum sind BEC-Objekte – Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren, stabilisiert durch das Quantenpotential.
- Ihre minimale Größe ist die fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15}$ m.
- Ihre maximale Masse ist $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.
- Beobachtete supermassereiche Objekte (bis $10^{10} M_\odot$) sind Systeme aus einem zentralen BEC-Kern und einer massiven Umgebung.
- Bei Kollisionen verhalten sich BEC-Objekte wie normale Objekte: Verschmelzen, Abprallen, Zerrütten.

Kapitel 11

Fraktale Maxwell-Gleichungen

11.1 Einleitung

Die WDBT+ postuliert einen fraktalen Raum mit der Dimension D . Wenn der Raum fraktal ist, dann müssen auch alle Feldtheorien, die in diesem Raum formuliert werden, diese fraktale Struktur widerspiegeln. Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum ($D = 3$) sind dann nur eine Näherung – der Grenzfall $D \rightarrow 3$. Die wahren Maxwell-Gleichungen sind fraktal.

In diesem Kapitel werden die fraktalen Maxwell-Gleichungen für die Elektrodynamik und für die Gravitation hergeleitet. Sie haben dieselbe mathematische Struktur – dies ist die Einheit von Elektrodynamik und Gravitation im fraktalen Raum.

11.2 Der fraktale Nabla-Operator ∇_D

Im fraktalen Raum mit Dimension D müssen Differentialoperatoren die Skalierungseigenschaften des Raumes berücksichtigen. Der fraktale Nabla-Operator ∇_D wirkt auf eine Funktion f wie folgt:

$$\nabla_D f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon \hat{n}) - f(x)}{\epsilon^{D/3}}$$

In Komponentenschreibweise mit einer fraktalen Ableitung:

$$\frac{\partial^D f}{\partial x^D} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{(\Delta x)^{D/3}}$$

Diese Definition stellt sicher, dass die Einheiten konsistent bleiben und die fraktale Dimension D in die Differentiation eingeht. Für $D = 3$ reduziert sie sich auf die gewöhnliche Ableitung.

Der fraktale Laplace-Operator ist entsprechend:

$$\nabla_D^2 f = \nabla_D \cdot (\nabla_D f)$$

11.3 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik

Mit diesem Operator lauten die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Raum:

11.3.1 Gaußsches Gesetz (elektrisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3}$$

Der Skalierungsfaktor $(r/r_0)^{D-3}$ besagt, dass die effektive Quellstärke im fraktalen Raum vom Abstand abhängt. Für $D = 3$ verschwindet dieser Faktor, und wir erhalten das bekannte Gesetz.

11.3.2 Gaußsches Gesetz (magnetisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{B} = 0$$

Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes bleibt erhalten – sie ist eine topologische Eigenschaft.

11.3.3 Faradaysches Induktionsgesetz

$$\nabla_D \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}$$

11.3.4 Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)

$$\nabla_D \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}$$

11.4 Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik

Elegant und allgemeiner ist die Formulierung mit einer fraktalen Metrik $g_{ij}^{(D)}$. Sie kodiert die fraktale Geometrie und führt zu kovarianten Ableitungen $\nabla_i^{(D)}$. Die Maxwell-Gleichungen lauten dann:

$$\begin{aligned} \nabla_i^{(D)} E^i &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \sqrt{g^{(D)}} \\ \nabla_i^{(D)} B^i &= 0 \\ \epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} E_k &= -\frac{\partial B^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \\ \epsilon^{ijk} \nabla_j^{(D)} B_k &= \mu_0 j^i \sqrt{g^{(D)}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E^i}{\partial t} \sqrt{g^{(D)}} \end{aligned}$$

wobei $\sqrt{g^{(D)}}$ die Determinante der fraktalen Metrik ist – ein Maß für die fraktale Volumenänderung.

11.5 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Für die Gravitation existiert eine analoge Struktur. Aus der DSTT folgen zwei Felder:

- Das gravito-elektrische Feld $\vec{E}_g$ (entspricht der radialen Schwerewirkung)
- Das gravito-magnetische Feld $\vec{B}_g$ (entspricht der tangentialen Trägheitsantwort)

Im fraktalen Raum lauten ihre Gleichungen:

$$\begin{aligned}
\nabla_D \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G \rho_{\text{eff}} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\
\nabla_D \cdot \vec{B}_g &= 0 \\
\nabla_D \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\
\nabla_D \times \vec{B}_g &= \mu_g \vec{j}_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_g \epsilon_g \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}
\end{aligned}$$

Dabei sind ρ_{eff} die effektive Massendichte, $\vec{j}_g$ der Massenstrom, und ϵ_g, μ_g die entsprechenden Konstanten mit $\epsilon_g \mu_g = 1/c^2$.

11.6 Die Wellengleichung im fraktalen Raum

Aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen folgt eine modifizierte Wellengleichung. Für das elektrische Feld im Vakuum:

$$\nabla_D^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

Die Eigenfunktionen sind keine ebenen Wellen $e^{i(kx-\omega t)}$, sondern fraktale Wellenfunktionen. Im Zentralfeld lautet die Lösung:

$$\mathbf{E}(r, \phi, t) = \mathbf{E}_0 \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)}$$

Das sind Spiralwellen – genau wie die Bahnformen der DSTT. Die Amplitude skaliert mit $r^{D-2} \approx r^{0,704}$ (für $D \approx 2,704$), und die Phase ist proportional zum Winkel ϕ .

Für die Gravitation ergibt sich analog:

$$\vec{E}_g(r, \phi, t) = \vec{E}_{g0} \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)}$$

11.7 Dispersionsrelation

Für ebene Wellen (Näherung für große Entfernungen) ergibt sich eine Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D-3 \approx -0,296$, also:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0} \right)^{-0,296} + \dots \right)$$

Das bedeutet: Licht und Gravitationswellen sind im fraktalen Raum minimal dispersiv. Verschiedene Frequenzen breiten sich mit leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit aus – ein Effekt, der bei extrem hohen Frequenzen oder über kosmische Distanzen messbar sein könnte.

11.8 Konsequenzen

11.8.1 Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig

In der fraktalen Elektrodynamik sind viele Integrale, die in der QED divergieren, automatisch endlich. Der Grund: Die fraktale Dimension $D < 3$ wirkt als natürlicher Cutoff. Die Renormierung wird überflüssig.

11.8.2 Skalierungsgesetze in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen sagt die Theorie spezifische Skalierungsgesetze voraus:

$$j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$$

11.8.3 Einheit von Elektrodynamik und Gravitation

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation haben dieselbe mathematische Struktur. Sie unterscheiden sich nur in den Konstanten und der Interpretation der Felder. Dies ist die langgesuchte Einheit der Physik – nicht durch komplizierte Symmetriegruppen, sondern durch den gemeinsamen fraktalen Raum.

11.9 Zusammenfassung

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen sind die natürliche Konsequenz aus der WDBT+ und ihrem fraktalen Raummodell mit $D \approx 2,704$. Sie:

- Erklären die Feinstrukturkonstante
- Beseitigen Unendlichkeiten (keine Renormierung nötig)
- Liefern die beobachteten Skalierungsgesetze in Plasmen
- Vereinheitlichen Elektrodynamik und Gravitation
- Stehen in direkter Verbindung zur DSTT (Spiralbahnen)
- Machen testbare Vorhersagen (Dispersion von Gravitationswellen)

Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum sind nur der Grenzfall $D \rightarrow 3$ einer tieferen, fraktalen Elektrodynamik.

Kapitel 12

Das Neutrino als Q-Teilchen

12.1 Einleitung

In der WDBT+ wird das Neutrino nicht als rätselhaftes Elementarteilchen mit verschwindend kleiner Masse betrachtet, sondern als die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials Q . Es ist das reine Q-Teilchen – ein Teilchen, das ausschließlich über das Quantenpotential wechselwirkt.

Diese Interpretation löst mehrere Rätsel der Standardphysik auf einen Schlag:

- Die Herkunft der Neutrinomasse
- Die drei Neutrino-Generationen
- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Die Natur der Dunklen Materie

12.2 Definition: Das Neutrino als Q-Teilchen

In der de Broglie-Bohm-Theorie lautet das Quantenpotential:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}, \quad R = \sqrt{\rho}$$

Es ist nichtlokal, wirkt instantan über das gesamte System und ist für die Führung der Teilchen verantwortlich. In der WDBT+ wird Q zum Ausdruck der globalen, nichtlokalen Informationsorganisation.

Das Neutrino ist der physikalische Träger dieses Quantenpotentials. Während geladene Teilchen (Elektronen, Quarks) über die Weber-Elektrodynamik (WED) wechselwirken und massive Teilchen (Protonen, Neutronen) über die Weber-Gravitation (WG), vermittelt das Neutrino die nichtlokale Organisation des Informationsfeldes.

12.3 Die Neutrinomasse aus der fundamentalen Länge

In der WDBT+ ist die fundamentale Längenskala l_0 die kleinste physikalisch mögliche Distanz. Sie folgt aus der fraktalen Raumdimension D und der Compton-Wellenlänge des Protons:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$$

Die Compton-Wellenlänge des Neutrinos ist:

$$\lambda_\nu = \frac{\hbar}{m_\nu c}$$

Der entscheidende Ansatz ist, dass diese Compton-Wellenlänge mit der fundamentalen Länge identisch ist:

$$\lambda_\nu = l_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\hbar}{m_\nu c} = l_0$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$\boxed{m_\nu = \frac{\hbar}{l_0 c}}$$

Einsetzen der Zahlenwerte ($\hbar = 1,0546 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 2,9979 \times 10^8$ m/s, $l_0 = 1,8 \times 10^{-15}$ m) liefert:

$$m_\nu \approx 0,11 \text{ eV}/c^2$$

Die Theorie sagt also voraus:

$$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

Dies stimmt mit den beobachteten Größenordnungen überein (Elektron-Neutrino-Masse $< 0,5 \text{ eV}/c^2$).

12.4 Das Neutrino als Vermittler der Nichtlokalität

Die physikalische Konsequenz dieser Identifikation ist tiefgreifend:

- Die Nichtlokalität der Quantenmechanik wird durch ein reales Teilchen – das Neutrino – vermittelt.
- Das Quantenpotential Q ist keine abstrakte Funktion mehr, sondern die Energie des Neutrino-Feldes.
- Die Bewegung eines geladenen Teilchens wird nicht nur durch lokale Kräfte (WED, WG) bestimmt, sondern auch durch den Fluss von Neutrinos, die das Quantenpotential tragen.

Damit ist die Nichtlokalität der Quantenmechanik kein mysteriöses Gespenst mehr, sondern physikalisch vermittelt – durch ein reales Teilchen.

12.5 Drei Neutrino-Generationen

Die drei bekannten Neutrino-Generationen (ν_e, ν_μ, ν_τ) entsprechen in dieser Theorie drei verschiedenen Moden des Q-Feldes – einer Projektion der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ auf drei diskrete Frequenzbänder. Die beobachteten Massenunterschiede zwischen den Generationen resultieren aus einer feinen Aufspaltung durch die fraktale Geometrie.

12.6 Neutrino-Oszillationen aus fraktaler Dispersion

Die Dispersionsrelation für das Q-Feld im fraktalen Raum (siehe Kapitel 11) hat direkte Konsequenzen für Neutrino-Oszillationen. Unterschiedliche Frequenzkomponenten eines Neutrino-Wellenpakets breiten sich mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten aus:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{D-3} + \dots \right)$$

Nach einer Propagationsstrecke L überlagern sich die Komponenten mit einer Phasendifferenz, die zu oszillierenden Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Neutrino-Flavours führt. Die Oszillationslänge ist:

$$L_{\text{osc}} \sim \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{1/(4-D)} \approx \frac{2\pi}{k_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^{0,775}$$

Mit $k_0 \sim 1/l_0 \approx 10^{15} \text{ m}^{-1}$ ergibt sich für typische Neutrino-Energien im MeV-Bereich ($\omega \sim 10^{21} \text{ s}^{-1}$) eine Oszillationslänge von Hunderten von Kilometern – konsistent mit den beobachteten Neutrino-Oszillationsexperimenten.

12.7 Konsequenzen für die Dunkle Materie

Da Neutrinos überall vorhanden sind, kaum wechselwirken und eine kleine Masse von $\approx 0,1 \text{ eV}/c^2$ besitzen, sind sie ein natürlicher Kandidat für die Dunkle Materie.

In der WDBT+ wird die Dunkle Materie nicht als separate Entität benötigt – die Gesamtheit der Neutrinos im Kosmos erzeugt die beobachteten gravitativen Effekte. Die Dichte der Neutrinos folgt aus der Kosmologie der WDBT+. Im stationären, nicht-expandierenden Universum ergibt sich eine homogene Neutrino-Hintergrunddichte, die die flachen Rotationskurven von Galaxien ohne zusätzliche Dunkle Materie erklärt.

12.8 Zusammenfassung

Das Neutrino ist in der WDBT+ das reine Q-Teilchen – die materielle Manifestation des de Broglie-Bohm-Quantenpotentials:

- Seine Masse folgt aus der fundamentalen Längenskala l_0 : $m_\nu = \hbar/(l_0 c) \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$.
- Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.
- Die drei Neutrino-Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum.
- Neutrino-Oszillationen folgen aus der fraktalen Dispersionsrelation.
- Die Gesamtheit der Neutrinos erklärt die Dunkle Materie.

Damit ist das Neutrino kein rätselhaftes Anhängsel des Standardmodells, sondern ein zentraler Baustein einer vollständigen, deterministischen Physik.

Kapitel 13

Theorie der fraktalen Entropie

13.1 Einleitung

Die Theorie der fraktalen Entropie ist eine fundamentale Erweiterung der WDBT+. Sie beschreibt einen geschlossenen, stationären Kreislauf der fraktalen Entropie zwischen Vakuum, Materie und dem Ω -Feld. Die Gravitation erzeugt durch die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) irreversible Prozesse und einen intrinsischen Zeitpfeil, während die Elektrodynamik ($\dot{\beta} = 0$) stabile Strukturen bewahrt.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ verhindert ein globales Entropiemaximum und damit den Wärmetod. Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die fraktale Entropie zirkuliert zwischen den Phasen.

13.2 Axiome der Theorie

13.2.1 Axiom 1: Fraktale Raumstruktur

Der fundamentale Raum ist eine fraktale Menge $\mathcal{M}$ mit Hausdorff-Dimension D :

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$.

13.2.2 Axiom 2: Fraktale Entropie

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $\int_{\mathcal{M}} \rho d^D r = 1$ ist die fraktale Entropie definiert als:

$$S_D[\rho] = -k_B \int_{\mathcal{M}} d^D r \rho(\vec{r}) \ln \rho(\vec{r}) \cdot \left(\frac{|\vec{r}|}{l_0} \right)^{D-3}$$

Für $D = 3$ ergibt sich die Boltzmann-Entropie. Für $D < 3$ ist S_D subextensiv: Sie wächst langsamer als das Volumen.

13.2.3 Axiom 3: Globaler Entropieerhaltungssatz

Die Gesamt-fraktale Entropie des Universums ist konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$$

13.2.4 Axiom 4: Lokale Entropieproduktion

In jeder einzelnen Phase gilt der zweite Hauptsatz in erweiterter Form:

$$\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$$

13.2.5 Axiom 5: Gravitation als Quelle der Irreversibilität

Die Weber-Gravitation mit $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Energieanteils:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.6 Axiom 6: Elektrodynamik als Stabilisator

Die Weber-Elektrodynamik mit $\beta_{\text{WED}} = 2$ führt zu keiner Änderung der Energieaufteilung:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0 \quad \text{für alle } t$$

13.2.7 Axiom 7: Beschränktheit aller physikalischen Größen

Für jede physikalische Größe X (Energie, Masse, Dichte, Temperatur, Volumen, Komplexität) gilt:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |X(t)| < \infty$$

Keine physikalische Größe divergiert oder wächst unbegrenzt.

13.3 Die drei Phasen

Das Universum besteht aus drei Phasen, zwischen denen die fraktale Entropie zirkuliert:

- **Vakuum (Nullpunkt):** S_D^{vac} – die fraktale Struktur des Raums selbst
- **Materie (kinetisch):** S_D^{kin} – Bewegung der Teilchen, unterteilt in:
 - $S_D^{\text{kin,grav}}$ – durch Gravitation gebundene Materie
 - $S_D^{\text{kin,em}}$ – durch Elektrodynamik gebundene Materie
- **Ω -Feld:** S_D^Ω – das Gravitationsfeld als Rotationsfeld

Der Erhaltungssatz lautet:

$$S_D^{\text{vac}}(t) + S_D^{\text{kin,grav}}(t) + S_D^{\text{kin,em}}(t) + S_D^\Omega(t) = S_D^{\text{ges}} = \text{const}$$

13.4 Die Entropieflüsse

Aus den Bewegungsgleichungen der WDBT+ folgen die Entropieflussraten:

$$\begin{aligned}
\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} &= -\sigma_{\text{cre}} + \sigma_{\text{back}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} &= +\sigma_{\text{cre}} - \sigma_{\text{drift}} \\
\frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} &= 0 \quad (\text{elektromagnetische Prozesse sind reversibel}) \\
\frac{dS_D^{\Omega}}{dt} &= +\sigma_{\text{drift}} - \sigma_{\text{back}}
\end{aligned}$$

mit:

- $\sigma_{\text{cre}} > 0$: Entropiefluss von Vakuum zu gravitativer Materie (Materieentstehung durch Quantenpotential)
- $\sigma_{\text{drift}} > 0$: Entropiefluss von gravitativer Materie zum Ω -Feld (DSTT-Drift)
- $\sigma_{\text{back}} > 0$: Entropiefluss vom Ω -Feld zum Vakuum (Rückkopplung)

13.5 Der geschlossene Kreislauf

Der geschlossene Entropiekreislauf lässt sich wie folgt darstellen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie (grav.)} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum}$$

Die elektromagnetische Materie ist vom Kreislauf entkoppelt (reversibel).

13.5.1 Stationärer Zustand

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma$$

Damit sind die Entropien jeder Phase konstant:

$$\frac{dS_D^{\text{vac}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,grav}}}{dt} = \frac{dS_D^{\text{kin,em}}}{dt} = \frac{dS_D^{\Omega}}{dt} = 0$$

Es zirkuliert nur der Fluss, nicht die Menge.

13.6 Warum kein Wärmetod eintritt

13.6.1 Bedingungen für einen Wärmetod

Ein Wärmetod tritt ein, wenn:

1. Die Entropie ein globales Maximum erreicht
2. Alle Energiegradienten verschwinden
3. Keine irreversiblen Prozesse mehr stattfinden
4. Das System in einen Gleichgewichtszustand übergeht

13.6.2 Die Verhinderung des Wärmetods

Die fraktale Entropie S_D hat bei fester Gesamtenergie kein globales Maximum. Die Zustandsdichte im fraktalen Raum skaliert mit $E^{D/3}$. Für $D < 3$ ist die Funktion

$$S_D(E) = \frac{D}{3} k_B \ln E + \text{const}$$

monoton wachsend und konkav, besitzt aber kein endliches Maximum.

Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) erzeugt permanent radiale Energiegradienten:

$$\nabla E_{\text{kin,grav}} \neq 0 \quad \text{für alle } t$$

Die Raten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ sind immer positiv. Das System hat keinen attraktiven Fixpunkt im Phasenraum, sondern einen attraktiven Grenzzyklus.

13.6.3 Hauptsatz der fraktalen Thermodynamik

Unter den Axiomen 1–7 gilt:

1. **Lokale Entropieproduktion:** $\frac{dS_D^{(i)}}{dt} \geq 0$ für jede Phase
2. **Globale Entropieerhaltung:** $\frac{dS_D^{\text{ges}}}{dt} = 0$
3. **Permanente Dynamik:** $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}} > 0$ für alle t
4. **Kein Entropiemaximum:** Es existiert kein endlicher Zustand maximaler Gesamtentropie
5. **Kein Wärmetod:** Das System erreicht nie einen Gleichgewichtszustand mit verschwindenden Gradienten und Prozessen

13.7 Kosmologische Konsequenzen

Die Theorie der fraktalen Entropie führt zu einem stationären Universum:

- Der Raum expandiert nicht, aber Strukturen und Bahnen dehnen sich durch die DSTT-Drift aus.
- Die mittlere Dichte bleibt durch kontinuierliche Materieentstehung konstant.
- Die Gravitation produziert permanent Entropie – dies ist der intrinsische Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod tritt nicht ein – das Universum bleibt ewig dynamisch.

13.8 Zusammenfassung

Die Theorie der fraktalen Entropie liefert ein konsistentes, logisch geschlossenes Bild:

- Der Raum ist fraktal mit $D \approx 2,704$ und besitzt eine fundamentale Länge l_0 .
- Die fraktale Entropie S_D ist subextensiv und zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuum, Materie und Ω -Feld.

- Die Gravitation ($\beta_{\text{WG}} = 0,5$) erzeugt durch $\dot{\beta} > 0$ irreversible Prozesse und den intrinsischen Zeitpfeil.
- Die Elektrodynamik ($\beta_{\text{WED}} = 2$) mit $\dot{\beta} = 0$ ermöglicht reversible Prozesse und bewahrt stabile Strukturen.
- Der Wärmetod wird durch die fraktale Geometrie (kein globales Entropiemaximum) und die permanenten irreversiblen Flüsse verhindert.
- Das Universum ist stationär: Energie, Masse und Dichte bleiben konstant; die Dynamik zirkuliert ewig.

Kapitel 14

Stationäre Kosmologie

14.1 Einleitung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum. Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion des Raumes, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld. Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) bewirkt eine langsame Ausdehnung von Strukturen, die durch kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential kompensiert wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge dieser Kosmologie: Rotverschiebung, Galaxienrotation, Materieentstehung, Galaxienwachstum und die Interpretation des Sonnenwinds.

14.2 Rotverschiebung ohne Expansion

In der WDBT+ ist die Rotverschiebung keine Doppler-Verschiebung durch Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das Ω -Feld:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{1}{c^2} \int \Phi_{\text{eff}}(r) dr + (\text{fraktale Korrekturen})$$

Da β für Photonen von der Energie abhängt, zeigen verschiedene Frequenzen leicht unterschiedliche Rotverschiebungen. Dieser Effekt ist klein, aber mit Pulsar-Laufzeiten oder hochpräzisen Spektren messbar.

14.3 Galaxienrotation ohne Dunkle Materie

Flache Rotationskurven werden in der WDBT+ durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt. Die radiale Dichteverteilung einer Galaxie ergibt sich aus der kontinuierlichen Materieentstehung und der DSTT-Drift.

14.3.1 Dichteverteilung

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum ist:

$$\frac{dM_{\text{cre}}}{d \ln r} \propto r^{3-D} = r^{0,296}$$

Die DSTT-Driftgeschwindigkeit ist:

$$v_{\text{drift}}(r) = B \sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r^3}}$$

Aus der Kontinuitätsgleichung folgt die radiale Dichteverteilung:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) \propto r^{-(3-D)} = r^{-0,296}$$

14.3.2 Rotationskurve

Die kumulierte Masse innerhalb des Radius r ist:

$$M(r) \propto \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' \propto r^{2+(3-D)} = r^{2,296}$$

Daraus folgt die Rotationskurve:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto r^{0,648}$$

Für $D \approx 2,704$ ergibt sich $v(r) \propto r^{0,648}$ – dies ist eine fast flache Rotationskurve, konsistent mit Beobachtungen.

14.4 Kontinuierliche Materieentstehung

Das Quantenpotential erzeugt neue Materie im Vakuum:

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto Q(r) \propto \frac{1}{r^2}$$

Die Materieentstehung ist also im Zentrum am stärksten und fällt mit $1/r^2$ ab.

14.4.1 Drift und Einfang

Die DSTT-Drift treibt die neu entstehende Materie nach außen. Die Einfangwahrscheinlichkeit durch den Zentralkörper ist:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}} \right)^{3-D} \approx 0,001$$

Mit $r_c \sim 200 \text{ m}$ (Einfangradius) und $r_{\text{max}} \sim 5 \times 10^{11} \text{ m}$ (maximale Entfernung) ergibt sich $\alpha_{\text{in}} \approx 0,001$.

14.5 Galaxienwachstum

Aus der Drift-Gleichung $dr/dt = v_{\text{drift}}(r)$ folgt:

$$r(t) \propto t^{2/5}$$

Die Materieentstehungsrate skaliert mit $r^{3-D} \propto t^{0,118}$. Daraus folgt für die kumulierte Masse der Galaxie:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto t^{1,118}$$

14.5.1 Massenverhältnis Galaxie zu Kern

Das Massenverhältnis von Galaxie zu zentralem BEC-Kern ist:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1 - \alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx 1000$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_{\odot}$ – typisch für große Galaxien.

14.6 Die Sonne als Mikrokosmos

Das Modell ist skalierbar. Für die Sonne ($M = M_{\odot}$) ergeben sich:

$$r_{\max} \sim 1,5 \times 10^{13} \text{ m}, \quad r_c \sim 1,4 \times 10^{-11} \text{ m}, \quad \alpha_{\text{in}} \approx 1,2 \times 10^{-7}$$

14.6.1 Interpretation des Sonnenwinds

Im Standardmodell wird der Sonnenwind als Materieausstoß aus der Sonnenkorona gesehen. In der WDBT+ hingegen:

- Materie entsteht in der Nähe der Sonne (bei $r \sim 10^{-11} \text{ m}$)
- Die DSTT-Drift treibt sie nach außen
- Nur ein winziger Bruchteil ($\sim 10^{-7}$) wird von der Sonne eingefangen
- Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse

14.7 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten

Ein BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}}$ hat $R = l_0 \approx 10^{-15} \text{ m}$ – viel zu klein, um direkt abgebildet zu werden. Was das Event Horizon Telescope (EHT) zeigt, ist der Einflussbereich: die Region, in der Licht stark abgelenkt wird.

Der Photonenorbit liegt bei:

$$r_{\text{ph}} \approx \frac{3GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\text{BEC}}$:

$$r_{\text{ph}} \approx 1,8 \times 10^{10} \text{ m} \approx 0,12 \text{ AU}$$

Der Schatten ist also makroskopisch. Testbare Unterschiede zur ART:

- Feinstruktur des Schattens
- Polarisationsmuster
- Zeitliche Variabilität (Flares)

14.8 Vergleich mit dem Standardmodell

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen der Standardkosmologie und der WDBT+ zusammen:

Phänomen	Standardmodell	WDBT+
Zentrale Objekte	Senken (verschlingen Materie)	Quellen (erzeugen Materie)
Materiefluss	Einwärts (Akkretion)	Auswärts (Drift)
Galaxien	Kollaps + Dunkle Materie	Wachstum von innen nach außen
Universum	Expandierend, Urknall	Stationär, ewig
Schwarze Löcher	Singularität + Horizont	BEC-Objekt, kein Horizont
Maximale Masse (Kern)	Keine natürliche Grenze	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
Dunkle Materie	Benötigt	Nicht benötigt
Dunkle Energie	Benötigt	Nicht benötigt

14.9 Zusammenfassung

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum:

- Die Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion, sondern kumulative Gravitation.
- Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das Ω -Feld und die anisotrope Trägheit der DSTT erklärt.
- Das Quantenpotential erzeugt kontinuierlich neue Materie, die durch DSTT-Drift nach außen getrieben wird.
- Galaxien wachsen von innen nach außen; das Massenverhältnis Galaxie/Kern folgt aus der fraktalen Raumdimension D .
- Der Sonnenwind wird durch Materieentstehung in Sonnennähe erklärt – die Sonne verliert keine signifikante Masse.
- Der EHT-Schatten ist makroskopisch, aber die Feinstruktur unterscheidet sich von ART-Vorhersagen.

Die WDBT+ kommt ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie aus – und liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild des Kosmos.

Kapitel 15

Testbare Vorhersagen

15.1 Einleitung

Die WDBT+ macht eine Reihe spezifischer, von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie abweichender Vorhersagen. Diese Vorhersagen sind prinzipiell experimentell überprüfbar – entweder mit bestehenden oder mit zukünftigen Technologien.

Die folgende Liste fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen, geordnet nach physikalischen Bereichen.

15.2 Kosmologie und Galaxien

15.2.1 Fraktale Skalengesetze

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ führt zu gebrochenen Exponenten in kosmologischen Skalengesetzen:

- **Galaxien-Dichteprofil:** $\rho(r) \propto r^{-(3-D)} \approx r^{-0,296}$ (flacher als das NFW-Profil)
- **Rotationskurven:** $v(r) \propto r^{(D-2)/2} \approx r^{0,352}$ (bei sehr großen Radien steigt die Kurve langsam an, fällt nicht ab)
- **CMB-Korrelationen:** $C(\theta) \propto \theta^{-(3-D)} \approx \theta^{-0,296}$ mit einer festen, aus der Dodekaeder-Symmetrie folgenden Achse („Achse des Bösen“)
- **Materieentstehung:** $\frac{dM_{\text{cre}}}{d \ln r} \propto r^{3-D} \approx r^{0,296}$

15.2.2 Maximale Masse kompakter Objekte

Die Theorie sagt eine natürliche Obergrenze für kompakte Objekte voraus:

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$$

Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen über dieser Grenze sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

15.2.3 Doppelkern-Systeme

Bei Galaxienverschmelzungen sagt die Theorie voraus, dass Doppelkern-Systeme häufiger sind als in der ART vorhergesagt, da BEC-Objekte bei Überschreiten der maximalen Masse zerreißen können, anstatt zu verschmelzen.

15.2.4 Hubble-Gesetz

Die Rotverschiebung ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung. Daher ergeben sich Abweichungen vom linearen Hubble-Gesetz auf großen Skalen.

15.3 Gravitationsphysik

15.3.1 Frequenzabhängige Lichtablenkung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Lichtablenkung voraus. Die WDBT+ sagt dagegen eine frequenzabhängige Ablenkung voraus:

$$\Delta\phi(\nu) = \Delta\phi_0 \left(1 + \alpha \frac{\nu_0}{\nu}\right) \propto \lambda^2$$

Dieser Effekt ist mit hochpräzisen Interferometern (z. B. LISA) oder spektral aufgelösten Messungen am Sonnenrand testbar.

15.3.2 Gravitationswellen-Dispersion

Die fraktale Raumstruktur führt zu einer frequenzabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \alpha \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{D-3} + \dots\right)$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen. Dies ist mit zukünftigen Detektoren wie LISA oder dem Einstein-Teleskop testbar.

15.3.3 Shapiro-Laufzeitverzögerung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Laufzeitverzögerung voraus. Die WDBT+ sagt eine zusätzliche Frequenzabhängigkeit voraus:

$$\Delta t_{\text{WG}} \propto \lambda^{-2}$$

Dies ist mit Pulsar-Timing-Experimenten testbar.

15.3.4 Spiralbahnen statt Ellipsen

Die DSTT sagt voraus, dass alle Bahnen logarithmische Spiralen sind, keine geschlossenen Ellipsen. Die radiale Drift ist extrem langsam:

$$\frac{\dot{r}}{r} \approx 10^{-11} \text{ pro Jahr}$$

Für den Mond ergibt sich eine Exzentrizitätsabnahme von $\dot{e} \approx -2,7 \times 10^{-11}$ pro Jahr. Dieser Effekt ist mit heutigen Methoden (Lunar Laser Ranging) nicht nachweisbar, aber prinzipiell testbar.

15.4 Quanten- und Teilchenphysik

15.4.1 Neutrinomasse

Die Theorie sagt eine Neutrinomasse von

$$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

voraus, direkt aus der fundamentalen Länge l_0 . Dies ist mit Experimenten wie KATRIN oder dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall testbar.

15.4.2 Neutrino-Oszillationen

Die fraktale Dispersionsrelation führt zu einer charakteristischen Skalierung der Oszillationslänge:

$$L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$$

Dies weicht von den Vorhersagen des Standardmodells ab und ist mit Neutrino-Oszillationsexperimenten (JUNO, DUNE, Hyper-Kamiokande) testbar.

15.4.3 Drei Neutrino-Generationen

Die drei Generationen sind Moden des Q-Feldes im fraktalen Raum. Die Massenunterschiede zwischen den Generationen folgen aus einer feinen Aufspaltung durch die fraktale Geometrie.

15.4.4 Modifizierter Lamb-Shift

Die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Quantenpotential des Vakuums führt zu einem Zusatzterm im Lamb-Shift:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi \epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar.

15.5 Plasmaphysik

15.5.1 Fraktale Skalierung im Sonnenwind

Fluktuationen des Sonnenwinds sollten einen Exponenten $3 - D \approx 0,296$ zeigen – testbar mit bestehenden Satellitendaten.

15.5.2 Sonnenmasse

Die Theorie sagt voraus, dass die Sonne keinen messbaren Masseverlust durch den Sonnenwind erfährt, da der Sonnenwind aus neu entstehender Materie besteht, nicht aus der Sonne selbst.

15.5.3 Stromdichten in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen sollten Stromdichten mit $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$ skalieren.

15.6 Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen:

Vorhersage	Wert / Skalierung	Testmethode
Galaxien-Dichteprofil	$\rho(r) \propto r^{-0,296}$	EUCLID, Rubin (LSST)
Rotationskurven	$v(r) \propto r^{0,352}$	Extrem breite Galaxien
CMB-Korrelationen	$C(\theta) \propto \theta^{-0,296}$	Planck, LiteBIRD
Neutrinomasse	$m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$	KATRIN, Doppelbeta-Zerfall
Sonnenmasse	Kein Masseverlust durch Wind	Präzise Sonnenbeobachtung
Gravitationswellen-Dispersion	$v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,296})$	LISA, Einstein-Teleskop
Skalierung im Plasma	$j(r) \propto r^{-0,296}$	Laborplasmen, Sonnenwind
Lichtablenkung	$\Delta\phi \propto \lambda^2$	Multiband-Beobachtungen
Shapiro-Laufzeit	Frequenzabhängig	Pulsar-Timing
Maximale Kernmasse	$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$	Beobachtung von Galaxienzentren
EHT-Schatten	$r_{\text{ph}} = 3GM/c^2$, aber andere Feinstruktur	EHT, nächste Generation

15.7 Fazit

Die WDBT+ macht spezifische, testbare Vorhersagen, die sie von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell der Kosmologie unterscheiden. Sollten diese Vorhersagen bestätigt werden, wäre dies ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie. Sollten sie widerlegt werden, wäre die Theorie falsifiziert – ein Zeichen ihrer wissenschaftlichen Qualität.

Kapitel 16

Zusammenfassung

16.1 Die zwei Ebenen der Theorie

Die vorliegende Arbeit stellt eine zweistufige Theorie der Physik vor:

- **Teil I: Die Informations-Weber-Theorie (IWT)** – eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie, in der Information die einzige primäre Größe ist. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.
- **Teil II: Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+)** – die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie.

16.2 Die drei Säulen der WDBT+

Die WDBT+ ruht auf drei fundamentalen Konzepten:

1. **Die Weber-Kraft** – eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige direkte Teilchenwechselwirkung, die Elektrodynamik ($\beta = 2$) und Gravitation ($\beta = 0,5$ für Massen, $\beta = 1$ für Photonen) auf einheitliche Weise beschreibt – ohne Felder und ohne Raumzeitkrümmung.
2. **Das de Broglie-Bohm-Quantenpotential** – ein nicht-lokales Führungsfeld, das Teilchen deterministisch lenkt, Singularitäten verhindert und die Materieentstehung aus dem Vakuum ermöglicht.
3. **Die fraktale Raumdimension D** – der fundamentale Raum ist kein glattes Kontinuum, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

D ist eine fundamentale Konstante, die die Skalierungsstruktur des Raumes beschreibt.

16.3 Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Ihre Kernaussagen sind:

- Trennung von Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit)

- Anisotrope Trägheit: Aufteilung in radiale und tangentielle Komponenten
- Zustandsparameter $\beta(t)$ mit $\dot{\beta}(t) > 0$
- Bahnform: logarithmische Spiralen, keine geschlossenen Ellipsen
- Langfristige Auswärtsdrift aller Objekte
- Gravitationsentropie und intrinsischer Zeitpfeil

Die Identitätsbeziehung zwischen DSTT und den Weber-Kräften zeigt: $\beta_{\text{WG}} = 0,5$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} > 0$; $\beta_{\text{WED}} = 2$ erzwingt $\dot{\beta}_{\text{DSTT}} = 0$. Dies erklärt den fundamentalen Unterschied zwischen Gravitation (irreversibel) und Elektrodynamik (reversibel).

16.4 Die Maxwell-Gravitation und die Ω -Theorie

Aus der Wirbelstruktur der Weber-Gravitation emergieren die Maxwell-Gleichungen der Gravitation. Die Ω -Theorie formuliert Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$, nicht als Raumzeitkrümmung:

- Die Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke des $\vec{\Omega}$ -Feldes.
- Omega-Wellen sind instantane, nicht-lokale, axiale Schwingungen, die auf großen Skalen effektiv als retardierte Wellen mit c erscheinen.
- Die Theorie sagt frequenzabhängige Gravitationswellen-Dispersion voraus.

16.5 BEC-Objekte

Die kompaktesten Objekte im Universum sind Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren:

- Minimale Größe: fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$
- Maximale Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Beobachtete supermassereiche Objekte sind Systeme aus BEC-Kern und Umgebung
- Keine Singularitäten, kein Ereignishorizont

16.6 Fraktale Maxwell-Gleichungen

Im fraktalen Raum lauten die Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation:

- Gleiche mathematische Struktur – Einheit von Elektrodynamik und Gravitation
- Natürlicher Cutoff $D < 3$ – keine Renormierung nötig
- Erklärung der Feinstrukturkonstante (als gegebene Konstante, nicht aus D abgeleitet)
- Skalierungsgesetze in Plasmen: $j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,296}$

16.7 Neutrino als Q-Teilchen

Das Neutrino ist die materielle Manifestation des Quantenpotentials:

- Masse: $m_\nu = \hbar/(l_0 c) \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$
- Vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik
- Drei Generationen als Moden des Q-Feldes
- Oszillationen aus fraktaler Dispersion
- Erklärt die Dunkle Materie (Neutrino-Gesamtheit)

16.8 Fraktale Entropie

Die Theorie der fraktalen Entropie beschreibt einen geschlossenen Kreislauf:

- Drei Phasen: Vakuum, Materie, Ω -Feld
- Lokale Entropieproduktion, globale Entropieerhaltung
- Kein globales Entropiemaximum ($D < 3$)
- Kein Wärmetod – das Universum bleibt ewig dynamisch

16.9 Stationäre Kosmologie

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum:

- Kein Urknall, keine Dunkle Materie, keine Dunkle Energie
- Rotverschiebung als kumulative Gravitation, nicht als Expansion
- Galaxien wachsen von innen nach außen durch Materieentstehung und Drift
- Massenverhältnis Galaxie/Kern: $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$
- Sonnenwind aus neu entstehender Materie – die Sonne verliert keine Masse

16.10 Testbare Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische Vorhersagen, die von der ART und dem Standardmodell abweichen:

- Fraktale Skalengesetze ($\rho(r) \propto r^{-0,296}$, $v(r) \propto r^{0,352}$)
- Maximale Masse kompakter Objekte ($M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$)
- Neutrinomasse ($m_\nu \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$)
- Frequenzabhängige Lichtablenkung ($\Delta\phi \propto \lambda^2$)
- Gravitationswellen-Dispersion ($v_{\text{phase}}(\omega) = c(1 + \alpha\omega^{-0,296})$)
- Frequenzabhängige Shapiro-Laufzeit

16.11 Fazit

Die WDBT+ bietet ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der Physik:

- Sie vereinheitlicht Quantenmechanik, Elektrodynamik und Gravitation in einem deterministischen Rahmen.
- Sie erklärt die beobachteten Phänomene ohne Urknall, Dunkle Materie und Dunkle Energie.
- Sie macht testbare Vorhersagen, die sie von der ART unterscheiden.
- Sie basiert auf einer einfachen, axiomatischen Grundlage – nicht auf ungeprüften Postulaten.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ ist keine willkürliche Zahl. Sie folgt aus der Dodekaeder-Geometrie, dem goldenen Schnitt und einer Fibonacci-Rekursion. Sie ist die fundamentale Konstante, aus der die Struktur des Raumes und die Dynamik der Wechselwirkungen emergieren.

Die WDBT+ ist nicht das Ende der Physik, sondern ein Anfang – ein neues Fundament, auf dem eine deterministische, singularitätenfreie und einheitliche Theorie der Natur errichtet werden kann.

Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Einleitung

Dieser Anhang stellt die mathematischen Werkzeuge bereit, auf denen die diskrete Formulierung der IWT basiert. Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Approximationen im Haupttext werden hier ausschließlich die fundamentalen diskreten Strukturen entwickelt.

Der Fokus liegt auf:

1. Diskrete Variationsrechnung für Informationsnetzwerke
2. Differenzengleichungen und rekursive Update-Regeln
3. Diskrete Noether-Theoreme und Erhaltungssätze
4. Definition und Berechnung der diskreten Informationsmetrik
5. Fraktale Analysis für diskrete Netzwerke

A.2 Diskrete Variationsrechnung

A.2.1 Diskretes Funktional

Ein diskretes Informationssystem wird beschrieben durch Knoten $k = 1, \dots, N$ mit Informationswerten $I_k^{(n)}$ zum Zeitschritt n . Das fundamentale diskrete Funktional lautet:

$$S_d \left[I_k^{(n)} \right] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)} \right) \cdot T \cdot V_k$$

mit:

- $\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ (zeitliche Differenz)
- $\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)})$ (räumliche Differenz)
- T – fundamentaler Zeitschritt
- V_k – diskretes Volumenelement am Knoten k

A.2.2 Variation diskreter Funktionale

Eine Variation des diskreten Feldes sei:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)}$$

mit beliebigen Testwerten $\eta_k^{(n)}$, die am Rand verschwinden.

Die Variation des Funktional ist:

$$\delta S_d = \frac{d}{d\epsilon} S_d \left[I_k^{(n)} + \epsilon \eta_k^{(n)} \right]_{\epsilon=0}$$

A.2.3 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen

Durch Ableitung und Umordnung erhält man:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

mit den diskreten Operatoren:

$$\Delta_t^+ f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T} \quad (\text{Vorwärtsdifferenz})$$

$$\Delta_s f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k) \quad (\text{Diskreter Gradient})$$

A.2.4 Beispiel: Diskrete Wellengleichung

Für $\mathcal{F}_d = \alpha (\Delta_t I_k^{(n)})^2 + \beta (\Delta_s I_k^{(n)})^2$:

$$\alpha \frac{I_k^{(n+1)} - 2I_k^{(n)} + I_k^{(n-1)}}{T^2} + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) = 0$$

A.3 Diskrete Noether-Theoreme

A.3.1 Symmetrien in diskreten Systemen

Eine diskrete Transformation:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \cdot \xi_k^{(n)}$$

ist eine Symmetrie, wenn:

$$\mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)} + \epsilon \xi_k^{(n)}, \Delta_t (I + \epsilon \xi), \Delta_s (I + \epsilon \xi) \right) = \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I, \Delta_s I \right) + \Delta_t^+ K^{(n)} + \Delta_s J_k^{(n)}$$

A.3.2 Erhaltungsgrößen

Aus jeder solchen Symmetrie folgt eine diskrete Erhaltungsgröße:

$$Q^{(n+1)} - Q^{(n)} = - \sum_k \Delta_s J_k^{(n)}$$

mit der erhaltenen diskreten Ladung:

$$Q^{(n)} = \sum_k \left[\xi_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} - K^{(n)} \right]$$

A.3.3 Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze

Symmetrie	Transformation	Erhaltene Größe
Zeittranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n+1)}$	Diskrete Energie $E^{(n)}$
Raumtranslation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{k+\delta}^{(n)}$	Diskreter Impuls $\vec{P}^{(n)}$
Rotation	$I_k^{(n)} \rightarrow I_{R(k)}^{(n)}$	Diskreter Drehimpuls $\vec{L}^{(n)}$
Informations-Shift	$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + c$	Gesamtinformation $\sum_k I_k^{(n)}$

A.4 Diskrete Informationsmetrik

A.4.1 Definition aus dem Funktional

Die diskrete Informationsmetrik zwischen Knoten k und l ist definiert als:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial(\Delta_s I_k^{(n)}) \partial(\Delta_s I_l^{(n)})}$$

A.4.2 Alternative Definition über Kopplungsmatrix

Für viele Anwendungen ist die direkte Definition über die Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ nützlicher:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

A.4.3 Eigenschaften

- Symmetrie: $g_{kl}^{(n)} = g_{lk}^{(n)}$
- Positive Definitheit: $\sum_{k,l} v_k g_{kl}^{(n)} v_l \geq 0$ für alle v_k
- Normierung: $g_{kk}^{(n)} = 1$
- Lokalität: $g_{kl}^{(n)} \rightarrow 0$ für $|k - l| \rightarrow \infty$

A.5 Fraktale Analysis diskreter Netzwerke

A.5.1 Fraktale Dimension eines diskreten Netzwerks

Gegeben sei ein diskretes Netzwerk mit Adjazenzmatrix A_{kl} . Die fraktale Dimension D wird bestimmt durch das Skalierungsverhalten der Koordinationszahl:

$$N(R) \propto R^D \quad \text{für } R \rightarrow \infty$$

wobei $N(R)$ die Anzahl der Knoten innerhalb einer Distanz R von einem Referenzknoten ist.

A.5.2 Praktische Berechnung

1. Wähle einen Referenzknoten k_0
2. Berechne die kürzesten Pfade zu allen anderen Knoten: $d(k_0, k)$
3. Zähle: $N(R) = \#\{k : d(k_0, k) < R\}$
4. Bestimme D aus der Steigung: $D = \frac{d \ln N(R)}{d \ln R}$

A.5.3 Beispiel: Fraktales Netz

Für das in der IWT verwendete fraktale Netzwerk gilt:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

Dieses Netzwerk zeigt selbstähnliche Struktur auf allen Skalen.

A.6 Diskrete Differenzengleichungen höherer Ordnung

A.6.1 Rekursive Update-Regeln

Viele Gleichungen der IWT haben die Form:

$$I_k^{(n+1)} = F\left(I_k^{(n)}, I_k^{(n-1)}, \{I_l^{(n)}\}\right)$$

A.6.2 Stabilitätsanalyse

Für eine lineare Rekursion:

$$I_k^{(n+1)} = aI_k^{(n)} + bI_k^{(n-1)}$$

erhält man die charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 - a\lambda - b = 0$$

Stabilitätsbedingung: $|\lambda| \leq 1$ für alle Lösungen.

A.6.3 Numerische Stabilität der diskreten Weber-Kraft

Die diskrete Weber-Kraft ist stabil für:

$$T < T_{\max} = \frac{r_{\min}}{c}$$

A.7 Diskrete Fourier-Analyse

A.7.1 Diskrete Fourier-Transformation

Für ein diskretes Feld I_k auf N regelmäßig angeordneten Knoten:

$$\tilde{I}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} I_k e^{-2\pi i q k / N}$$

A.7.2 Dispersionsrelationen

Aus diskreten Differenzengleichungen erhält man charakteristische Dispersionsrelationen:

$$\omega(q) = \frac{2}{T} \arcsin\left(\frac{cT}{2a} \sin(\pi qa)\right)$$

A.8 Matrixdarstellungen diskreter Operatoren

A.8.1 Laplace-Matrix

Der diskrete Laplace-Operator wird durch die Laplace-Matrix L dargestellt:

$$(Lf)_k = \sum_l L_{kl} f_l$$

mit

$$L_{kl} = \begin{cases} \sum_{m \neq k} w_{km} & \text{für } k = l \\ -w_{kl} & \text{für } k \neq l \end{cases}$$

A.8.2 Eigenwertanalyse

Die Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren v_i von L charakterisieren die kollektiven Moden des Netzwerks.

A.9 Zusammenfassung der mathematischen Struktur

Die diskrete IWT basiert auf folgenden mathematischen Grundlagen:

Konzept	Mathematische Beschreibung
Zustandsraum	Diskrete Felder $I_k^{(n)}$ auf Netzwerkknoten
Dynamik	Diskretes Funktional $S_d[I_k^{(n)}]$ mit Variationsprinzip
Bewegungsgleichungen	Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen
Symmetrien	Diskrete Noether-Theoreme mit Erhaltungssätzen
Geometrie	Diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)}$ aus Kopplungsstruktur
Skalierung	Fraktale Dimension D charakterisiert Netzwerk
Stabilität	Eigenwertanalyse rekursiver Update-Regeln

A.10 Hinweise zur praktischen Anwendung

1. Alle kontinuierlichen Gleichungen im Haupttext sind Grenzfälle dieser diskreten Strukturen.
2. Numerische Simulationen implementieren direkt diese diskreten Gleichungen.
3. Die mathematische Konsistenz wird durch die diskrete Formulierung gewährleistet.
4. Fraktale Eigenschaften ergeben sich natürlich aus der Netzwerkstruktur.

Dieser Anhang bildet damit die mathematische Grundlage für das gesamte Werk und ermöglicht die rigorose Herleitung aller im Haupttext verwendeten Gleichungen.

Anhang B

Numerische Simulationen

B.1 Einleitung

Die diskrete Formulierung der IWT und der WDBT+ ist algorithmisch direkt implementierbar. Die numerischen Methoden dienen drei Hauptzwecken:

1. **Validierung:** Überprüfung der internen Konsistenz der Theorie
2. **Emergenznachweis:** Demonstration, wie kontinuierliche Physik aus diskreter Dynamik entsteht
3. **Vorhersagegenerierung:** Berechnung testbarer experimenteller Konsequenzen

Alle Simulationen basieren auf den in Teil I entwickelten fundamental diskreten Gleichungen.

B.2 Das diskrete Simulationsnetzwerk

B.2.1 Grundstruktur

Die Simulation arbeitet mit einem diskreten Netzwerk $\mathcal{N}$, bestehend aus:

$$\mathcal{N} = \{I_k^{(n)}, K_{kl}^{(n)}, g_{kl}^{(n)} \mid k, l = 1, \dots, N\}$$

- N : Anzahl der Informationsknoten (typisch 10^3 bis 10^6)
- $I_k^{(n)}$: Informationswert am Knoten k zum Zeitschritt n
- $K_{kl}^{(n)}$: Kopplungsstärke zwischen Knoten k und l
- $g_{kl}^{(n)}$: Emergente Metrik zwischen k und l

B.2.2 Initialisierungsprotokolle

Je nach Simulationsziel werden unterschiedliche Initialisierungen verwendet:

Simulationstyp	Initialisierung $I_k^{(0)}$	Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(0)}$
Leeres Vakuum	Gleichverteilung $I_k^{(0)} = I_0$	Fraktales Muster mit $D \approx 2,704$
Teilchensystem	Lokalisierte Peaks an Teilchenpositionen	Nachbarschaftskopplung
Kosmologie	Große Skalenfluktuationen	Skaleninvariantes fraktales Netz
Quantensystem	Kohärente Phasenverteilung	Globale Langreichweitkopplung

B.3 Implementierung der diskreten Dynamik

B.3.1 Hauptalgorithmus

Der Kern der Simulation ist die rekursive Update-Schleife:

Algorithmus 1: Hauptsimulationsschleife

Eingabe: Knotenzahl N , Zeitschritte N_{steps} , Zeitschrittweite T

Initialisierung: Setze $I_k^{\wedge}(0)$, $K_{kl}^{\wedge}(0)$ fuer alle $k, l = 1, \dots, N$

Fuer $n = 0, 1, 2, \dots, N_{\text{steps}} - 1$:

- (a) Informationsupdate:
 $I_k^{\wedge}(n+1) = I_k^{\wedge}(n) + T * \text{Phi}_k(I_k^{\wedge}(n), \{I_l^{\wedge}(n)\}, I_k^{\wedge}(n-1))$
- (b) Kopplungsupdate:
 $K_{kl}^{\wedge}(n+1) = K_{kl}^{\wedge}(n) + \text{Delta } K_{kl}(I^{\wedge}(n+1), I^{\wedge}(n))$
- (c) Metrikberechnung:
 $g_{kl}^{\wedge}(n+1) = K_{kl}^{\wedge}(n+1) / \text{sqrt}(K_{kk}^{\wedge}(n+1) * K_{ll}^{\wedge}(n+1))$
- (d) Analyse: Berechne observablen Groessen (Energie, Impuls, Korrelationen)

Ausgabe: Zeitreihen aller relevanten Groessen

B.3.2 Diskrete Weber-Dynamik

Die lokale Dynamik wird durch die diskrete Weber-Kraft implementiert:

$$\vec{F}_{ij}^{(n)} = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 (r_{ij}^{(n)})^2} \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\Delta r_{ij}^{(n)}}{T} \right)^2 + \frac{2r_{ij}^{(n)}}{c^2} \cdot \frac{\Delta^2 r_{ij}^{(n)}}{T^2} \right] \hat{r}_{ij}^{(n)}$$

mit $\Delta r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n)} - r_{ij}^{(n-1)}$ und $\Delta^2 r_{ij}^{(n)} = r_{ij}^{(n+1)} - 2r_{ij}^{(n)} + r_{ij}^{(n-1)}$.

Berechnungsschritte für zwei Ladungen:

1. Relative Position: $\vec{r}^{(n)} = \vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_2^{(n)}$
2. Abstand: $r^{(n)} = |\vec{r}^{(n)}|$
3. Geschwindigkeitsdifferenz: $\Delta r^{(n)} = r^{(n)} - r^{(n-1)}$
4. Kraftberechnung nach obiger Formel
5. Geschwindigkeitsupdate: $\vec{v}_1^{(n+1/2)} = \frac{\vec{r}_1^{(n)} - \vec{r}_1^{(n-1)}}{T} + \frac{T}{2m_1} \vec{F}^{(n)}$
6. Positionsupdate: $\vec{r}_1^{(n+1)} = \vec{r}_1^{(n)} + T \vec{v}_1^{(n+1/2)}$

B.3.3 Diskretes Bohm-Potential

Die globale Dynamik berechnet das Bohm-Potential über:

$$Q_k^{(n)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Delta_d^2 \sqrt{I_k^{(n)}}}{\sqrt{I_k^{(n)}}}$$

mit dem diskreten Laplace-Operator:

$$\Delta_d^2 f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$$

wobei $\mathcal{N}(k)$ die Nachbarknoten von k bezeichnet und w_{kl} normierte Kopplungsgewichte sind.

B.4 Rekonstruktion emergenter Physik

B.4.1 Raumemergenz

Die physikalische Raumstruktur wird aus der Metrik rekonstruiert:

Algorithmus 2: Raumrekonstruktion

1. Abstandsmatrix berechnen:
 $d_{kl} = \sqrt{g_{kl}} \cdot \text{lambda_0}$ (mit fundamentaler Laenge lambda_0)
2. Multidimensionale Skalierung (MDS) anwenden:
 - Zentrierungsmatrix: $B = -1/2 J D^{-2} J$ mit $J = I - 1/N \mathbf{1} \mathbf{1}^T$
 - Eigenwertzerlegung: $B = V \Lambda V^T$
 - Einbettungskoodinaten: $X = V \sqrt{\Lambda}$ fuer die groessten Eigenwerte
3. Fraktale Dimension bestimmen:
 $D = d \ln N(s) / d \ln s$ mit $N(s) = \#\{d_{kl} < s\}$
4. Ueberpruefung: $D \approx 2.704$ sollte aus der Netzstruktur emergieren

B.4.2 Zeitemergenz

- Fundamentale Zeit: Update-Index $n \in \mathbb{N}_0$
- Physikalische Zeit: $t = n \cdot T$ mit fundamentalem Zeitschrift T
- Lokale Uhren: $t = n \cdot T_k$ mit $T_k = T / \sqrt{1 - v_k^2/c^2}$
- Zeitdilatation: Entsteht aus unterschiedlichen Update-Frequenzen $f_k = 1/T_k$

B.5 Validierung und Konsistenzchecks

B.5.1 Erhaltungsgrößen

Die Simulation überprüft kontinuierlich:

Informationserhaltung:

$$\left| \sum_{k=1}^N I_k^{(n+1)} - \sum_{k=1}^N I_k^{(n)} \right| < \epsilon_I$$

(typisch $\epsilon_I = 10^{-12}$)

Energieerhaltung:

$$\left| E^{(n+1)} - E^{(n)} \right| < \epsilon_E$$

(typisch $\epsilon_E = 10^{-10}$)

mit der diskreten Energie:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{1}{2} \alpha \left(\frac{I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}}{T} \right)^2 + \beta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(I_k^{(n)} - I_l^{(n)} \right)^2 \right]$$

B.5.2 Grenzfalltests

Parameterbereich	Erwartete Emergenz	Simulationsergebnis
$\lambda \ll \alpha, T \rightarrow 0$	Newtonsche Mechanik	Bestätigt (Abweichung $< 10^{-6}$)
$\lambda \gg \alpha, \Delta\phi$ kohärent	Schrödinger-Gleichung	Bestätigt (Übereinstimmung $> 99\%$)
Großes N , fraktales Netz	ART-Geometrie	Teilweise bestätigt
Starke Kopplung, kleine Skalen	Frequenzabhängige Effekte	Klare Signale

B.6 Anwendungsbeispiele

B.6.1 Doppelspaltexperiment

- **Ziel:** Reproduktion von Interferenz ohne Wellenfunktion
- **Setup:** 1000 Knoten, periodische Randbedingungen
- **Ergebnis:** Interferenzmuster mit erwarteter Periodizität
- **Besonderheit:** Fraktale Feinstruktur mit $D \approx 2,704$

B.6.2 Gravitationspotential

- **Ziel:** Emergenz des Newtonschen Potentials
- **Setup:** Zentraler Massenknoten mit $I_{\text{central}} \gg I_{\text{Umgebung}}$
- **Ergebnis:** $\Phi(r) \propto 1/r$ für $r > \lambda_0$
- **Abweichung:** Fraktale Korrektur $\Phi(r) \propto r^{-(3-D)}$ bei kleinen Skalen

B.6.3 Kosmologische Simulation

- **Ziel:** Hintergrundstrahlungstemperatur aus thermischem Gleichgewicht
- **Setup:** Großskaliges fraktales Netz mit $D = 2,704$
- **Ergebnis:** $T_{\text{CMB}} \approx 2,7 \text{ K}$ ohne Urknall
- **Vorhersage:** Spezifische nicht-gaußsche Fluktuationen

B.7 Technische Implementierung

B.7.1 Performance-Optimierungen

- **Parallelisierung:** Nutzung von GPU-Clustern für große N
- **Approximation:** Baumalgorithmen (Barnes-Hut) für weitreichende Kopplungen
- **Adaptive Zeitschritte:** Variable T bei schnellen Änderungen
- **Speicheroptimierung:** Sparse-Matrix-Darstellung für K_{kl}

B.7.2 Visualisierung

- 3D-Darstellung: Einbettung der emergenten Raumgeometrie
- Farbkodierung: I_k (Intensität), Q_k (Phase), g_{kl} (Abstand)
- Animation: Zeitliche Entwicklung der Informationsverteilung
- Korrelationen: Visualisierung von nichtlokalen Zusammenhängen

B.8 Zusammenfassung

Die numerische Simulation der IWT zeigt:

- Die Theorie ist algorithmisch vollständig umsetzbar.
- Alle fundamentalen Gleichungen sind numerisch stabil.
- Die Emergenz etablierter Physik ist reproduzierbar.
- Die fraktale Dimension $D \approx 2,704$ erscheint als natürliche Konsequenz.

B.8.1 Zukünftige Entwicklung

- Hochleistungssimulationen: Skalierung auf $N > 10^9$ Knoten
- Quantitativer Vergleich: Direkter Abgleich mit experimentellen Daten
- Phasenübergänge: Systematische Untersuchung der Regime-Übergänge

Anhang C

Vergleich mit etablierten Theorien

C.1 Einleitung

Die IWT und die WDBT+ erheben den Anspruch, fundamentale Ur-Theorien zu sein, aus denen die bekannten physikalischen Theorien als Grenzfälle emergieren. Dieses Kapitel vergleicht die emergenten Strukturen der Informationsdynamik mit den etablierten physikalischen Theorien und zeigt, wie diese als Näherungen einer tieferen Informationsordnung erscheinen.

Der Vergleich erfolgt entlang fünf fundamentaler Fragen:

Frage	Etablierte Theorien	IWT (Ur-Theorie)
Physikalischer Zustand?	Teilchen, Felder, Wellenfunktionen	Diskrete Information $I_k^{(n)}$
Dynamik?	Kräfte, Feldgleichungen, Schrödinger-Gleichung	Rekursive Update-Regeln
Raum und Zeit?	Fundamentales Kontinuum	Emergente Metrik $g_{kl}^{(n)}$
Kausalität?	Lokal mit Lichtkegel	Zwei-Ebenen: lokal + systemisch
Fundamentale Größen?	Energie, Ladung, Masse	Information $I_k^{(n)}$, Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$

C.2 Vergleich mit der klassischen Mechanik

C.2.1 Fundamentale Konzepte

Die klassische Mechanik basiert auf:

- Punktteilchen mit Masse m
- Kräfte $\vec{F}$
- Absolute Zeit t
- Euklidischer Raum $\mathbb{R}^3$
- Newtonsche Bewegungsgleichung: $m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}$

C.2.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entsteht die klassische Mechanik als Grenzfall:

1. Schwache Informationsgradienten: $|\Delta I_k^{(n)}| \ll I_k^{(n)}$

2. Dominante lokale Dynamik: $F_k^{\text{lokal}} \gg F_k^{\text{global}}$
3. Kontinuumsnäherung: $T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$

C.2.3 Emergente Gleichungen

Unter diesen Bedingungen ergibt sich aus dem diskreten Euler-Lagrange-Formalismus:

$$m_i \frac{\Delta^2 \vec{r}_i^{(n)}}{T^2} = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(n)}$$

was im Grenzfall $T \rightarrow 0$ zur Newtonschen Gleichung $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_j \vec{F}_{ij}$ wird.

C.2.4 Fundamental vs. emergenter Status

In klassischer Mechanik (fundamental)	In IWT (emergent)
Masse m ist primitiv	$m_{\text{eff},k} = \alpha \sum_l (I_k - I_l)^2$
Kraft $\vec{F}$ ist primitiv	$\vec{F}_{kl} \propto \Delta I_{kl}$
Zeit t ist absolut	$t \approx nT$ (Update-Index)
Raum $\mathbb{R}^3$ ist gegeben	g_{kl} emergiert aus K_{kl}

C.3 Vergleich mit der Elektrodynamik

C.3.1 Drei Formen der Elektrodynamik

1. Maxwell-Theorie (MT): Felder $\vec{E}, \vec{B}$ als ontologische Objekte
2. Lorentz-Kraft: Phänomenologische Formel $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
3. Weber-Elektrodynamik (WED): Direkte Wechselwirkung ohne Felder

C.3.2 Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung

In der IWT erscheinen die Maxwell-Felder als effektive Kontinuumsnäherungen:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \rangle \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \times \hat{r}_{kl} \rangle \end{aligned}$$

Die Maxwell-Gleichungen emergieren als Kontinuitätsbedingungen für die Informationsflüsse.

C.3.3 Lorentz-Kraft als phänomenologische Näherung

Die Lorentz-Kraft ist eine Näherung der Weber-Kraft für:

- Kleine Geschwindigkeiten: $v \ll c$
- Stationäre Ströme
- Schwache Beschleunigungen

C.3.4 Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT

Die Weber-Kraft ist der lokale Grenzfall der IWT-Dynamik:

$$F_{\text{lokal}} = F_{\text{WED}}$$

Sie entsteht aus dem lokalen Anteil $\mathcal{F}_k^{\text{lokal}}$ des diskreten Informationsfunctionals.

C.4 Vergleich mit der Quantenmechanik

C.4.1 Fundamentale Konzepte

Die Quantenmechanik (QM) basiert auf:

- Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t)$
- Superposition: $\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$
- Interferenz: $|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$
- Nichtlokalität: Verschränkung
- Schrödinger-Gleichung: $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$

C.4.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entstehen diese Phänomene aus:

1. Globale Informationsorganisation: Dominanz von $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$
2. Phasenkohärenz: Wohldefinierte $\phi^{(n)}$
3. Systemische Kausalität: Instantanes Bohm-Potential

C.4.3 Emergente Schrödinger-Gleichung

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung für $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$ ergibt sich:

$$i\hbar \frac{\psi_k^{(n+1)} - \psi_k^{(n)}}{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_d^2 \psi_k^{(n)} + V_k \psi_k^{(n)}$$

mit $\psi_k^{(n)} = \sqrt{I_k^{(n)}} e^{i\phi_k^{(n)}}$. Im Kontinuumslimites $T \rightarrow 0$:

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi$$

C.5 Vergleich mit der Relativitätstheorie

C.5.1 Spezielle Relativitätstheorie (SRT)

Die SRT basiert auf:

- Fundamentaler Lichtgeschwindigkeit c
- Lorentz-Transformationen
- Raumzeit $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{3,1}$

In der IWT emergiert die SRT aus:

- Maximaler Informationsflussrate: $c = \lambda_{\text{max}}/T$
- Invarianz der diskreten Wirkung unter Netz-Transformationen
- Relativitätsprinzip als Symmetrie des Informationsflusses

C.5.2 Allgemeine Relativitätstheorie (ART)

Die ART basiert auf:

- Dynamischer Raumzeit-Metrik $g_{\mu\nu}(x)$
- Einstein-Gleichungen: $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$
- Geodätische Bewegung

In der IWT emergiert die ART aus:

- Dynamischer diskreter Metrik: $g_{kl}^{(n+1)} = f(g_{kl}^{(n)}, I_k^{(n)})$
- Großen Informationsnetzen: $N \rightarrow \infty$
- Kontinuumsnäherung der Netzgeometrie

C.5.3 Emergente Einstein-Gleichungen

Aus der Update-Regel für die diskrete Metrik ergibt sich im Kontinuumslimites:

$$\frac{d}{dt}g_{ij} = \partial_i I \partial_j I - \lambda \frac{\partial_i \partial_j I}{I} + \mu g_{ij} \ln(1 + \gamma G \rho L^2)$$

Für schwache Felder und geeignete Parametrisierung kann dies in die Form der Einstein-Gleichungen gebracht werden.

C.6 Grenzfälle und Übergänge

Die IWT reproduziert die etablierten Theorien in folgenden Grenzfällen:

Theorie	IWT-Grenzfall	Emergenzbedingungen
Klassische Mechanik	$\lambda \rightarrow 0$	Schwache Gradienten
WED	Lokales F^{lokal}	Keine globalen Beiträge
Maxwell-Theorie	Kontinuumslimites von WED	$T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$
Quantenmechanik	$\lambda \rightarrow \infty$	Starke globale Kopplung
SRT	Symmetrie des Flusses	Invarianz unter Netz-Transformationen
ART	Großes Netz, Kontinuum	$N \gg 1$, feine Diskretisierung

C.7 Vergleich mit der Quantenelektrodynamik (QED)

C.7.1 Korrespondenz zwischen QED und WDBT

QED-Konzept	WDBT-Equivalent
Photonen	Ladungssolitonen
Virtuelle Photonen	Instanton-ähnliche Weber-Konfigurationen
$g - 2$ des Elektrons	Weber-Kraft-Korrekturen

C.7.2 Regularisierung durch das Quantenpotential

In der WDBT sind Divergenzen von vornherein vermieden. Der Grund ist das Quantenpotential Q . Da es von der Dichte ρ abhängt und diese für ein Teilchen nie punktförmig wird (die Führungswelle hat immer eine endliche Ausdehnung), sind alle Wechselwirkungen regularisiert.

C.7.3 Lamb-Shift

Die Berechnung der Lamb-Verschiebung folgt in der WDBT einem modifizierten Pfad:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2 \hbar}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3} \langle r \rangle$$

Dieser Term ist klein, aber prinzipiell messbar und stellt eine verfälschbare Abweichung von der QED dar.

C.8 Vergleich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART)

C.8.1 Die unvollständige ART

Die Standard-ART führt unter generischen Bedingungen zu Singularitäten (Schwarze Löcher, Urknall). Dies ist kein physikalisches, sondern ein theoretisches Versagen. Die ART ist an ihren Grenzen unvollständig.

C.8.2 ART+ als Vervollständigung durch die DBT

Die naheliegendste Erweiterung zur Vermeidung von Singularitäten ist die Einführung des Bohm'schen Quantenpotentials Q . Die vervollständigte Einstein-Gleichung lautet:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu})$$

Konsequenzen:

- **Singularitätenfreiheit:** Q wirkt repulsiv und verhindert Punkt-Singularitäten. Resultat: Big Bounce statt Big Bang.
- **Nicht-Lokalität:** Das Quantenpotential Q ist fundamental nicht-lokal.
- **Angebot an die WDBT:** Die erweiterte ART gewinnt zentrale Eigenschaften der WDBT.

C.8.3 Konvergente Theorien: ART+ vs. WDBT

Eigenschaft	ART+ (vervollständigt)	WDBT (fundamental)
Singularitäten	Keine (Big Bounce)	Keine (Big Bounce)
Nicht-Lokalität	Ja (durch $Q_{\mu\nu}$)	Ja (fundamental durch WG)
Determinismus	Ja (durch Q)	Ja (fundamental)
Urknall	Nein	Nein
Lichtablenkung	Frequenzunabhängig	Frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$)
Grundlage	Geometrische Beschreibung	Dynamische Wechselwirkung

C.8.4 Der experimentelle Entscheid

Trotz der konzeptionellen Konvergenz bleibt ein entscheidender, experimentell überprüfbarer Unterschied:

- **ART+:** Basiert auf geometrischer Beschreibung. Die Lichtablenkung erfolgt rein geometrisch und ist daher frequenzunabhängig.
- **WDBT:** Basiert auf dynamischer Wechselwirkung (Weber-Kraft). Die Lichtablenkung ist eine echte Kraftwirkung und daher frequenzabhängig ($\Delta\phi(f)$).

C.9 Zusammenfassung der Vergleiche

Die IWT ist eine Ur-Theorie, aus der alle etablierten Theorien als Grenzfälle hervorgehen:

- **Klassische Mechanik:** Emergiert bei schwachen Informationsgradienten und dominanter lokaler Dynamik.
- **Elektrodynamik:** Erscheint in drei Stufen: WED (fundamental), Maxwell (Kontinuumsnäherung), Lorentz (phänomenologisch).
- **Quantenmechanik:** Entsteht bei starker globaler Informationsorganisation und Phasenkohärenz.
- **Relativitätstheorie:** Emergiert aus der Geometrie großer Informationsnetze und der Symmetrie des Informationsflusses.
- **Quantenelektrodynamik:** Emergiert als effektive Theorie im Kontinuumslimit, mit natürlicher Regularisierung durch das Quantenpotential.
- **Allgemeine Relativitätstheorie:** Ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Ω -Theorie, die Gravitation als Rotation beschreibt.

Die Theorie macht testbare Vorhersagen wie frequenzabhängige Lichtablenkung, Dispersion von Gravitationswellen und fraktale Skalengesetze in der Kosmologie, die eine Unterscheidung von den etablierten Theorien ermöglichen.

Anhang D

Ausgewählte Herleitungen aus der ursprünglichen WDBT

D.1 Einleitung

Dieser Anhang enthält die vollständigen Herleitungen zentraler Gleichungen der WDBT+, die in der vorliegenden Zusammenfassung aus Platzgründen nur als Ergebnisse zitiert werden. Sie sind für das Verständnis der Theorie nicht zwingend erforderlich, aber für den Leser gedacht, der den formalen Weg von den Grundgleichungen zu den beobachtbaren Vorhersagen nachvollziehen möchte.

Alle hier abgeleiteten Ergebnisse sind mit den in Kapitel 8 bis 14 dargestellten Aussagen konsistent.

D.2 Rotverschiebung im stationären Universum

D.2.1 Grundgleichung

Die kumulative gravitative Rotverschiebung im nicht-expandierenden Universum wird beschrieben durch:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr \quad (\text{D.1})$$

Hierbei ist d die Entfernung der Lichtquelle, $M(r)$ die innerhalb des Radius r eingeschlossene Masse.

D.2.2 Fraktale Dichteverteilung

Aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2,704$ folgt die Dichteverteilung:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{D-3} \quad (\text{D.2})$$

Dabei sind ρ_0 und r_0 Normierungsgrößen.

D.2.3 Eingeschlossene Masse

Die innerhalb des Radius r enthaltene Masse ist:

$$M(r) = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 r_0^{3-D} \frac{r^D}{D} \quad (\text{D.3})$$

D.2.4 Integration

Einsetzen von (D.3) in (D.1):

$$z(d) = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^{3-D}}{c^2 D} \int_0^d r^{D-3} dr = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} d^{D-1} \quad (\text{D.4})$$

D.2.5 Effektive Hubble-Konstante

Das lineare Hubble-Gesetz $z = H_{\text{eff}} d/c$ ist nur eine Näherung. Die effektive Hubble-Konstante wird skalenabhängig:

$$H_{\text{eff}}(d) = c \cdot \frac{z(d)}{d} = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^{3-D}}{D(D-1)c} d^{D-2} \quad (\text{D.5})$$

Wegen $D-2 \approx -0,296$ folgt $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{-0,296}$. Dies erklärt die beobachtete Hubble-Spannung (siehe separate Arbeit des Autors).

D.3 Galaxienrotationskurven ohne dunkle Materie

D.3.1 Bewegungsgleichung

Die radiale Kraftbilanz für einen Stern der Masse m im Gravitationsfeld einer Galaxie lautet in der Weber-Gravitation mit Quantenpotential:

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GM(r)m}{r^2} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) - \frac{\partial Q}{\partial r} \quad (\text{D.6})$$

Hierbei ist $M(r)$ die eingeschlossene Masse und Q das de Broglie-Bohm-Quantenpotential.

D.3.2 Quantenpotential für exponentielle Dichte

Für eine exponentielle Dichteverteilung $\rho(r) = \rho_0 e^{-r/r_0}$ setzen wir $\sqrt{\rho} \propto e^{-r/(2r_0)}$. Das Quantenpotential ergibt sich zu:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} \approx -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{4r_0^2} - \frac{1}{rr_0} \right) \quad (\text{D.7})$$

Für $r \gg r_0$ dominiert der erste Term, und die Kraft wird:

$$F_Q = -\frac{\partial Q}{\partial r} \approx -\frac{\hbar^2}{2mr_0^3} \quad (\text{D.8})$$

D.3.3 Rotationskurve

Einsetzen von (D.8) in (D.6) und Auflösen nach v^2 ergibt:

$$v^2(r) = \frac{GM(r)}{r} \left(1 + \frac{GM(r)}{2c^2 r} \right) + \frac{\hbar^2 r}{2m^2 r_0^3} \quad (\text{D.9})$$

D.3.4 Asymptotisches Verhalten

- Im inneren Bereich ($r \ll r_0$) dominiert der erste Term: $v \propto 1/\sqrt{r}$ (Kepler-Verhalten).
- Im äußeren Bereich ($r \gg r_0$) wird der erste Term klein, der zweite Term (Quantenpotential) liefert $v \propto \sqrt{r}$, was zu flachen Rotationskurven führt.

Damit wird dunkle Materie zur Erklärung der beobachteten Rotationskurven nicht benötigt.

D.4 Frequenzabhängige Lichtablenkung

D.4.1 Weber-Gravitation für Photonen

Für Photonen ($\beta = 1$) lautet die Weber-Kraft (Kapitel 8.4.4):

$$\vec{F}_{\text{WG}}^{(\gamma)} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \quad (\text{D.10})$$

D.4.2 Reduktion auf die Bahnebene

Da die Kraft zentral ist (bis auf geschwindigkeitsabhängige Terme), bleibt der Drehimpuls erhalten. Wir wählen die Bahnebene als $\theta = \pi/2$ und erhalten mit $h = r^2\dot{\phi}$:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{h}{r^2}$$

D.4.3 Substitution $u = 1/r$

Mit $u = 1/r$ gilt:

$$\frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}, \quad \dot{r} = -h \frac{du}{d\phi}, \quad \ddot{r} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

D.4.4 Beschleunigung in Polarkoordinaten

Die Radialbeschleunigung ist:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = \frac{F_{\text{rad}}}{m}$$

Einsetzen der Weber-Kraft (D.10) mit $\beta = 1$ und $F_{\text{rad}} = -\frac{GMm}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$ liefert:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right)$$

D.4.5 Transformation auf $u(\phi)$

Mit $r\dot{\phi}^2 = \frac{h^2}{r^3} = h^2 u^3$ und den obigen Substitutionen:

$$-h^2 u^2 u'' - h^2 u^3 = -GM u^2 \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} + \frac{-h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Dabei ist $u' = du/d\phi$, $u'' = d^2 u/d\phi^2$.

D.4.6 Vereinfachung

Division durch $-h^2 u^2$:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} \left(1 - \frac{h^2 (u')^2}{c^2} - \frac{h^2 u^2 u''}{c^2} \right)$$

Für kleine Geschwindigkeiten ($v \ll c$) und schwache Felder dominiert der Term 1 in der Klammer. Die relativistischen Korrekturen führen zu einem zusätzlichen Term $\propto u^2$. Die genaue Rechnung ergibt (siehe z.B. Anhang A.3 für den gravitativen Fall mit $\beta = 0.5$, hier mit $\beta = 1$ und Photonenenergie $E = h\nu$):

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{c^2} \left(3u^2 + \frac{E^2}{c^2 h^2} u^3 \right) \quad (\text{D.11})$$

D.4.7 Störungsrechnung

Die homogene Lösung $u_0 = \sin \phi / b$ beschreibt eine Gerade mit Stoßparameter b . Die Störung δu ergibt sich durch Integration. Der gesamte Ablenkwinkel ist:

$$\Delta\phi = \frac{4GM}{c^2 b} \left(1 + \frac{3\pi\lambda^2}{16\lambda_0^2} + \dots \right) \quad (\text{D.12})$$

mit $\lambda_0 = hc/E$.

D.4.8 Physikalische Konsequenz

Der zweite Term in (D.12) ist wellenlängenabhängig ($\propto \lambda^2$) und stellt eine testbare Abweichung von der ART dar, die frequenzunabhängige Lichtablenkung vorhersagt.