

## Exponential Distribution

$$a) \int_0^{\infty} dx A e^{-x/l} = 1$$

Changing variables  $u = x/l$

$$A l \int_0^{\infty} \frac{dx}{l} e^{-x/l} = 1$$

$$A l \int_0^{\infty} du e^{-u} = 1$$

1 proved below

$$\boxed{A = 1/l}$$

b) Then

$$\langle x \rangle = \int_0^{\infty} \frac{dx}{l} x e^{-x/l}$$

$$= l \int_0^{\infty} \frac{dx}{l} \frac{x}{l} e^{-x/l}$$

$$= l \int_0^{\infty} du u e^{-u} = l$$

1 proved below

c)

c) We have

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^{\infty} dx \, x^2 \frac{e^{-x/l}}{l}$$

$$\langle x^2 \rangle = l^2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{l} \left(\frac{x}{l}\right)^2 e^{-x/l}$$

$$\langle x^2 \rangle = l^2 \underbrace{\int_0^{\infty} du \, u^2 e^{-u}}_{2!} = l^2 2!$$

So  $2!$  proved below

$$\langle \delta x^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = 2l^2 - l^2 = \underline{l^2} = \langle \delta x^2 \rangle$$

So

$$\sigma_x = \sqrt{\langle \delta x^2 \rangle} = l$$

d) We have

$$\langle e^{fx} \rangle = \int_0^{\infty} dx \, e^{fx} e^{-x}$$

$$= \int_0^{\infty} dx \, e^{-(1-f)x}$$

$$= \frac{1}{1-f}$$



- Now according to the generating fcn method

$$\langle e^{fx} \rangle = 1 + \langle x \rangle f + \frac{\langle x^2 \rangle}{2!} f^2 + \frac{\langle x^3 \rangle}{3!} f^3 + \dots$$

- The explicit computation gives

$$\langle e^{fx} \rangle = \frac{1}{1-f} = 1 + f + f^2 + f^3 + \dots$$

- So, for instance, comparing the coefficient of  $f^3$  we conclude

$$\frac{\langle x^3 \rangle}{3!} f^3 = f^3 \quad \text{or} \quad \langle x^3 \rangle = 3!$$

- More generally

$$\frac{\langle x^n \rangle}{n!} f^n = f^n \quad \text{or}$$

$$\langle x^n \rangle = n!$$

★ Above we used the following integrals

$$\bullet I_0 = \int_0^{\infty} e^{-u} du = -e^{-u} \Big|_0^{\infty} = 1$$

$$\bullet I_1 = \int_0^{\infty} e^{-u} u du \quad \text{we do this by parts}$$
$$= \int_0^{\infty} -d(e^{-u}) u du \quad dv = e^{-u}$$

$$= -e^{-u} u \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-u} du$$
$$= 0 + 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{we did it above} \end{array} \right\}$$

$$\bullet I_2 = \int_0^{\infty} e^{-u} u^2 du \quad \text{We do this by parts twice, } dv = e^{-u} = d(-e^{-u})$$
$$= \int_0^{\infty} (-de^{-u}) u^2 du$$

$$= -e^{-u} u^2 \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-u} 2u du$$

$$= 0 + 2 \cdot \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-u} u du}_1 = 2$$

## Gamma Fun

a) According to the previous problem

$$\begin{aligned} n! &= \int_0^{\infty} dx e^{-x} x^n \\ &= \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} e^{-x} x^{n+1} = \Gamma(n+1) \end{aligned}$$

b) So definition of  $\Gamma(n+1)$

$$\Gamma(1/2) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} e^{-x} x^{1/2}$$

• writing  $y = \sqrt{x}$ ,  $dy = \frac{1}{2} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ , or

$$\frac{2 dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

• So we find

$$\Gamma(1/2) = 2 \int_0^{\infty} \frac{dy}{y} e^{-y^2} y = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2}$$

• This is a gaussian integral,  $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{1}{2} \frac{x^2}{\sigma^2}} = \sqrt{2\pi\sigma^2}$ ,

with

$$\sigma^2 = 1/2$$

, so

$$\boxed{\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}}$$



• Then (this is optional) :

$$\boxed{c)} \quad \Gamma(x) = \int_0^{\infty} \frac{du}{u} e^{-u} u^{x+1}$$

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} du e^{-u} u^x$$

$$= \int_0^{\infty} -de^{-u} u^x$$

$$= e^{-u} u^x \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-u} x u^{x-1}$$

$$= 0 + x \int_0^{\infty} e^{-u} u^{x-1}$$

$$= x \Gamma(x)$$

$$\boxed{d)} \quad \text{So if} \quad \Gamma(7/2) = \frac{5}{2} \Gamma(5/2) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \Gamma(3/2)$$

$$= \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(1/2)$$

$$= \frac{15}{8} \sqrt{\pi} \approx 3.3$$

Now  $3 < \frac{7}{2} < 4$  so we expect (and find)

$$2! < \frac{15\sqrt{\pi}}{8} < 3! \quad \text{or} \quad 2 < 3.3 < 6$$

$$\boxed{e)} \quad A_2 = \frac{2\pi^{2/2}}{\Gamma(1)} r = 2\pi r$$

$$A_3 = \frac{2\pi^{3/2}}{\Gamma(\frac{3}{2})} r^2 = \frac{2\pi^{3/2}}{\frac{1}{2}\Gamma(1/2)} r^2$$

using  $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$  we have :

$$A_3 = 4\pi r^2$$



## Combinatorics and Stirling

- The number of selections is

$$N_A C_r = \frac{N_A!}{\left(\frac{1}{3}N_A\right)! \left(\frac{2}{3}N_A\right)!} \quad \text{with } r \equiv \frac{1}{3}N_A$$

- Taking the log

$$\log N_A C_r = \log N_A! - \log \left( \left(\frac{1}{3}N_A\right)! \right) - \log \left( \left(\frac{2}{3}N_A\right)! \right)$$

$$= N_A \log N_A - N_A - \left( \frac{1}{3}N_A \log \left( \frac{1}{3}N_A \right) - \frac{1}{3}N_A \right) \\ - \left( \frac{2}{3}N_A \log \left( \frac{2}{3}N_A \right) - \frac{2}{3}N_A \right)$$

$$= -\frac{1}{3}N_A \log(3) + \frac{2}{3}N_A \log\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$= \frac{N_A}{3} \log\left(\frac{27}{4}\right) = 0.64 N_A$$

- So

$$N_A C_r = e^{0.64 N_A} = (e^{\log 10})^{0.64 N_A / \log 10}$$

$$= 10^{0.64 N_A / \log 10} \approx 10^{1.66 \times 10^{23}}$$



## Random Walk

$$(a) \quad \langle x \rangle = p a - (1-p) a$$

$$\underline{\langle x \rangle = a (2p - 1)}$$

$$\langle x^2 \rangle = p a^2 + (1-p) a^2 = a^2$$

So

$$\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = a^2 (1 - (2p-1)^2)$$

$$= a^2 (1 - 4p^2 + 4p - 1)$$

$$\langle \delta x^2 \rangle = a^2 4p(1-p)$$

$$\underline{\sigma_x = a \sqrt{4p(1-p)}}$$

(b) After  $n$  steps

$$\langle X \rangle = n \langle x \rangle = n (2p-1) a$$

$$\langle \delta X^2 \rangle = n \langle \delta x^2 \rangle = a^2 4p(1-p) n$$

(c) Then we have to require

$$X > 2\sigma_x$$

Or

$$n \underline{(2p-1)a} > 2\sqrt{4p(1-p)} \sqrt{n} a$$

• So

$$\sqrt{n} > \frac{4\sqrt{p(1-p)}}{2(p-1/2)}$$

$$\sqrt{n} \geq \frac{1}{p-1/2}$$

$p \approx 1/2$ , so the  
numerator is approx:  
 $4\sqrt{1/2 \cdot 1/2} \approx 2$

$$n \geq \frac{1}{(p-1/2)^2}$$

• So if  $p = \frac{1}{2} + 0.0001$ , we have

$$\boxed{n \geq 10^8}$$



Speed of Nitrogen Gas:  $N_2$  diatomic nitrogen

$$PV = N k_B T$$

• So

$$k_B T = \frac{PV}{N} = \frac{(5 \times 10^5 \text{ N/m}^2)(6 \times (0.1 \text{ m})^3)}{2 \times 6 \times 10^{23}}$$

$$= 2.5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$k_B = \frac{1.44}{273} \frac{\text{eV}}{\text{°K}}$$

$$\approx 0.016 \text{ eV}$$

$$T = 180^\circ \text{K}$$

• So the molecule has five degrees of freedom

$$E = \frac{5}{2} k_B T \approx 0.040 \text{ eV}$$

• The translational motion is 3-degrees of freedom

$$\left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = 3 \times \frac{1}{2} k_B T$$

So

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$$

$$V_{\text{rms}} = \left( \frac{3 k_B N_A T}{m N_A} \right)^{1/2}$$

Now  $k_B N_A = 8.32 \frac{\text{J}}{\text{K}}$   $T = 180^\circ \text{K}$

So  $m N_A = \text{molar mass} \approx 28 \text{g} = 2 \times 14 \text{g}$

$$V_{\text{rms}} = \left( \frac{3 \cdot 8.32 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 180^\circ \text{K}}{28 \text{g}} \right)^{1/2}$$

$$\approx 400 \text{m/s}$$