

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

**Прикладная математика и информатика**

## **ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3**

по дисциплине  
"Интервальный анализ"

Выполнила студентка  
группы 5030102/80201

Деркаченко Анна Олеговна

Проверил  
доцент, к.ф.-м.н.

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург  
2021 г.

# Содержание

<b>1. Постановка задачи</b>	<b>4</b>
<b>2. Теория</b>	<b>4</b>
2.1. Распознающий функционал . . . . .	4
2.2. Достижение разрешимости ИСЛАУ за счет коррекции правой части . . . . .	4
2.3. Достижение разрешимости ИСЛАУ за счет коррекции матрицы . . . . .	5
2.4. Оценки вариабельности решения . . . . .	5
<b>3. Реализация</b>	<b>5</b>
<b>4. Результаты</b>	<b>5</b>
4.1. Достижение разрешимости ИСЛАУ . . . . .	5
4.2. Коррекция правой части . . . . .	6
4.3. Коррекция матрицы . . . . .	7
4.4. Управление положением максимума распознающего функционала . . . . .	7
<b>5. Обсуждение</b>	<b>10</b>

## Список иллюстраций

1.	График $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ . . . . .	6
2.	График $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ для ИСЛАУ с коррекцией в правой части . . . . .	6
3.	График $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ для ИСЛАУ с коррекцией матрицы . . . . .	7
4.	Положение максимумов Tol при коррекции матрицы в целом . . . . .	8
5.	Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (1 строка) . . . .	8
6.	Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (2 строка) . . . .	9
7.	Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (3 строка) . . . .	9

# 1. Постановка задачи

Пусть дана ИСЛАУ:

$$\begin{cases} [1, 2] \cdot x_1 + [0, 5] \cdot x_2 = [2, 8] \\ x_1 - [1, 2] \cdot x_2 = 0 \\ [1, 3] \cdot x_1 = [5, 8] \end{cases} \quad (1)$$

Необходимо:

- 1) Вычислить максимум распознающего функционала
- 2) Достичь разрешимости ИСЛАУ за счет коррекции:
  - правой части
  - матрицы
- 3) Вычислить оценки варибельности решения
- 4) Исследовать управление положением решения за счет:
  - радиусов элементов матрицы в целом
  - радиусов элементов матрицы построчно

## 2. Теория

### 2.1. Распознающий функционал

**Опр: распознающий функционал** - ограниченный, вогнутый функционал, достигающий конечного максимума на  $\mathbb{R}^n$ .

$$Tol(x) = Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ rad \mathbf{b}_i - \left| mid \mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^n \mathbf{a}_{ij} x_j \right| \right\} \quad (2)$$

$$x \in \Xi_{tol} \Leftrightarrow Tol(x) \geq 0 \quad (3)$$

Если  $\max_{x \in \mathbb{R}^n} Tol(x) \geq 0$ , то допустимое множество не пусто, иначе  $\Xi_{tol} = \emptyset$ . Обратное также верно.

### 2.2. Достижение разрешимости ИСЛАУ за счет коррекции правой части

**Идея метода:** к каждой компоненте правой части ИСЛАУ добавляется величина  $K \cdot \nu_i \cdot [-1, 1]$ , где  $i$  - номер компоненты,  $\nu_i$  - вес, задающий относительное расширение  $i$ -компоненты,  $K$  - общий коэффициент расширения вектора  $\mathbf{b}$ .

Положим значение  $\nu_i = 1 \forall i = \overline{1, 3}$ .  $K$  подбирается из соотношения  $K + \max_{x \in \mathbb{R}^n} Tol(x) \geq 0$ , что делает ИСЛАУ разрешимой.

## 2.3. Достижение разрешимости ИСЛАУ за счет коррекции матрицы

**Идея метода:** модифицировать матрицу ИСЛАУ  $\mathbf{A}$  за счет ее замены на  $\mathbf{A} \ominus K \cdot N \cdot \mathbf{E}$ , где  $N = \{\nu_i\}$  - матрица весов,  $K$  - общий коэффициент сужения  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{E}$  состоит из интервалов  $[-e_{ij}, e_{ij}]$ .

Коррекция выполняется пропорционально координатам точки максимума распознающего функционала с проверкой принадлежности вычислений к  $\mathbb{IR}$ .

Для управления положением максимума распознающего функционала  $N$  - единичная матрица для коррекции матрицы в целом, а для построчной коррекции выбирается  $N = \text{diag}\{\nu_i\}$ .

## 2.4. Оценки вариабельности решения

*Абсолютная оценка вариабельности:*

$$ive(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \min_{A \in \mathbf{A}} \text{cond } A \cdot \|\text{argmax}_{x \in \mathbb{R}^n} Tol(x)\| \frac{\max_{x \in \mathbb{R}^n} Tol(x)}{\|\mathbf{b}\|} \quad (4)$$

*Относительная оценка вариабельности:*

$$rve(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \min_{A \in \mathbf{A}} \text{cond } A \cdot \max_{x \in \mathbb{R}^n} Tol(x) \quad (5)$$

## 3. Реализация

Реализация лабораторной работы проводилась с помощью встроенных средств в среде разработки MATLAB, библиотеки IntLab для интервальной арифметики, библиотеки tolsolvty для нахождения максимума распознающего функционала.

Исходный код лабораторной работы размещен в GitHub-репозитории.

URL: <https://github.com/derkanw/IntervalAnalysis/tree/main/lab3>

## 4. Результаты

### 4.1. Достижение разрешимости ИСЛАУ

Исходная ИСЛАУ имеет пустое допусковое множество, так как максимальное значение  $Tol = -2.0769 < 0$  для точки  $[2.9231, 0.84615]$ .




Рис. 1. График  $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$

## 4.2. Коррекция правой части

При коррекции правой части получено максимальное значение  $Tol = 0.41538 > 0$  для точки  $[2.9231, 0.84615]$ . То есть система стала совместной.

При этом вектор-столбец  $\mathbf{b}' = ([-0.4924, 10.4924], [-2.4924, 2.4924], [2.5076, 10.4924])$ , оценки  $ive = 0.13593$  и  $rve = 0.67211$ .




Рис. 2. График  $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$  для ИСЛАУ с коррекцией в правой части

### 4.3. Коррекция матрицы

При коррекции матрицы получено максимальное значение  $Tol = 0.32981 > 0$  для точки  $[2.6683, 1.3345]$ . То есть система стала совместной. При этом матрица имеет вид:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} [1.4826, 1.5174] & [2.2864, 2.7136] \\ 1 & [-1.5028, -1.4972] \\ [1.9974, 2.0026] & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Абсолютная и относительная оценка вариабельности принимают значения  $ive = 0.11275$  и  $rve = 0.42923$  соответственно.




Рис. 3. График  $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$  для ИСЛАУ с коррекцией матрицы

### 4.4. Управление положением максимума распознающего функционала

Позиция максимума распознающего функционала определяется на каждой итерации применением сжатия вдвое интервалов для каждой строки матрицы. Всего проведено 10 таких итераций.




Рис. 4. Положение максимумов Tol при коррекции матрицы в целом

Результат, полученный отдельно для каждой строки:




Рис. 5. Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (1 строка)






Рис. 6. Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (2 строка)




Рис. 7. Положение максимумов Tol при коррекции матрицы построчно (3 строка)

## 5. Обсуждение

Коррекция правой части ИСЛАУ не меняет форму распознающего функционала и положение максимума. Это объясняется, что использование коэффициента расширения увеличивает значение максимума распознающего функционала на величину этого коэффициента. Но достижение разрешимости напрямую зависит от выбора величины данного коэффициента.

Коррекция матрицы ИСЛАУ изменяет форму распознающего функционала и влечет смещение положения максимума. При этом данная коррекция показывает меньшие значения оценок варибельности по сравнению с значениями оценок при коррекции правой части ИСЛАУ.

При управлении положением максимума в большинстве случаев заметно сгущение полученных точек максимума при итерациях к одному из положений. Данная закономерность не соблюдается для случая коррекции только первой строки матрицы. Ее коррекция не вызывает единообразного влияния на общее смещение положения максимума, а скорее, является своеобразным шумом при данных вычислениях.