Coinfección por *Anaplasma* spp., *Dirofilaria repens* y *Dirofilaria immitis* en un perro: Reporte de caso

Ángela M Sánchez Pamplona[1]; Felipe Amador Lujan[1]; Leidy A Giraldo Martínez[1]; Alida C Valencia Gafaro[1]; Juan C Álvarez Díaz[1]; César O Muñoz-Cadavid[1]
On Site Diagnostic
Grupo de investigación on site research, Medellín, Colombia

ANAMNESIS

Especie: Canino
Raza: mestizo
Sexo: Macho entero
Peso: 16,4 kg
Edad: 3 años

Decaimiento, inapetencia e inflamación en miembro pelviano derecho, con un foco alopécico a nivel de la articulación tarsocrural.

Los propietarios indican procedencia de la región atlántica y reciente mudanza a Medellín



HALLAZCOS CLÍNICOS Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Examen físico:
Temperatura: 39,7 °C
Frecuencia respiratoria : 44 rpm
Hemograma con frotis sanguíneo: Leucocitosis marcada, neutrofilia y linfocitosis absoluta. Se observaron microfilarias en el frotis
PCR tiempo real cuantitativa (qPCR) para hemotrópicos: positiva para *Anaplasma* spp. con 1,8x10^2 copias/µL, D. repens y D. immitis, ambas con 1,8x10^6 copias/µL.



ENFOQUE DEL TRATAMIENTO

Inicialmente:
Amoxicilina
Ácido clavulánico
Dexametasona
Ranitidina
Clorhexidina spray
Prednisolona a dosis decrecientes

Después del resultado de qPCR:
Doxiciclina
Esomeprazol por 30 días,
Sarolaner
Moxidectina
Pirantel 1 tab/mes por un año
Dipropionato de imidocarb 12% (0,7 cc SC) con atropina previa (0,8 cc SC), repitiendo la dosis a los 15 días.

RESULTADOS

El tratamiento inicial incluyó antibióticos, antiinflamatorios y cuidado tópico de la lesión. Posterior al diagnóstico, se instauró doxiciclina, imidocarb y manejo de ectoparásitos. La respuesta al tratamiento fue positiva, con una resolución completa de la lesión y la normalización de los signos clínicos. Considerando la presencia de *D. repens* y la respuesta favorable de la lesión cutánea al tratamiento antifilárico, es posible establecer una relación entre la infección y la manifestación dermatológica.

CONCLUSIÓN

El paciente presentó signos compatibles con una infección de origen vectorial con el factor de riesgo de zona endémica. Tras realizar pruebas diagnósticas, se identificó la coinfección por *Anaplasma* spp., *D. immitis y D. repens*. Se observó una respuesta efectiva a la terapia con un pronóstico favorable para el paciente.

Keywords: Coinfection; Dog; Filaria; Hemotropics