Evaluación de coinfección en felinos domésticos positivos a FeLV

Ángela María Sánchez-Pamplona[1] Leidy Alejandra Giraldo-Martínez[1], Felipe Amador-Luján[1], Alida Carolina Valencia-Gafaro[1], Juan Camilo Álvarez-Díaz[1], César Orlando Muñoz-Cadavid[1]

[1]Grupo de investigación On Site Research, On Site Diagnostic SAS, Medellín, Colombia

Introducción


El virus de la leucemia felina (FeLV) es un retrovirus caracterizado por generar un efecto inmunosupresor, lo que predispone al paciente a presentar coinfecciones.

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de coinfección en pacientes positivos a FeLV y analizar su relación con variables epidemiológicas.

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo en muestras positivas a FeLV mediante RT-qPCR, que fueron remitidas al laboratorio On Site Diagnostic durante los años 2024 y 2025.


El total de pacientes analizados fue de 150.




Resultados y discusión

Se presentó una edad media de 3.41 años, con un predominio de machos (60.4%), frente a las hembras (38.7%). En los grupos etarios se observó que la mayoría son adultos (68%), siguiendo cachorros (18.7%) y en menor cantidad gerontes (12%). La raza predominante fue la criolla con un total de 135 individuos.

Se encontró una asociación significativa en relación a los grupos etarios y la presencia de coinfección (p=0.001), siendo los cachorros el grupo más vulnerable, que puede ser reflejo de su sistema inmune aún inmaduro. No se evidenció una relación significativa entre la coinfección y el sexo, lo que sugiere que machos y hembras están en riesgo similar.



La frecuencia global de coinfecciones fue del 18.7%. Las coinfecciones predominantes fueron:



La asociación significativa con una edad joven concuerda con Muz & Muz (2023), quienes encontraron una mayor positividad de coinfección en gatos más jóvenes.

- La falta de una asociación significativa con el sexo es consistente con los hallazgos de Melo et al. (2023), quienes no informaron diferencias en la prevalencia de patógenos transmitidos por vectores entre machos y hembras.
- La identificación de Mycoplasma como una coinfección común está bien documentada en gatos FeLV-positivos y se sabe que causa alteraciones hematológicas más graves en individuos coinfectados (Firmino et al., 2016). *Anaplasma* y *Bartonella* también se han reportado previamente en coinfecciones con este virus (So-In et al., 2025; Muz & Muz, 2023).

Conclusión

Estos hallazgos refuerzan la importancia de un enfoque diagnóstico integral en gatos positivos a leucemia, con énfasis en cachorros y la inclusión de los agentes *Anaplasma* spp., *Bartonella* spp., *Hepatozoon* spp. y *Mycoplasma* spp. en evaluación de infecciones secundarias.

Keywords: Leucemia felina, coinfección, hemotrópicos, RT-qPCR.

BIBLIOGRAFÍA