

	CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	REVISÃO: 03
	DETENTOR DO PROCESSO: E. VAN KUIJK	DATA DE APROVAÇÃO: out-2018

INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
03	Out-2018	BPIR-3032 Ajustes nas seções 8.5.6 & 8.6.1 para atendimento à qualificação da ISNetwork.
02	Mar-2015	Esta revisão anula e substitui a WI SM112-03 usando o modelo novo do GEMS.

1. OBJETIVO

Assegurar que os funcionários estejam cientes dos perigos de doenças causadas pelo estresse térmico e dos sistemas para mitigar ou prevenir eventuais doenças relacionados ao estresse térmico.

2. ESCOPO

Esta instrução aplica-se a todos os locais de construção e escritórios em que o pessoal esteja trabalhando para ou em nome das Empresas do Grupo.

3. INFORMAÇÕES SOBRE ESTRESSE TÉRMICO

3.1. Introdução

- 3.1.1. O estresse térmico refere-se a uma série de condições, por exemplo, câibras, esgotamento térmico e insolação; todos causados pela exposição contínua a alta temperatura, umidade e sol direto em conjunto à falta de hidratação.
- 3.1.2. Ao trabalhar em condições quentes, o sistema termorregulador humano tenta manter a temperatura essencial do corpo em 37°C. Isso é feito através do aumento do fluxo sanguíneo à pele visando levar o calor para longe do centro, e provoca o suor, no qual sua evaporação resfria a pele e, conseqüentemente, o sangue.
- 3.1.3. Se este controle for perdido e a temperatura começa a subir, surgindo efeitos fisiológicos de forma progressiva.

3.2. Sintomas Iniciais

- 3.2.1. São eles:
 - Perda de interesse na tarefa;
 - Dificuldade em permanecer atento;
 - Vontade de procurar locais mais confortáveis, a supressão desta vontade pode resultar em irritação.
- 3.2.2. Estes sintomas iniciais evoluem a uma perda de coordenação e destreza, apresentando implicações significativas à segurança e produtividade.

3.3. Exposição ao Calor em Ambientes de Trabalho

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

- 3.3.1. Os ambientes de trabalho que podem representar um risco à saúde devido à temperatura alta e extrema são espaços fechados, tais como sala de máquinas, sala de bombas, tanques, praça de máquinas, compartimentos estanques, etc. ou espaços abertos como o convés principal, em proximidade ao flare ou em áreas expostas ao sol, particularmente em regiões equatoriais e tropicais.
- 3.3.2. Os supervisores e todos os funcionários são responsáveis por reconhecer sintomas do estresse térmico, tanto em si próprio quanto nos colegas de trabalho. A prevenção/métodos de controle descritos neste procedimento devem ser implementados.

3.4. Perigos

A exaustão térmica envolve a disfunção leve à moderada do controle de temperatura associado a temperaturas elevadas e/ou ao exercício árduo, resultando em desidratação e depleção de sal. Isto é causado pelo excesso de transpiração, resultando em perda de água e redução do fornecimento de sangue aos principais órgãos como o cérebro, músculos e pele. A forma mais grave de estresse térmico é a insolação. Ela é basicamente o sobreaquecimento do corpo e de seus órgãos vitais. A insolação é uma condição de ameaça à vida.

3.5. Fatores do Estresse Térmico

Os principais factores que determinam o estresse térmico são:

- Temperatura do ar;
- Temperatura de paredes (em espaços confinados);
- Temperatura da pele;
- Umidade;
- Velocidade do ar;
- Taxa metabólica, ou seja, o calor produzido dentro do corpo por processos bioquímicos e pela energia gasta no trabalho físico;
- Área de superfície corporal exposta à alta temperatura;
- A idade do trabalhador;
- Atitude Postural;
- Vestuário;
- Tolerância ao calor;
- Aclimatização térmica;
- Condições físicas do trabalhador;
- Alguns medicamentos;
- Gravidez;
- Falta de exposição anterior ao trabalho a quente;
- Duração da exposição.

4. SINTOMAS & SINAIS

4.1. Edema Por Calor

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

O Edema por calor é o inchaço que geralmente ocorre entre pessoas que não estão aclimatados ao trabalhar em condições quentes. O inchaço é frequentemente mais perceptível nos tornozelos. A recuperação ocorre após um ou dois dias em um ambiente fresco.

4.2. Câibras por Calor

- 4.2.1. Câibras por calor (dores musculares e espasmos no abdômen, braços ou pernas) são geralmente causadas ao realizar o trabalho físico em um ambiente muito quente. Câimbras parecem ser causadas pela falta de reposição de água, mas deve-se ressaltar que elas podem ser causadas tanto por excesso ou falta de sal.
- 4.2.2. As medidas de primeiros socorros incluem: parar todas as atividades, e sentar-se em um lugar fresco, beber líquidos claros ou bebidas isotônicas, ou beber água com alimentos e descansar por algumas horas após as câimbras acalmarem.
- 4.2.3. Procurar assistência médica caso a vítima sofra de problemas de coração, esteja em uma dieta baixa em sódio, ou se as câimbras não diminuírem dentro de uma hora.

4.3. Erupção Cutânea

- 4.3.1. Erupções cutâneas são o problema mais comum em ambientes de trabalho a quente, também conhecidas como brotoejas, a erupção é causada por períodos sem intervalos de transpiração constante, produzindo inflamação e entupimento dos dutos de suor. Isto pode resultar em áreas de pequenas bolhas vermelhas, causando irritação e dor. As brotoejas podem causar problemas secundários com infecções da pele e é uma indicação de condições adversas que podem causar a insolação.
- 4.3.2. Na maioria dos casos, as brotoejas cutâneas desaparecerão quando o indivíduo afetado retornar a um ambiente fresco.

4.4. Síncope por Calor (Desmaio)

- 4.4.1. A síncope por calor ocorre quando o sangue se acumula nas partes baixas do corpo, causando uma redução temporária do fornecimento de sangue ao cérebro e, consequentemente, a perda de consciência, em curto prazo.
- 4.4.2. O desmaio associado pode ser perigoso, pois a vítima pode estar operando máquinas ou controlando uma operação que não deva ser deixada desassistida, além disso, a vítima pode ser lesionada ao desfalecer.

4.5. Exaustão por Calor (Fadiga)

- 4.5.1. A exaustão por calor resulta da falha do fluxo sanguíneo ao eliminar o calor adequadamente. Uma diminuição do volume sanguíneo pode ser o resultado de uma desidratação causada por uma ingestão inadequada de líquidos.
Como alternativa, quando uma combinação de estresse térmico ambiental e trabalho provoca uma pulsação excessivamente rápida e, então, o intervalo de tempo entre as sucessivas contrações do músculo cardíaco pode ser insuficiente para manter uma fonte adequada ao coração e, como consequência, a taxa de fluxo sanguíneo irá cair. A temperatura corporal central pode subir a 39°C.
 - Cansaço, sede, tontura;
 - Dormência ou formigamento nos dedos das mãos e dos pés;
 - Falta de ar, palpitações, pressão arterial baixa;
 - Visão turva, dor de cabeça, náuseas e desmaios;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

- Pele úmida, que pode estar tanto pálida quanto corada.

4.5.2. Um fator que predispõe o indivíduo à fadiga por calor é a falta de aclimação. A utilização de um programa de aclimação e treinamento para o trabalho em ambientes quentes é aconselhável.

4.5.3. As medidas de primeiros socorros incluem; o descanso em uma área fresca; beber muita água ou outras bebidas refrescantes, tomar uma ducha, banheira, usar esponja encharcada.

4.6. Insolação

4.6.1. Esta é a mais grave de todas as doenças relacionadas ao calor e podem ocorrer quando a temperatura central do corpo excede 41°C (que pode chegar a 45°C), e a coordenação involuntária do sistema nervoso, incluindo a regulação térmica que é afetada. Podem ocorrer lesões irreversíveis aos rins, fígado e cérebro.

4.6.2. A insolação traz um alto risco de fatalidade devido a parada respiratória ou cardíaca, e deve ser tratada como uma emergência médica.

4.6.3. Alguns sintomas de insolação são semelhantes aos de doenças menos graves por calor, ou seja, dores de cabeça, tonturas, náuseas, fadiga, sede, falta de ar e palpitações, mas o início da doença pode ocorrer de forma súbita e dramática, e a exaustão de calor pré-existent não se faz necessária.

4.6.4. Os sintomas adicionais de calor podem incluir:

- Descontinuação do suor, a pele permanece quente, mas fica seca pode adotar uma coloração vermelha e manchada, e os lábios podem ficar com uma coloração azulada;
- A desorientação, que pode tornar-se severa, incluindo pupilas dilatadas, um olhar vidrado e comportamento irracional agressivo;
- Tremores incontroláveis e outras contrações musculares;
- Perda de consciência e convulsões.

5. TRATAMENTO

5.1. Para câibras por calor ou exaustão por calor, o trabalhador deve ser removido da área de trabalho para um local fresco ou área com sombra e muita água ou outros líquidos. A administração de comprimidos de sal não é recomendada. Líquidos eletrólitos são recomendados.

5.2. Para vítimas de insolação, o indivíduo vai precisar de atenção médica imediatamente. Enquanto espera por ajuda, a vítima deve ser transferida para uma área com sombra fresca ou com o aumento da circulação de ar, se possível. Camadas de roupas externas devem ser removidas, e compressas frias podem ser usadas. Se a vítima estiver consciente, dar água ou outros fluidos.

6. EFEITOS DE MEDICAMENTOS COMUNS

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

Algumas medicações podem apresentar efeitos secundários relevantes ao calor se tomado antes ou durante o turno. Por exemplo:

Efeito do	Medicamento
Anti-histamínico (Comprimidos para Rinite Alérgica)	Inibe a transpiração
Beta-bloqueadores (Comprimidos para pressão arterial ou remédios do coração)	Podem inibir a tolerância ao exercício
Diuréticos (comprimidos aquosos)	Podem causar desidratação
Tratamentos de Angina (Spray GTN, comprimidos, adesivos)	Podem causar uma queda da pressão arterial
Tranquilizantes, sedativos (comprimidos antidepressivos para dormir)	Implicam na baixa tolerância ao calor, e podem causar uma queda de pressão
Anti-inflamatório (Brufen, ibuprofeno) e analgésicos (medicamentos analgésicos - Voltarol, Paracetamol)	Podem interferir com a temperatura corporal

6.1. Preocupações Quanto à Segurança

- 6.1.1. A falta de estabilidade das mãos suadas, tontura ou o embaciamento de óculos de segurança é a forma mais comum dos efeitos causados pelo excesso de calor.
- 6.1.2. O desempenho físico individual, alerta mental e condições psicológicas também são afetados em ambientes quentes.
- 6.1.3. Aumento da temperatura corporal e o desconforto físico podem causar irritabilidade, raiva, e outros estados emocionais que podem levar os trabalhadores a diminuir seus critérios na segurança ou a ignorar atos e condições perigosas.
- 6.1.4. Como consequência, a frequência de incidentes pode aumentar em ambientes quentes.

7. AVALIANDO O RISCO TÉRMICO

Diversos fatores podem influenciar a carga de calor no corpo. Estes incluem:

- Temperaturas do Ar
- Radiação;
- Umidade;
- Circulação do ar;
- O nível de trabalho físico;
- A quantidade e o tipo de roupa a ser usada.

Vestimentas grossas, com várias camadas ou roupas impermeáveis particularmente impedem a perda de calor, e podem causar um risco adicional especialmente durante tarefas que exigem esforço físico. O uso de EPI como proteção respiratória também pode afetar uma pessoa com tolerância a ambientes quentes.

7.2. Avaliação de Risco do Estresse Térmico

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

- 7.2.1. As avaliações de risco do estresse térmico devem ser realizadas em conformidade com os requisitos do procedimento de avaliação de risco e instruções.
- 7.2.2. Uma avaliação de risco de estresse térmico deve incluir as seguintes etapas:
- Identificar os riscos.
 - Identificar os trabalhadores mais vulneráveis e aqueles que podem ser mais prejudicados pelo calor;
 - Avaliar os riscos e decidir se as precauções existentes são adequadas ou se algo mais deve ser feito;
 - Registrar os resultados;
 - Análise de sua avaliação e revisão, conforme necessário.

8. MEDIDAS DE CONTROLE

8.1. Hierarquia de Controle

Três principais medidas de controle podem ser usadas e devem ser implantadas com a seguinte hierarquia:

- Controles de Engenharia;
- Controles Administrativos e Práticas de Trabalho;
- Proteção Pessoal.

8.2. Controles de Engenharia

Controles de engenharia afetam a temperatura do ar, umidade do ar e a circulação do ar. A ventilação geral deve ser usada para diluir o ar quente com o ar mais frio (geralmente ar mais fresco que é trazido de fora).

8.2.1. Controle de Calor por Convecção

Aumentar a circulação do ar em toda a pele, através do aumento de ventilação geral ou local irá acelerar a taxa de perda de calor do corpo.

8.2.2. Controle de Calor Radiante

A fim de reduzir o ganho de calor radiante em uma área relativamente pequena, o único controle de engenharia é proteger o trabalhador da superfície radiante ou reduzir a temperatura da superfície radiante.

8.2.3. Controle de Calor por Evaporação

A perda de calor por evaporação pode ser amenizada por uma melhor ventilação, ou seja, a circulação do ar. Podendo ser:

- O aumento da velocidade do ar (uso de ventiladores e sopradores);
- Criação de ambientes frescos para fins de descanso/recuperação com o uso de resfriadores portáteis e fornecimento de bebidas frescas.

8.3. Controles Administrativos e Práticas de Trabalho

8.3.1. Visando dar suporte aos controles de engenharia; soluções administrativas e higiênicas e boas práticas de trabalho podem ser aplicadas.

8.3.2. Tais ações podem incluir:

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

- Avaliações de risco do estresse térmico;
- Inspeções com caminhadas;
- Programa de aclimação de calor;
- Vigilância Médica;
- Redução de exposição ao calor;
- Treinamento;
- Práticas de Movimentação de Cargas

8.4. Aclimação Térmica;

- 8.4.1. O pessoal que será exposto a altas temperaturas durante todo o curso do turno deve ser aclimatado às condições. A maioria das pessoas se aclimatam por cerca de uma semana, no entanto aclimação decai rapidamente, diminui a tolerância mesmo durante dois dias e desaparece completamente durante cerca de duas semanas. Qualquer um que tenha estado ausente por mais de uma semana não deve pressupor que possa trabalhar em um ambiente quente no mesmo ritmo no retorno sem risco de sofrer de doenças térmicas, por isso, o ritmo de trabalho/descanso deve ser modificado para levar isso em consideração. Isto implica no planejamento dos padrões de trocas.
- 8.4.2. A aclimação provavelmente não será necessária a aqueles que passam por exposições térmicas ocasionais, intermitentes, de curto prazo, embora as precauções e comportamentos detalhadas neste guia sejam ainda pertinentes.
- 8.4.3. A aplicação Offshore do programa de aclimação continua a critério do médico a bordo com base nas condições físicas individuais e na experiência do trabalhador em ambientes quentes, no entanto, os critérios sugeridos abaixo devem ser seguidos:
- Não entrar em espaços confinados no dia de chegada;
 - Nenhuma atividade na sala de bombas no dia da chegada;
 - Nenhum trabalho pesado na Sala de Máquinas no dia de chegada.
- 8.4.4. Para viagens acima de 12h ou com fuso horário de mais de 3hrs:
- Não entrar em espaços confinados por até 1 dia após a chegada;
 - Nenhum trabalho pesado na Sala de Máquinas por 1 dia após a chegada.
- Comprimidos de sal não são recomendados.

8.5. Planejamento de Trabalho

- 8.5.1. Os supervisores devem assegurar-se que os empregados sigam os comportamentos recomendados, como detalhado na Redução do risco - Comportamentos de segurança durante o trabalho.
- 8.5.2. O esforço manual em um ambiente quente precisa ser minimizado na fase de planejamento e muita atenção deve ser dada a operações de movimentação manual.
- 8.5.3. Se um trabalho de natureza física precisar ser realizado em condições quentes, a mão-de-obra adequada deve ser implementada para permitir a divisão de trabalho e intervalos regulares. Esta é uma função da gestão.
- 8.5.4. Intervalos devem ser feitos em tempos apropriados às condições e a natureza do trabalho. Os supervisores devem assegurar que pausas adequadas estejam sendo feitas, e devem prestar atenção aos sinais de qualquer doença devido ao calor.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

8.5.5. Para limitar exposições a um tamanho de equipe estabelecido, é provável que o rodízio de trabalho seja necessário e requisitos adicionais de treinamento devem ser considerados para permitir "multi-habilidades". Sistemas de trabalho devem ser planejados de forma a antecipar todas as tarefas que provavelmente dão origem aos riscos.

8.5.6. O fornecimento de um ambiente mais frio, incluindo, mas não limitado a sombra deve ser providenciado próximo à área de trabalho onde os funcionários possam procurar refúgio. Esta área não deve ser fria, apenas mais fresca que os seus arredores.

8.6. Treinamento e Educação

8.6.1. Treinamento e educação profissional são fatores importantes na prevenção de doenças relacionadas ao calor, e devem ser prestados antes de o trabalho ser realizado, incluindo a gestão e supervisores. O treinamento deve abranger as precauções a serem tomadas, os comportamentos a serem adotados, e o reconhecimento dos sinais, sintomas e tratamento da doença de calor.

8.6.2. O reconhecimento dos sintomas é de extrema importância para trabalhadores que estejam sozinhos, que normalmente terá que se auto-diagnosticarem. Por essa razão, o trabalho isolado deve ser desencorajados e ser evitado se possível. Se trabalho isolado for necessário, um sistema de controle de bem-estar deve ser estabelecido sob e acima de supervisão normal.

8.7. Hidratação

8.7.1. Beber 250 ml a cada 15 minutos, o que requer que cada trabalhador tenha acesso a 1012 litros de água por turno. Esta é uma quantidade excessiva a ser carregada, considerando que alimentos, equipamentos e ferramentas também precisem ser levados.

8.7.2. Nestas condições, um fornecimento de água potável resfriada deve estar disponível no local de trabalho para que os indivíduos possam encher seus recipientes.

8.7.3. Unidades de fazer gelo com capacidade suficiente para atender a demanda de pico nos principais horários de início de turno devem ser instaladas em um local adequado.

8.7.4. Água/líquidos não devem ser consumidos gelados. Embora suponha-se que isso iria resfriar o corpo mais rapidamente, o estômago não é parte do corpo e o frio tem o efeito de constrição do estômago. Como resultado, o fluxo ao intestino, de onde o líquido é absorvido é reduzido e a reidratação retardada.

8.8. Primeiros Socorros e Resgate

8.8.1. Além do objetivo primordial de prevenir doenças térmicas, devem ser adotadas disposições para primeiros socorros, com treinamento específico, sendo necessário para o reconhecimento e tratamento de doenças por calor.

8.8.2. Critérios devem ser estabelecidos para que, em caso de doença térmica aparente, a pessoa seja retirada imediatamente do local de trabalho, antes que o colapso ocorra. Estes critérios serão específicos ao local, e o aconselhamento médico deve ser considerado. O principal critério considerado é provavelmente o tempo ou a distância a um refúgio fresco.

8.8.3. O resgate e recuperação de um indivíduo que sofreu um colapso será difícil se qualquer movimentação manual de uma maca for necessária, e todas as disposições devem ser tomadas para minimizar este esforço.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

9. REDUÇÃO DO RISCO - COMPORTAMENTOS SEGUROS ANTES DE TRABALHAR

Para minimizar os efeitos do calor, os funcionários precisam se apresentar ao trabalho em bom estado. Isto inclui:

- 9.1. Manter uma dieta saudável e o peso ideal;
- 9.2. Garantir uma boa qualidade de descanso antes de participar do trabalho;
- 9.3. Comer antes de realizar o trabalho, já que isso auxilia a hidratação. Pão, bananas, barras de cereais, iogurtes, frutas e feijões são todos recomendados;
- 9.4. Manter a ingestão de álcool dentro de diretrizes nacionais e evitar beber álcool 8-12 horas antes do início do turno de trabalho;
- 9.5. Evitar realizar exercícios extremos imediatamente antes ou após o turno;
- 9.6. Evitar tomar cafeína antes do turno, ou seja, café, chá e cola;
- 9.7. Aumentar a ingestão de líquidos antes do início do turno através de bebidas sem cafeína, ou seja, água, leite e sucos para garantir uma boa hidratação. Deve-se notar que quanto mais clara for a cor da urina, melhor será o nível de hidratação;
- 9.8. Informar ao departamento de saúde ocupacional no local se estiver sobre medicação regular ou se sofrer de alguma condição médica.

10. REDUÇÃO DO RISCO - COMPORTAMENTOS SEGUROS DURANTE O TRABALHO

Comportamentos críticos a serem adotados durante o turno para minimizar os riscos são:

- 10.1. O uso de roupas que permitam a evaporação do suor.
- 10.2. Compassar o trabalho. Verificou-se que intervalos frequentes, porém curtos trazem mais benefícios do que pausas longas de esforço manual.
- 10.3. Escala de trabalho. Além de compassar o trabalho, se as tarefas mais árduas puderem ser compartilhadas, nenhum membro da equipe será exposto a risco adicional.
- 10.4. Ingestão regular de líquidos para manter um nível adequado de hidratação. Uma possível perda de suor de um litro por hora tem de ser substituída, e é recomendável que pequenas doses de bebidas sejam ingeridas regularmente, ao invés de ingestões de grandes doses de bebidas, que podem causar câibras. A ingestão de 250 ml a cada 15 minutos é recomendada. O sal NÃO deve ser adicionado à água, pois ele pode interferir com os mecanismos de controle fisiológico normal dos rins. A água pode ser mais agradável com a adição de aromas de frutas.
- 10.5. Evitar bebidas que contenham cafeína, tais como café, chá, colas e algumas bebidas "anti-sonolência" durante o turno. A cafeína é um diurético e estimula a perda de fluidos. Da mesma forma, bebidas energéticas devem ser tomadas com moderação, pois o consumo excessivo pode resultar em um desequilíbrio de sal, particularmente o potássio.
- 10.6. Monitorando os níveis de hidratação. Isto pode ser feito simplesmente pela observação da coloração do fluxo de urina: quanto mais escura a cor, menos hidratado o indivíduo está. Se isto for observado, então, medidas corretivas imediatas na forma de obtenção de fluidos extra podem ser iniciadas. Paletas de cor da urina para comparação objetiva estão disponíveis e seu uso é incentivado.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.INS.0007.POR	Revisão: 03
	Detentor do Processo: E. VAN KUIJK	Data de Aprovação: out-2018
INSTRUÇÃO GERENCIAMENTO DE ESTRESSE TÉRMICO		

10.7. Ingestão regular de alimentos. Assim como o consumo de água, pequenas refeições devem ser feitas em intervalos regulares durante o turno, em vez de esperar até meados do turno para começar a comer. Pão, bananas, barras de cereais, iogurtes, frutas e feijões são todos recomendados; Carne, queijo ou outros alimentos ricos em proteínas não são recomendados, pois estes não incentivam a absorção de fluido. Todos os alimentos devem, idealmente, ser mantidos em ou abaixo de 10°C para evitar a deterioração.

10.8. Vigilância No Turno. A supervisão deve ser de três níveis, ou seja, auto supervisão, da equipe, do supervisor. Verificar se os comportamentos recomendados estão sendo seguidos. A equipe deve verificar também que o Supervisor está cumprindo, por exemplo, tomando líquidos suficientes, e deve monitorar o Supervisor quanto a sinais e sintomas de doença térmica.

11. PROCESSO RELACIONADO

-  EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.SWL.0000.ENG Procedimento de Trabalho de Gestão de Saúde