

정답 한눈에 보기

1	④	2	④	3	①	4	④	5	②	6	⑤
7	118	8	④	9	31	10	③	11	⑤	12	14
13	②	14	26	15	⑤	16	③	17	③	18	④
19	①	20	③	21	20개	22	③	23	④	24	6
25	①	26	②	27	①⑤	28	⑤	29	②	30	0

— 소인수분해

1

3점

공식 활용 · 상 · 입학 심화형 3번

| 정답 ④ 12

- $24 = 2^3 \times 3$ 이므로 $24 \times \square$ 를 소인수분해한 뒤 약수의 개수 공식을 쓴다.
- $\square = 5, 7, 11 \rightarrow 2^3 \times 3 \times (\text{소수}) \rightarrow 4 \times 2 \times 2 = 16$ (○)
- $\square = 16 = 2^4 \rightarrow 2^7 \times 3 \rightarrow 8 \times 2 = 16$ (○)
- $\square = 12 = 2^2 \times 3 \rightarrow 2^5 \times 3^2 \rightarrow 6 \times 3 = 18$ (×)

틀렸다면 약수의 개수 공식 (지수+1)의 곱을 거꾸로 쓰지 못한다. 24를 먼저 소인수분해하지 않고 선지를 그냥 곱해 본 학생이 많다.

2

3점

근거 제시 · 상 · 입학 심화형 4번

| 정답 ④

- ① 0은 어떤 자연수의 약수도 아니다.
- ② 4의 약수는 1, 2, 4로 3개뿐이므로 "4개 이상"은 거짓.
- ③ 1은 소수도 합성수도 아니므로 거짓.
- ④ 소수의 정의 그대로이므로 참.
- ⑤ 2는 짝수인 소수이므로 거짓.

틀렸다면 반례를 떠올리지 못한다. ②는 4, ③과 ⑤는 1과 2가 반례다. 정의를 외웠는지가 아니라 예외를 찾는 힘을 본다.

3

3점

단계별 해결 · 최상 · 입학 심화형 2번

| 정답 ① 60

- $24 = 2^3 \times 3, 90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 c^2 은 두 수의 공배수인 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 의 배수이다.
- 제곱수는 소인수의 지수가 모두 짝수여야 하므로 2와 5를 한 번씩 더 곱한 $c^2 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 = 3600$ 이 가장 작다.
- $c = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

틀렸다면 24와 90의 최소공배수까지는 구해 놓고, 거기에서 제곱수 조건으로 지수를 짝수로 맞추는 마지막 단계를 빠뜨린다.

4

3점

식 설정 · 상 · 응용 4번

| 정답 ④ 15장

- 가장 작은 정사각형의 한 변 = 12와 20의 최소공배수 = 60 (cm)
- 가로로 $60 \div 12 = 5$ 장, 세로로 $60 \div 20 = 3$ 장
- $5 \times 3 = 15$ 장

틀렸다면 "가장 작은 정사각형 = 최소공배수"라는 번역을 못 한다. 넓이로 $60 \times 60 \div (12 \times 20) = 15$ 로 풀어도 맞다.

5

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 1번

| 정답 ② 4

- $\langle x \rangle$ 는 x 보다 크지 않은 소수 중 가장 큰 것이므로, 값이 19가 되려면 x 가 19 이상이어야 한다.
- 19 다음 소수는 23이므로 x 가 23이 되는 순간 $\langle x \rangle$ 는 23으로 바뀐다.
- 따라서 x 는 19, 20, 21, 22 의 4개이다.

틀렸다면 $\langle 19 \rangle = 19$ 하나만 세고 끝낸다. 소수가 아닌 20, 21, 22 에서도 $\langle x \rangle$ 가 그대로 19라는 점을 놓친다.

6

3점

단계별 해결 · 최상 · 입학 심화형 5번

| 정답 ⑤ 140/3

- 구하는 분수를 n/m 이라 하면 $12/7 \times n/m$ 등이 모두 양의 정수여야 한다.
- 분자 n 은 7, 5, 4로 모두 나누어떨어져야 하므로 n 의 최솟값은 최소공배수 140.
- 분모 m 은 12, 36, 15를 모두 나누어야 하므로 m 의 최댓값은 최대공약수 3.
- 가장 작은 분수는 140/3.

틀렸다면 조건을 "분자는 최소공배수, 분모는 최대공약수"로 바꾸는 착상이 안 선다. 이 한 줄을 못 떠올리면 손도 못 대는 문항이다.

7 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 입학 심화형 22번

| 정답 118

- (가) 8로 나눈 나머지가 6이므로 $N + 2$ 는 8의 배수이다.
- (나) 10으로 나눈 나머지가 8이므로 $N + 2$ 는 10의 배수이다.
- (다) 나누어떨어지지기에 2가 부족하다는 말도 $N + 2$ 가 12의 배수라는 뜻이다.
- 세 조건이 모두 $N + 2$ 로 모이므로 $N + 2$ 는 8, 10, 12 의 공배수이다.
- 가장 작은 N 을 찾으므로 $N + 2 = (8, 10, 12\text{의 최소공배수}) = 120$, 즉 $N = 118$ 이다.

틀렸다면 세 조건을 따로 두고 수를 하나씩 대입해 찾으려 한다. 나머지 6, 나머지 8, 2가 부족하다가 모두 같은 말이라는 공통 구조를 보지 못한다.

— 정수와 유리수

8

3점

연산 처리 · 상 · 입학 심화형 7번

| 정답 ④ -4

- 안쪽부터 정리한다. $[-5, 7]$ 은 $|-5| = 5, |7| = 7$ 이므로 절댓값이 작은 -5 이다.
- 남은 식은 $[-5, -4]$ 이고, $|-5| = 5, |-4| = 4$ 이므로 절댓값이 작은 -4 이다.
- 따라서 $[[-5, 7], -4] = -4$ 이다.

틀렸다면 작은 수와 절댓값이 작은 수를 헷갈려 -5를 고른다. 음수끼리 비교할 때 특히 자주 뒤집힌다.

9 서술형

4점

규칙 발견 · 표준 · 응용 23번

| 정답 31

- $a \triangle b = a \div b + 1$ 이라는 약속을 그대로 쓰되 괄호 안부터 계산한다.
- $2/3 \triangle 5 = (2/3) \div 5 + 1 = 2/15 + 1 = 17/15$
- $34 \triangle (17/15) = 34 \div (17/15) + 1 = 34 \times 15/17 + 1 = 30 + 1 = 31$

틀렸다면 괄호 안을 먼저 계산하는 순서를 지키지 않는다. 새 기호라도 계산 순서 규칙은 그대로라는 점을 확인하는 문항이다.

10

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 10번

| 정답 ③ 4

- A(1)과 B(13) 사이의 거리는 $13 - 1 = 12$.
- 1 : 3으로 나누므로 C는 A에서 $12 \times 1/4 = 3$ 만큼 떨어져 있다.
- C가 나타내는 수는 $1 + 3 = 4$.

틀렸다면 1 : 3을 "네 등분 중 한 칸"이 아니라 "3등분"으로 읽는다. 수직선 위 거리 = 큰 수 - 작은 수 라는 것도 함께 본다.

11

3점

공식 활용 · 상 · 입학 심화형 9번

| 정답 ⑤ $-1/a^2$

- -2의 역수이므로 $a = -1/2$.
- ① $-a = 1/2$ ② $a = -1/2$ ③ $a^3 = -1/8$
- ④ $-1/a = 2$ ⑤ $-1/a^2 = -1 \div (1/4) = -4$
- 가장 작은 수는 -4 이므로 ⑤.

틀렸다면 역수와 음수의 거듭제곱이 겹치면 부호를 놓친다. a^2 은 항상 양수이므로 $-1/a^2$ 은 항상 음수라는 점이 핵심이다.

12 서술형

4점

단계별 해결 · 표준 · 응용 24번

| 정답 14

- $|a| = 2$ 이므로 $a = 2$ 또는 -2 , $|b| = 5$ 이므로 $b = 5$ 또는 -5 .
- $a - b$ 가 가장 클 때: $a = 2$, $b = -5 \rightarrow M = 7$
- $a - b$ 가 가장 작을 때: $a = -2$, $b = 5 \rightarrow m = -7$
- $M - m = 7 - (-7) = 14$

틀렸다면 네 가지 경우를 빠짐없이 따지지 않고 부호를 감으로 정한다. 뿔셈에서는 b의 부호를 뒤집어야 최대가 된다는 점이 함정이다.

13

3점

근거 제시 · 최상 · 입학 심화형 6번

| 정답 ② $b < d < a < c$

- (가) b, d 는 0의 왼쪽 $\rightarrow$ 둘 다 음수.
- (나) a, c 는 0의 오른쪽 $\rightarrow$ 둘 다 양수. 따라서 음수 둘이 양수 둘보다 작다.
- (다) 절댓값이 가장 큰 수가 $b \rightarrow$ 음수 중 b 가 더 왼쪽이므로 $b < d$.
- (다) 절댓값이 가장 작은 수가 $a \rightarrow$ 양수 중 a 가 더 왼쪽이므로 $a < c$.
- 따라서 $b < d < a < c$.

틀렸다면 음수는 절댓값이 클수록 작다는 관계가 뒤집힌다. 수직선을 직접 그려 네 점을 찍어 보면 바로 정리되는 문항이다.

14 서술형

4점

연산 처리 · 상 · 입학 심화형 25번

| 정답 26

- $-3/a = -3 \div (1/6) = -3 \times 6 = -18$
- $2b = -2/3$ 이므로 $4/(2b) = 4 \div (-2/3) = 4 \times (-3/2) = -6$
- $-10/c = -10 \div (-1/5) = -10 \times (-5) = 50$
- $-18 + (-6) + 50 = 26$

틀렸다면 분모에 분수가 오면 역수를 곱한다는 처리를 못 한다. $2b$ 를 먼저 계산하지 않고 $4/2$ 부터 나눠 버리는 실수도 잦다.

— 문자와 식

15

3점

개념 이해 · 표준 · 심화 11번

| 정답 ⑤ -5

- 정리하면 $(5 + a)x^2 + (-3 + 1)x + (5 - 2) = (5 + a)x^2 - 2x + 3$.
- 일차식이 되려면 x^2 의 계수가 0이어야 한다.
- $5 + a = 0 \rightarrow a = -5$

틀렸다면 "일차식"의 정의를 최고차항이 아니라 항의 개수로 잘못 안다. 차수가 가장 높은 항이 사라져야 한다는 점만 알면 한 줄이다.

16

3점

연산 처리 · 상 · 응용 13번

| 정답 ③ $5x - 8y$

- 어떤 식을 A라 하면 $A + (-x + 2y) = 3x - 4y$.
- $A = (3x - 4y) - (-x + 2y) = 4x - 6y$
- 바르게 계산하면 $A - (-x + 2y) = 4x - 6y + x - 2y = 5x - 8y$

틀렸다면 되돌리는 단계를 건너뛰고 $3x-4y$ 에서 바로 빼 버린다. 잘못 계산한 식에서 원래 식 A를 먼저 복원해야 한다.

17

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 11번

3점

| 정답 ③ $7x$

- $(-2x) \star y = 2(-2x) + 3y = -4x + 3y$
- $-3\{(-2x) \star y\} = -3(-4x + 3y) = 12x - 9y$
- $x \odot 3y = 5x - 3(3y) = 5x - 9y$
- $(12x - 9y) - (5x - 9y) = 7x$

틀렸다면 두 기호의 정의를 바꿔 놓는다. $\star$ 와 $\odot$ 에서 앞이 A, 뒤가 B라는 자리를 표시해 두고 대입하면 실수가 줄어든다.

18

식 설정 · 상 · 입학 심화형 12번

3점

| 정답 ④ $(2a+3b)/5 \%$

- 소금의 양 $= 400 \times a/100 + 600 \times b/100 = 4a + 6b$ (g)
- 소금물 전체는 $400 + 600 = 1000$ (g)
- 농도 $= (4a + 6b)/1000 \times 100 = (4a + 6b)/10 = (2a + 3b)/5$ (%)

틀렸다면 농도 공식을 문자로 세우지 못한다. 소금의 양을 먼저 문자로 적는 것이 첫 단추다.

19

연산 처리 · 최상 · 응용 12번

3점

| 정답 ① -2

- 분모 5와 4의 최소공배수 20으로 통분한다.
- $\{4(-x + 2y + 5) - 5(4y - x + 3)\} / 20$
- $= (-4x + 8y + 20 - 20y + 5x - 15)/20 = (x - 12y + 5)/20$
- $a = 1/20, b = -12/20 = -3/5, c = 5/20 = 1/4$
- $a + 3b - c = 1/20 - 9/5 - 1/4 = (1 - 36 - 5)/20 = -2$

틀렸다면 뒤 분수 앞의 빼기를 분자 전체에 분배하지 않는다. 계수가 분수로 나오는 것까지 감당해야 하는 문항이다.

— 일차방정식

20

공식 활용 · 표준 · 응용 14번

3점

| 정답 ③ $x = -1$

- 양변에 6을 곱해 분수와 소수를 한 번에 없앤다.
- $2(2x - 1) = 3(3x + 1)$
- $4x - 2 = 9x + 3 \rightarrow -5x = 5 \rightarrow x = -1$

틀렸다면 분수와 소수가 섞이면 한쪽만 처리한다. 두 분모의 최소공배수로 양변 전체를 한 번에 곱하는 것이 정석이다.

21 서술형

식 설정 · 표준 · 심화 28번

4점

| 정답 20개

- 샤프심 한 통에 x 개가 들어 있다고 하면 전체 샤프심은 $3x$ 개.
- 샤프 10자루에 5개씩 넣으면 50개가 쓰이고 10개가 남는다.
- $3x = 50 + 10 = 60 \rightarrow x = 20$

틀렸다면 무엇을 x 로 돌지 정하지 못한다. 묻는 것(한 통의 개수)을 그대로 x 로 두면 식이 한 줄로 선다.

22

근거 제시 · 표준 · 입학 심화형 13번

3점

| 정답 ③

- 등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 등식은 그대로다. 선지가 그 규칙을 지켰는지 본다.
- ① $a + 2 = b + 3$ 에서 $a = b + 1$ 이므로 $a + 4 = b + 5$ 다. 선지의 $b + 6$ 은 틀렸다.
- ② $a + 1 = b + 2$ 에서 $a = b + 1$ 이므로 $a + 1/2 = b + 3/2$ 다. 선지의 $b + 1$ 은 틀렸다.
- ③ $a = 2b$ 의 양변에 1을 더한 것이므로 맞다.
- ④ 왼쪽은 2를 뺐는데 오른쪽은 4를 더했다. 양변에 같은 수를 하지 않았으므로 틀렸다.
- ⑤ $a/2 = b/3$ 의 양변에 6을 곱하면 $3a = 2b$ 이고, 여기에 3을 더하면 $3a + 3 = 2b + 3$ 이다. 선지의 $2b + 2$ 는 틀렸다.

틀렸다면 선지에 적힌 식이 맞는지 보지 않고 앞부분만 보고 고른다. 양변에 같은 수를 더했는지, 그 결과가 선지와 같은지를 끝까지 맞춰 봐야 한다.

23

3점

식 설정 · 최상 · 입학 심화형 14번

| 정답 ④ 123

- 의자를 x 개라 하면 4명씩 앉을 때 7명이 남으므로 학생 수는 $4x + 7$ 이다.
- 5명씩 앉으면 빈 의자가 4개이므로 쓴 의자는 $x - 4$ 개이고, 그중 마지막 한 개에만 3명이 앉으므로 학생 수는 $5(x - 5) + 3$ 이다.
- $4x + 7 = 5(x - 5) + 3$ 에서 $x = 29$ 이므로 학생 수는 $4 \times 29 + 7 = 123$ 이다.

틀렸다면 빈 의자 4개를 빼는 것까지는 해도, 마지막 의자에 3명만 앉으므로 꼭 찬 의자가 $x - 5$ 개라는 점을 놓쳐 $5(x - 4) + 3$ 으로 세운다.

24 서술형

5점

개념 이해 · 최상 · 응용 26번

| 정답 6

- $(a - 1)x + 3 = 4 \rightarrow (a - 1)x = 1$.
- 해가 없으려면 x 의 계수가 0이어야 한다 $\rightarrow a - 1 = 0 \rightarrow a = 1$.
- $bx + 5 = c \rightarrow bx = c - 5$.
- 해가 모든 수이려면 양변이 모두 0이어야 한다 $\rightarrow b = 0, c = 5$.
- $a + b + c = 1 + 0 + 5 = 6$

틀렸다면 "해가 없다"와 "해가 무수히 많다"를 구분하지 못한다. 둘 다 x 의 계수가 0인 상황인데 상수항이 다르다는 것이 갈림길이다.

25

3점

식 설정 · 최상 · 입학 심화형 15번

| 정답 ① 80 m

- 여객 열차의 길이를 x m, 속력을 v m/s 라 하자.
- 터널을 완전히 지나려면 (터널 + 열차) 만큼 달려야 한다: $120 + x = 8v$
- 마주 보고 완전히 지나칠 때는 두 길이의 합을 상대 속력으로 나눈다: $x + 80 = 4(v + 15)$
- 두 번째 식에서 $x + 20 = 4v$, 첫 번째 식에서 $4v = (120 + x)/2$
- $x + 20 = (120 + x)/2 \rightarrow 2x + 40 = 120 + x \rightarrow x = 80$
- 검산: $v = 200/8 = 25, (80 + 80)/(25 + 15) = 4$ 초 (○)

틀렸다면 "완전히 지난다"가 열차 길이까지 더한 거리라는 것을 놓친다. 마주 오는 경우 속력을 더한다는 것도 함께 확인한다.

— 좌표평면과 그래프

26

3점

표현 해석 · 표준 · 응용 18번

| 정답 ② ㄱ, ㄷ, ㄴ

- 물통이 굽을수록 같은 양을 부어도 높이가 덜 올라가므로 그래프의 기울기가 작다.
- A가 가장 굽으므로 기울기가 가장 작은 ㄱ.
- C가 가장 가늘므로 기울기가 가장 큰 ㄴ.
- B는 가운데이므로 ㄷ.

틀렸다면 굽기와 기울기의 방향을 반대로 읽는다.
굽다 = 천천히 올라간다 = 완만하다 로 한 번 정리해 두면 된다.

27

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 18번

| 정답 ①, ⑤

- $y = -4/x$ 에서 $a = -4 < 0$ 이므로 그래프는 제2, 제4사분면을 지난다.
- ① $a < 0$ 이면 각 사분면에서 x 가 커질 때 y 도 커진다. "감소한다"는 거짓.
- ② $x < 0$ 이면 $y > 0$ 이므로 제2사분면 (참)
- ③ 제2, 제4사분면 (참) ④ $x = 2 \rightarrow y = -2$ (참)
- ⑤ 반비례 그래프는 원점을 지나지 않는 한 쌍의 곡선이다. "직선"은 거짓.

틀렸다면 a 의 부호가 그래프의 사분면과 증감을 모두 바꾼다는 것을 모른다. 정답이 두 개인 형식도 함께 확인한다.

28

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 16번

| 정답 ⑤

- 0~15분 집에서 공원까지, 15~40분 공원에 머물, 40~75분 집으로 돌아옴.
- ① $40 - 15 = 25$ 분 (참) ② 총 75분 = 1시간 15분 (참) ③ $75 - 40 = 35$ 분 (참)
- ④ 15분과 20분 모두 $y = 1500$ (참)
- ⑤ 갈 때 $1500/15 = 100$ m/분, 올 때 $1500/35 \approx 43$ m/분 $\rightarrow$ 올 때가 더 느리다 (거짓)

틀렸다면 그래프가 평평한 구간을 "멈춰 있다"로 읽지 못한다. 기울기가 가파를수록 빠르다는 것도 같이 본다.

29

3점

단계별 해결 · 상 · 입학 심화형 19번

| 정답 ② 12

- $y = ax$ 가 (2, 6)을 지나므로 $6 = 2a \rightarrow a = 3$.
- 따라서 반비례 그래프는 $y = 3/x$.
- $x = 2$ 일 때 $y = 3/2$ 이므로 $D(2, 3/2)$, $A(-2, 3/2)$.
- 가로 = $2 - (-2) = 4$, 세로 = $3/2 \times 2 = 3$
- 넓이 = $4 \times 3 = 12$

틀렸다면 정비례에서 구한 a 를 반비례 식에 그대로 옮기는 연결이 안 된다. 같은 문자 a 가 두 식을 잇는 다르다.

30 서술형

5점

공식 활용 · 최상 · 심화 29번

| 정답 0

- x 축에 대한 대칭은 y 좌표의 부호만 바뀐다: $(2a, -b) = (a - 5, 2b - 6)$
- $2a = a - 5 \rightarrow a = -5$, $-b = 2b - 6 \rightarrow 3b = 6 \rightarrow b = 2$
- y 축에 대한 대칭은 x 좌표의 부호만 바뀐다: $(-2a, b) = (3c + 1, c - 1)$
- $b = c - 1 \rightarrow 2 = c - 1 \rightarrow c = 3$ (검산: $-2a = 10 = 3 \times 3 + 1$ ○)
- $a + b + c = -5 + 2 + 3 = 0$

틀렸다면 x 축 대칭과 y 축 대칭에서 어느 좌표의 부호가 바뀌는지 헷갈린다. 같은 규칙을 세 번 적용하는 동안 한 번만 틀려도 답이 어긋난다.