

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ?

1

2

3

4

5

Бактерия попадает в мочевой пузырь или мочевого тракт. В таком состоянии она еще не может навредить организму.

На поверхности стенки бактерии есть специальные реснички или жгутики – фимбрии (пили). Они вырабатывают специфический белок – адгезин.

Белок адгезин связывается с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих мочевого пузыря.

Бактерия прикрепилась к слизистой! С этого момента она начинает выделять в клетки мочевого пузыря токсины, «забирать» из клеток полезные вещества и размножаться.

Клетки мочевого пузыря повреждаются и гибнут. Начинается цистит.

ЦИСТЕНИУМ II: ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ

Компоненты Цистениума II нарушают механизм «заселения» бактериями мочевого пузыря, и потому воздействуют непосредственно на причину развития цистита:

Д-манноза блокирует белок адгезин, а без него бактерии не могут прикрепиться к клеткам мочевого пузыря.

Витамин С создает среду, непригодную для жизнедеятельности бактерий.

Проантоцианидины клюквы образуют защитный слой на рецепторах клеток слизистой мочевого пузыря. Бактериям больше не к чему крепиться!

ЦИСТЕНИУМ II: ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ

Активные компоненты Цистениума II действуют на одну и ту же «мишень», что повышает эффективность защиты.

Эффективность не снижается при длительном приеме, так как у бактерий не формируется устойчивость (резистентность) к действию растительных компонентов.

Высокий профиль безопасности: можно принимать беременным женщинам и детям с 7 лет.

Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов, подсластителей.

SYSTEMIUM ЦИСТЕНИУМ II

для защиты мочевыводящих путей

КАК ПРИНИМАТЬ?

Детям старше 7 лет и взрослым по 1 таблетке 1–2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. При необходимости курс приема повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Беременным и кормящим женщинам принимать по назначению и под наблюдением врача.

СОВЕТЫ ПО ПРИЕМУ**:

- Можно рассасывать таблетку, запивая водой или другим напитком (в том числе сладким).
- Если сложно рассосать таблетку, ее допустимо растолочь и растворить в половине стакана воды, а затем выпить полученный напиток. Можно подсластить по вкусу.
- Для удобства приема таблетку можно разделить на несколько частей, которые затем следует рассосать, разжевать или проглотить, запивая водой.
- Допустимо разжевать таблетку.

КОГДА ПРИНИМАТЬ?

Для большей эффективности один прием Цистениума II желательно запланировать на вечернее время, так как ночью моча застаивается и возникает благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

Непосредственно после возникновения факторов риска можно провести один курс приема Цистениума II (2 недели). Если циститы повторяются, целесообразно принимать Цистениум II в течение более длительного времени.

Цистениум II совместим с антибактериальными препаратами и другими средствами для терапии цистита.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ EXOSUAN™

- Exosuan™ – это уникальный стандартизированный экстракт клюквы, который производит компания Nexira в г. Бордо, Франция.
- Экстракт клюквы Exosuan™ стандартизирован по проантоцианидинам (уникальные технологии позволяют выделить из клюквы проантоцианидины А), которые доказанно уменьшают вероятность (риск) инфекций мочевыводящих путей.

** Советы носят рекомендательный характер, не обязательны к исполнению. Exosuan™ является товарным знаком компании Nexira.

Биологически активная добавка к пище «ЦИСТЕНИУМ II».
Не является лекарством.
Форма выпуска: таблетки для рассасывания массой 1800 мг.
Состав: лактоза моногидрат, D-манноза, экстракт плодов клюквы, аскорбиновая кислота (витамин С), антислеживающие агенты – магния стеарат, кремния диоксид аморфный, носитель – стеариновая кислота.

Прием 1–2 таблеток обеспечит поступление:

Наименование компонента	Количество, мг	Дети, %		
		7–11 лет	11–14 лет	14–18 лет
Витамин С	60–120	100–200 ^{1*}	86–171 ^{1*} (м) 100–200 ^{1*} (д)	67–133 ^{1*} (м) 86–171 ^{1*} (д)
Проантоцианидины	36–72	–		
D-манноза	450–900	–		

Наименование компонента	Количество, мг	Женщины, %			Взрослые, %
		Беременные (I-я половина)	Беременные (II-я половина)	Кормящие	
Витамин С	60–120	67–133 ^{1*}	60–120 ^{1*}	50–100 ¹	100–200 ^{2*}
Проантоцианидины	36–72	36–72 ³			
D-манноза	450–900	–			

¹ – % согласно МР 2.31.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».

² – % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).

³ – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).

* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

м – мальчики / д – девочки.

Пищевая ценность в 1 таблетке: углеводы – 1,6 г.
Энергетическая ценность в 1 таблетке: 27 кДж / 6,4 ккал.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С, содержащей проантоцианидины.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Реализация: через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.
Срок годности: 3 года.
ТУ 10.89.19-157-58693373-2019
СГР № RU.77.99.11.003.R.003791.10.19 от 16.10.2019 г.
Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 8 этаж, помещение 1N – комната 11.
Тел.: +7 (495) 780-72-34. Телефон горячей линии: 8-800-200-86-86. Все права на продукт принадлежат АО «АКВИОН».
Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в Республике Беларусь: ОДО «ФАРМИН», РБ, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-62, тел.: (017) 269-88-00.

cystenium.ru
akvion.ru